

动物疫病防治员专业理论考试题库（最全版）

一、单选题

1. 布鲁氏菌病隐性感染牛群的主要检疫方法是

- A、细菌分离鉴定
- B、血清凝集试验
- C、变态反应
- D、PCR技术
- E、核算杂交

参考答案：B

2. 多头犊牛突发羞明，流泪，眼睑痉挛，局部增温，1至2日内角膜中央出现微黄色浑浊，继而出现圆形溃疡，周边有新生血管形成。该病的特征性病变

- A、黏液脓性分泌物
- B、椭圆形角膜溃疡
- C、形成圆锥形角膜
- D、致密的瘢痕组织
- E、鼻镜发红

参考答案：E

3. 对患结核病的奶牛应作

- A、高温处理
- B、化制处理

- C、销毁处理
- D、生物热处理
- E、化学消毒处理

参考答案： C

4. 某猪场 4 月龄猪，出现咳嗽、气喘等症状。气候骤变和驱赶时症状加重，剖检见双侧肺有对称性肉变。该病可能是（）

- A、猪传染性胸膜性肺炎
- B、猪副嗜血杆菌
- C、猪肺疫
- D、猪支原体肺炎

参考答案： D

5. 诊断具有快速、敏感、特异性强等优点的方法是

- A、补体结合试验
- B、PCR
- C、琼脂扩散试验
- D、荧光抗体试验
- E、间接血凝试验

参考答案： B

6. 高温蒸汽灭菌的温度是多少？

- A、121 度
- B、90 度
- C、80 度

D、150 度

参考答案：A

7. 经产母牛发情频繁，性欲亢进，体温 39.2℃，从阴道流出脓性分泌物，取分泌物进行细菌分离培养，分离菌革兰氏染色阳性，抗酸染色菌体为红色，形态平直或微弯，最可能发生的传染病是

- A、结核病
- B、衣原体病
- C、布鲁氏菌病
- D、李氏杆菌病
- E、沙门氏杆菌病

参考答案：C

8. 肝脏有针尖大小白色坏死灶的疾病是

- A、传染性支气管炎
- B、传染性喉气管炎
- C、禽霍乱
- D、鸡新城疫
- E、鸡法氏囊病

参考答案：C

9. 最急性的禽霍乱多见于流行

- A、初期
- B、中期
- C、后期

- D、中后期
- E、产蛋后期

参考答案：A

10. 雏鸡新城疫母源抗体可进行第一次免疫 HI 效价在

- A、1:2 的 2 次方
- B、1:2 的 3 次方
- C、1:2 的 4 次方
- D、1:2 的 5 次方
- E、1:2 的 6 次方

参考答案：B

11. 副结核病的主要临床特征是

- A、便秘
- B、顽固性腹泻
- C、呼吸困难
- D、心跳加快
- E、体温升高

参考答案：B

12. 母猪群，高热稽留，腹泻，呼吸困难，耳部及腹下皮肤有较大面积发绀，部分孕猪发生流产、死胎，取淋巴结染色镜检，发现香蕉形虫体。该疾病可能是（）

- A、弓形虫病
- B、球虫病

- C、旋毛虫病
- D、棘头虫病

参考答案：A

13. 鸡慢性呼吸道病血清学诊断最常用的试验是

- A、全血平板凝集反应
- B、血清平板凝集反应
- C、全血琼脂扩散反应
- D、血清琼脂扩散反应
- E、试管凝集反应

参考答案：A

14. 某猪场，部分4月龄育肥猪突然发病，呼吸急迫，体温41℃：腹下及四肢皮肤呈紫红色，有出血点。濒死前口鼻中流出暗红色血液。血液涂片染色镜检，可见大量革兰氏阳性菌。可初步判断为（）

- A、猪链球菌病
- B、猪巴氏杆菌病
- C、猪支原体肺炎
- D、猪传染性胸膜肺炎

参考答案：A

15. 从粪便中检出含六钩蚴的虫卵，该动物感染的寄生虫是（）

- A、吸虫
- B、线虫
- C、绦虫

D、球虫

参考答案：C

16. 妊娠母猪，3岁，发热、精神不振、流产、产死胎、木乃伊胎，其中死胎为主。该病最可能是

- A、猪大肠杆菌病
- B、猪沙门氏菌病
- C、猪伪狂犬病
- D、猪流行性腹泻
- E、猪传染性胃肠炎

参考答案：C

17. 高致病性禽流感是

- A、一类疫病
- B、二类疫病
- C、三类疫病
- D、四类疫病
- E、五类疫病

参考答案：A

18. 人工被动免疫具有以下哪些优点

- A、无诱导期
- B、快速出现免疫力
- C、维持时间短
- D、以上都是

E、以上都不是

参考答案：D

19. 具有明显季节性和周期性流行特点的牛的传染病是

A、牛出血性败血病

B、牛流行热

C、牛传染性鼻气管炎

D、结核病

E、布鲁氏菌病

参考答案：B

20. 鸡群沙门氏菌病的检测方法常用

A、全血平板凝集反应

B、血清平板凝集反应

C、全血琼脂扩散反应

D、血清琼脂扩散反应

E、试管凝集反应

参考答案：A

21. 农户饲养 18 月龄以下犊牛 26 头，冬季发病，体温 40-42℃，持续 4-7 天，4 头死亡，主要表现厌食，流鼻涕；鼻镜、口腔黏膜糜烂，舌面坏死，流涎；病初水样腹泻，后带黏液和血液。多数病犊出现蹄叶炎和趾间皮肤糜烂坏死，跛行。同场绵羊和山羊亦见相似的症状。剖检见食道黏膜出现大小不等呈直线排列的糜烂斑分离病毒选用的实验动物是

- A、乳鼠
- B、乳兔
- C、乳鸽
- D、仓鼠
- E、豚鼠

参考答案： B

22. 猪支原体肺炎的病变特征是双侧肺的尖叶、心叶、中间叶和隔叶前缘呈()

- A、淀粉样变
- B、肌肉样变
- C、蜡样变
- D、干酪样变

参考答案： B

23. . 患有伪狂犬病的猪场中最为常见和最难清除的传染源是

- A、患病猪只
- B、带毒猪只
- C、带毒鼠类
- D、流产的胎儿和死胎
- E、潜伏感染的猪只

参考答案： C

24. 羊，局部脱毛，皮肤结痂，刮取皮屑镜检见多量龟形虫体，有足4对，前2对足伸出体缘，后2对足短小，不伸出体缘。该病的病原

是（）

- A、皮刺螨
- B、疥螨
- C、蠕形螨
- D、痒螨

参考答案： B

25. 某规模化猪场中 100 头 90 日龄以上猪，部分猪突然发生咳嗽，呼吸困难，提问达 41℃ 以上，急性死亡，死亡率为百分之十五死前口鼻流出带颜色的液体，剖检见肺与胸壁粘连，肺充血、出血、坏死，用巧克力琼脂从患猪病料里分离出了病原菌，最可能的疾病是（）

- A、猪肺疫
- B、猪支原体肺炎
- C、猪 2 型链球菌病
- D、猪副嗜血杆菌病

参考答案： A

26. 柔嫩艾美耳球虫病的病变主要在

- A、小肠
- B、大肠
- C、结肠
- D、盲肠
- E、直肠

参考答案： D

传染性支气管炎仅发生于

- A、鸡、鸭、鹅
- B、鸡、鸭
- C、鸡
- D、鸭
- E、所有家禽

参考答案：C

28. 剖检猪增生性肠炎的病畜时，可见病变为（）

- A、盲肠
- B、回肠
- C、十二指肠
- D、直肠

参考答案：B

29. 一猪体温升高，咳嗽，流粘性鼻液。死后剖检见肺部病灶形状不规则，呈岛屿状，肺病灶组织切块投入水中呈半沉浮装，该病猪肺部病理变化是（）

- A、肺水肿
- B、肺气肿
- C、支气管肺炎
- D、间质性肺炎
- E、大叶性肺炎

参考答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/548054134076006132>