

2024 年河北省下花园区《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库带答案（巩固）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 下列哪种氨基酸与螺内酯合用时可导致血钾升高

- A: 精氨酸
- B: 门冬氨酸
- C: 赖氨酸
- D: 谷氨酸

答案：A

2. 改善心肌收缩功能，抑制血管肥厚，可以减低血管僵硬程度，改善动脉顺应性抗高血压药是

- A: α 受体激动药
- B: 钙离子通道阻滞药
- C: 血管紧张素转换酶抑制药
- D: 利尿降压药

答案：C

3. 四环素联用麦角生物碱

- A: 口服吸收减少
- B: 增加麦角中毒的风险
- C: 调整抗凝血药的剂量
- D: 肝毒性增加

答案：B

4. 下述不属于抗血小板类药物的是

- A: 非特异性纤溶酶原激活剂
- B: 血栓素 A₂ (TXA₂) 抑制剂
- C: 二磷酸腺苷 P₂Y₁₂ 受体激动剂
- D: 磷酸二酯酶抑制剂

答案：A

5. 氨基糖苷类抗生素对哪类细菌无效

- A: 厌氧菌
- B: 结核杆菌
- C: 革兰阴性菌
- D: 铜绿假单胞菌

答案：A

6. (2015 年真题) 患者，女，45 岁，因强直性脊柱炎住院，同时伴有胃溃疡、高血压及糖尿病，药师审核医嘱，发现应当禁用的药品是 ()。

- A: 格列齐特
- B: 硝苯地平
- C: 双氯芬酸
- D: 雷尼替丁

答案：C

7. 胺碘酮抗心律失常的作用机制是

- A: 缩短心房和浦肯野纤维的动作电位时程、有效不应期
- B: 阻滞多种钾通道，延长动作电位的时程和有效不应期
- C: 提高窦房结和浦肯野纤维的自律性

D: 加快浦肯野纤维和窦房结的传导速度

答案：B

8. 临床上最常用的强心苷类正性肌力药是()

A: 米力农

B: 地高辛

C: 多巴酚丁胺

D: 依那普利

答案：B

9. 硫脲类药物的基本作用是

A: 抑制甲状腺蛋白水解酶

B: 抑制甲状腺素的生物合成

C: 抑制碘泵

D: 抑制 $\text{Na}^{+}-\text{K}^{+}$ 泵

答案：B

10. 属于抗雄激素类的抗肿瘤药是

A: 阿那曲唑

B: 他莫昔芬

C: 氟他胺

D: 炔雌醇

答案：C

11. 诱导肝微粒体酶，加速皮质激素和雌激素代谢的是()

A: 异烟肼

B: 乙胺丁醇

C: 利福平

D: 链霉素

答案：C

12. 止吐方案：每日化疗前，联合应用 5-HT

A: 低度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐

B: 微弱致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐

C: 中度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐

D: 重度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐

答案：D

13. 患者，男，63 岁，2 型糖尿病病史 20 年，现服用二甲双胍 0.5g，一日 3 次；阿卡波糖 0.1g，一日 3 次；吡格列酮 30mg，一日 1 次。既往高血压病史 5 年，冠心病病史 5 年，心功能 I 级轻度肾功能不全，长期服用贝那普利和阿司匹林。

A: 贝那普利

B: 罗格列酮

C: 阿卡波糖

D: 二甲双胍

答案：B

14. （2015 年真题）利尿作用极弱，具有降低眼内压作用，可用于青光眼治疗的利尿剂是（）。

A: 乙酰唑胺

B: 呋塞米

C: 螺内酯

D: 氢氯噻嗪

答案：A

15. 增加肌肉和脂肪组织对胰岛素的敏感性而降低血糖的是 ()

- A: 阿卡波糖
- B: 罗格列酮
- C: 瑞格列奈
- D: 那格列奈

答案: B

16. (2015 年真题) 二磷酸果糖注射液禁用的人群是 ()。

- A: 高钾血症者
- B: 高尿酸血症者
- C: 高磷血症者
- D: 高镁血症者

答案: C

17. 属于 5-HT₃ 受体阻断剂的止吐药是

- A: 维生素 B₆
- B: 托烷司琼
- C: 甲氧氯普胺
- D: 阿瑞吡坦

答案: B

18. 氯吡格雷临床应用

- A: 急性中性粒细胞减少症
- B: 失去药效
- C: 缺血性脑卒中
- D: 缺铁性贫血

答案: C

19. 治疗轻度或中度原发性或肾性高血压宜选用

- A: 卡托普利
- B: 硝苯地平
- C: 肼屈嗪
- D: 普萘洛尔

答案：A

20. 可单独或联合用于以胆固醇升高为主的患者，特别适合作为不能耐受他汀治疗者的替代，用于原发性高胆固醇血症、纯合子家族性高胆固醇血症、纯合子谷甾醇血症的是

- A: 非诺贝特
- B: 依折麦布
- C: 阿昔莫司
- D: 烟酸

答案：B

21. 可与抗凝药发生相互作用的是

- A: 呋塞米
- B: 坎利酮
- C: 丙酸睾酮
- D: 伐地那非

答案：C

22. 适用于Ⅱa、Ⅱb型及家族性杂合子的高脂蛋白血症，但有特殊臭味和刺激性的是

- A: 洛伐他汀
- B: 考普罗布
- C: 烟酸

D: 考来烯胺

答案：D

23. 用于各种原因引起的干咳，成人一次 10~15mg 的药物是

A: 地塞米松

B: 右美沙芬

C: 苯丙哌林

D: 可待因

答案：B

24. 存在高度致吐风险的抗肿瘤药物是

A: 顺铂

B: 泼尼松

C: 吉西他滨

D: 奥沙利铂

答案：A

25. 镇静催眠药佐匹克隆的禁忌证是（）

A: 癫痫

B: 糖尿病

C: 低蛋白血症

D: 重症肌无力

答案：D

26. 壬二酸的作用特点不包括

A: 可竞争性抑制产生二氢睾酮的酶过程

B: 可直接抑制皮肤表面的细菌

C: 局部使用能显著减少滤泡内丙酸杆菌的生长

D: 对厌氧菌无抑制和杀灭作用

答案：D

27. 功能性子宫出血可选用的药物是

A: 缩宫素

B: 垂体后叶素

C: 他莫昔芬

D: 雌二醇

答案：D

28. 关于容积性泻药的叙述，错误的是

A: 主要用于轻度便秘患者的治疗

B: 促进钙和铁的吸收

C: 可能会影响华法林的吸收

D: 服用容积性泻剂的同时应摄入足够水分

答案：B

29. 下述可用于治疗甲氨蝶呤引起的巨幼红细胞性贫血的是

A: 叶酸+维生素 B

B: 亚叶酸钙

C: 维生素 B

D: 叶酸

答案：B

30. (2015 年真题) 应用曲妥珠单抗治疗乳腺癌前对患者必须进行基因筛查，筛查的项目是 ()。

A: 人表皮生长因子受体-2

B: B 淋巴细胞表面的 CD20 抗原

C: 表皮生长因子受体

D: 血管内皮生长因子

答案：A

31. 关于法莫替丁用药注意事项的说法,错误的是

A: 抑制肝脏细胞色素 P450 酶的活性, 从而影响茶碱、华法林、地西泮等药物的代谢

B: 肾功能不全患者需要减少给药剂量或延长给药间隔

C: 与西咪替丁相比, 对性激素的影响较轻

D: 以原形从肾脏排泄, 肾功能不全患者易造成药物在体内蓄积

答案：A

32. 强心苷的心脏毒性反应中最常见的心律失常是

A: 房性期前收缩

B: 二联律

C: 房颤

D: 室性期前收缩

答案：D

33. 患者, 男, 67 岁, 既往有癫痫病史。因感染性脑膜炎入院治疗, 在脑脊液标本的病原学结果回报之前, 可经验性选用的抗菌药物是 ()

A: 亚胺培南西司他丁

B: 米诺环素

C: 卡泊芬净

D: 头孢曲松

答案：D

34. (2015 年真题) 长期使用可使血钾水平升高的药品是 () 。

- A: 氨苯蝶啶
- B: 呋塞米
- C: 乙酰唑胺
- D: 呋达帕胺

答案：A

35. 同时抑制 5-HT 及去甲肾上腺素（NE）再摄取而起到抗抑郁作用的药物是（）

- A: 马普替林
- B: 帕罗西汀
- C: 度洛西汀
- D: 吗氯贝胺

答案：C

36. （2016 年真题）具有杀灭痤疮丙酸杆菌作用，用于治疗痤疮的药品是

- A: 异维 A 酸
- B: 过氧苯甲酰
- C: 维 A 酸
- D: 阿达帕林

答案：B

37. 患者，男，60 岁诊断为房性心律失常，医生给予胺碘酮治疗。近日，因胃溃疡开始用西咪替丁，出现窦性心动过缓症状。胺碘酮典型不良反应（）。

- A: ②④⑤
- B: ③④⑤
- C: ①③⑤

D: ①②④⑤

答案：D

38. 门冬酰胺酶能抑制蛋白质的合成，使细胞停止于()，从而降低其对甲氨蝶呤的敏感性，限制甲氨蝶呤的骨髓毒性

A: G

B: M 期

C: G

D: G

答案：D

39. 糖尿病患者应慎用的高效能利尿剂是()

A: 阿米洛利

B: 氢氯噻嗪

C: 呋塞米

D: 乙酰唑胺

答案：C

40. 具有强大的抗凝血因子 XA 功能及微弱的抗凝血酶作用,可用于预防深静脉血栓形成的药物是()

A: 尿激酶

B: 阿加曲班

C: 华法林

D: 那屈肝素钙

答案：D

41. 下列哪种药物与碳酸钙合用时，易发生高钙血症

A: 氧化镁

B: 四环素类

C: 阿莫西林

D: 噻嗪类利尿剂

答案：D

42. 特布他林属于

A: 白三烯调节剂

B: β 肾上腺素受体激动剂

C: M 胆碱受体阻断剂

D: 黄嘌呤类药物

答案：B

43. 属于第二代 CCB 的是

A: 乐卡地平

B: 左旋氨氯地平

C: 硝苯地平控释片

D: 氨氯地平

答案：C

44. 下列药物中,属于抗乙型肝炎病毒的药物是()

A: 齐多夫定

B: 阿德福韦酯

C: 喷昔洛韦

D: 奥司他韦

答案：B

45. 呆小病宜选用

A: 甲状腺片

- B: 硫脲类
- C: 普萘洛尔
- D: 硫脲类+大剂量碘

答案：A

46. 属于雌激素受体拮抗剂的抗肿瘤药是

- A: 阿那曲唑
- B: 炔雌醇
- C: 他莫昔芬
- D: 丙酸睾酮

答案：C

47. 氯霉素类

- A: 禁用于早产儿、新生儿
- B: 禁用于胆道阻塞患者
- C: 禁用于 8 岁以下儿童
- D: 禁用于 18 岁以下儿童及青少年

答案：A

48. 下列药物中，能促进食物消化的药物是

- A: 雷尼替丁
- B: 兰索拉唑
- C: 胶体果胶铋
- D: 乳酶生

答案：D

49. 对肾功能影响较小的抗高血压药是

- A: 利血平

B: 胍屈嗪

C: 卡托普利

D: 胍乙啶

答案：B

50. 在动物骨髓造血组织中含量较多，有促进白细胞增生及抗放射线作用的是

A: 丙酸诺龙

B: 维生素 B₄

C: 小檗胺

D: 鲨肝醇

答案：D

51. 由于分子结构上的差异，导致铂类化合物的各自毒性亦有所区别典型不良反应为恶心、呕吐、肾毒性和耳毒性的是

A: 顺铂

B: 奥沙利铂

C: 卡铂

D: 亚叶酸钙

答案：A

52. 甲氧苄啶联用环孢素使

A: 白细胞减少风险增加

B: 肾毒性增加

C: 抗凝作用增强

D: 半衰期缩短

答案：B

53. 大剂量糖皮质激素冲击疗法用于

- A: 顽固性支气管哮喘
- B: 湿疹
- C: 变态反应性疾病
- D: 中毒性感染和休克

答案：D

54. 可干扰细菌 DNA 回旋酶或拓扑异构酶Ⅳ，影响细菌 DNA 合成的药物是

- A: 多黏菌素
- B: 庆大霉素
- C: 环丙沙星
- D: 替加环素

答案：C

55. 严格控制用药剂量和用药时间可以避免产生

- A: 副作用
- B: 毒性反应
- C: 继发反应
- D: 变态反应

答案：B

56. 不属于氨基糖苷类的是

- A: 庆大霉素
- B: 妥布霉素
- C: 新霉素
- D: 异烟肼

答案：D

57. 下列药物中不属于治疗疥疮的是

- A: 林旦霜
- B: 克罗米通
- C: 硫黄软膏
- D: 过氧苯甲酰

答案：D

58. 氢氯噻嗪的利尿作用机制是

- A: 对抗醛固酮的 K
- B: 抑制远曲小管近端的 Na
- C: 抑制肾小管碳酸酐酶
- D: 抑制髓袢升支粗段的 Na

答案：B

59. 患者，女，49 岁，间断上腹部饱胀、恶心 1 年。患者 1 年前无明显诱因出现恶心、上腹饱胀感，自行服用胃药（具体不详）治疗后症状好转。2 个月前患者上述症状再次发作，查体：上腹部轻微压痛，无反跳痛。胃镜、腹部 B 超检查未见明显异常。诊断：功能性消化不良。

医嘱：枸橼酸莫沙必利片，5mg，口服，3 次/日。

- A: 可作为术后预防呕吐的常规用药
- B: 对化疗所致的呕吐有效
- C: 无心脏不良反应
- D: 对泌乳素的分泌无影响

答案：D

60. 可用于金黄色葡萄球菌等革兰阳性菌所致严重感染的是

- A: 磷霉素氨丁三醇

- B: 利奈唑胺+苯丙醇胺
- C: 利奈唑胺+哌替啶
- D: 磷霉素钠+万古霉素

答案：D

61. (2019 年真题) 体内代谢迅速，严重过量导致出血时，可用鱼精蛋白拮抗的药物是 ()

- A: 依诺肝素
- B: 氯吡格雷
- C: 阿司匹林
- D: 肝素

答案：D

62. 临床上用于治疗躁狂症的是

- A: 硫酸镁
- B: 卡巴西平
- C: 苯妥英钠
- D: 苯巴比妥

答案：B

63. 以下不属于胰岛素不良反应的是

- A: 高钾血症
- B: 皮下硬结
- C: 脂肪萎缩与肥厚
- D: 低血糖

答案：A

64. 易致血糖异常的药物是

- A: 红霉素
- B: 青霉素
- C: 氯霉素
- D: 加替沙星

答案：D

65. 男性，70 岁，进食后饱胀不适伴反酸 5 年余，黑便 1 天。胃镜检查提示：胃多发性溃疡（A1 期）伴出血。

- A: 硝苯地平缓释片
- B: 胶体果胶铋胶囊
- C: 克拉霉素
- D: 埃索美拉唑

答案：D

66. 早产儿、妊娠后期及哺乳期妇女禁用下列哪种药物

- A: 红霉素
- B: 青霉素
- C: 氯霉素
- D: 罗红霉素

答案：C

67. 仅对浅表真菌感染有效的药物()

- A: 两性霉素 B
- B: 伊曲康唑
- C: 灰黄霉素
- D: 氟康唑

答案：C

68. 单纯性下尿路感染可选择的药物是

- A: 磷霉素氨丁三醇
- B: 利奈唑胺+苯丙醇胺
- C: 磷霉素钠+万古霉素
- D: 利奈唑胺+哌替啶

答案：A

69. 米非司酮避孕的主要机制是()

- A: 抑制乳腺泡发育
- B: 抑制受精卵着床
- C: 抑制胚胎发育
- D: 促进子宫内膜充血增厚

答案：B

70. 可杀灭疥虫的药物是

- A: 阿苯达唑
- B: 甲苯达唑
- C: 林旦
- D: 维 A 酸

答案：C

71. 属于贝丁酸类调节血脂药的是

- A: 依折麦布
- B: 非诺贝特
- C: 阿托伐他汀
- D: 阿昔莫司

答案：B

72. 呋塞米静脉注射用于儿童，一日最大量是

- A: 2mg / kg
- B: 6mg / kg
- C: 8mg / kg
- D: 4mg / kg

答案：B

73. (2017 年真题) 可以引起跟腱断裂, 血糖异常的药物是 ()

- A: 庆大霉素
- B: 甲矾霉素
- C: 多西环素
- D: 加替沙星

答案：D

74. 属于第一代喹诺酮类药物的是

- A: 萘啶酸
- B: 莫西沙星
- C: 吡哌酸
- D: 诺氟沙星

答案：A

75. 铋剂连续服用不得超过 2 个月，是因为长期服用可导致 ()

- A: 肝功能损害
- B: 大便呈黑色
- C: 神经毒性
- D: 舌苔变黑

答案：C

76. 一般反应较轻，仍可能引起过敏性休克的是

- A: 胰岛素
- B: 西格列汀
- C: 格列本脲
- D: 二甲双胍

答案：A

77. 有心肌梗死、脑梗死病史患者可以使用

- A: 芳基乙酸类
- B: 水杨酸类
- C: 芳基丙酸类
- D: 选择性 COX-2 抑制剂

答案：B

78. 关于乙酰半胱氨酸的说法，错误的是()

- A: 乙酰半胱氨酸可用于对乙酰氨基酚中毒解救
- B: 乙酰半胱氨酸能裂解脓痰中糖蛋白多肽链中的二硫键，使浓痰易于咳出
- C: 乙酰半胱氨酸能减弱青霉素类、头孢菌素类四环素类药物的抗菌活性
- D: 对痰液较多的患者，乙酰半胱氨酸可与中枢性镇咳药合用增强疗效

答案：D

79. 具有抗炎作用的他汀类调血脂药是

- A: 氟伐他汀
- B: 阿伐他汀
- C: 普伐他汀
- D: 藻酸双酯钠

答案：C

80. 不得与碱性物质或铁器接触的是()

- A: 克罗米通
- B: 阿达帕林
- C: 林旦霜
- D: 苯甲酸苄酯

答案：C

81. 用药后可使尿液呈橘红色的药物是

- A: 链霉素
- B: 利福平
- C: 异烟肼
- D: 乙胺丁醇

答案：B

82. 大剂量糖皮质激素冲击疗法用于()

- A: 抑制器官移植急性排斥危象
- B: 肾病综合征
- C: 湿疹
- D: 变态反应性疾病

答案：A

83. 连续使用应间隔 4 小时以上()

- A: 羟甲唑啉
- B: 赛洛唑啉
- C: 麻黄碱
- D: 酚甘油滴耳液

答案：A

84.（2018 年真题）仅用于绝经后妇女，不适用于男性患者的抗骨质疏松药物是（）

- A: 阿仑膦酸钠
- B: 雷洛昔芬
- C: 阿法骨化醇
- D: 骨化三醇

答案：B

85. 洛伐他汀的作用是（）

- A: 主要影响胆固醇合成
- B: 主要影响甘油三酯合成
- C: 影响脂蛋白合成、转运及分解
- D: 主要影响胆固醇吸收

答案：A

86. 蒽醌类抗肿瘤药柔红霉素可引起心脏毒性，临床应用的解毒方案是（）

- A: 在用柔红霉素同时，使用柔红霉素等量的右雷佐生
- B: 在用柔红霉素后 30min，使用柔红霉素 2 倍量的右雷佐生
- C: 在用柔红霉素前 30min，使用柔红霉素 10 倍量的右雷佐生
- D: 在用柔红霉素前 30min，使用柔红霉素 2 倍量的氟马西尼

答案：C

87.（2018 年真题）2 岁以下儿童用药可能会发生致死性肝损害，临床用药需要重点关注的抗癫痫药是（）

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 苯妥英钠

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/548064000045007022>