# 2022 护理学（师）相关专业知识真题精选

2022 护理学（师）相关专业知识真题精选

单选题 （共 86 题，共 86 分）

1.确诊化脓性脑膜炎的主要检查方法是（　　）。

A.血常规

B.血培养

C.脑脊液检查

D.脑电图检查

E.头颅 CT

2.少尿是指 24 小时尿量少于（　　）。

A.100ml

B.200ml

C.300ml

D.400ml

E.500ml

3.患者女，17 岁。月经周期长短不一，月经期有时持续 3 天，有时持续 2～3 周，出血量时多时少，上次月经后间隔 4 个月月经来潮，出血量多，血常规检查示中度贫血。临床诊断为（　　）。

A.痛经

B.有排卵性功血

C.继发性闭经

D.无排卵性功血

E.原发性闭经

4.对血液病诊断，最有价值的检查方法是（　　）。

A.CT

B.B超

C.X线检查

D.骨髓检查

E.肝功能检查

5.现场抢救一氧化碳中毒者的首选措施是（　　）。

A.给予吸氧

B.将其转移到空气新鲜处

C.使其平卧

D.给予脱水治疗

E.开放气道

6.患者男，27岁。近日体重逐渐下降，今日午后出现低热，咯血症状，立即来医院就诊。胸部CT示肺外围支气管末梢呈2～4mm，大小结节与树枝状的高密度影。结核菌素试验（PPD）阳性，该患者最可能的诊断是（　　）。

A.肺炎

B.肺气肿

C.支气管哮喘

D.肺结核

E.气胸

7.患者，女，40 岁，因严重感染入院。查体：T 39.5℃ P 90 次/分，R 25 次/分，BP 116/80mmHg，血气分析：PaO2 50mmHg，PaCO2 30mmHg，首先考虑为（　　）。

A.急性肾衰竭

B.急性呼吸窘迫综合征

C.弥散性血管内凝血

D.急性肝衰竭

E.急性心力衰竭

8.妊娠合并心脏病患者最易发生心力衰竭的时期是（　　）。

A.妊娠 32～34 周、分娩期及产褥期

B.妊娠 28～36 周

C.妊娠 28 周及分娩期

D.妊娠 28～30 周、分娩期及产褥期

E.分娩期及产褥期

9.特发性血小板减少性紫癜的首选治疗是（　　）。

A.脾切除

B.输血小板

C.大剂量免疫球蛋白

D.糖皮质激素

E.免疫抑制剂

10.输尿管结石的表现特点是（　　）。

A.少尿无尿

B.肾后性肾功能不全

C.肾区包块

D.肾绞痛＋镜下血尿

E.肾盂积水

11.患者男，40 岁。肝硬化病史 2 年，高蛋白饮食后出现睡眠障碍，定向力减退，脑电图异常。下列治疗措施中，不正确的是（　　）。

A.精氨酸滴注

B.硫酸镁导泻

C.限制蛋白饮食

D.弱碱性溶液灌肠

E.乳果糖口服

12.患者男，21 岁。被车撞伤 4 小时，右上腹痛来诊。查体：血压 80/60mmHg，脉搏 120 次/分：右肋见擦皮伤，右上腹压痛明显，全腹轻度肌紧张，移动性浊音阳性，肠音弱；尿色正常。应首先进行的

检查是（　　）。

A.尿常规

B.腹腔穿刺

C.腹部 B 超

D.腹部 X线

E.腹部 CT

13.初产妇，27 岁。剖宫产术后 1 天，突然阴道大量流血，入院时血压 80/55mmHg，心率 110 次/分，血红蛋白 60g/L。首要的处理原则是（　　）。

A.加强宫缩

B.按摩子宫

C.静脉输入缩宫素

D.抢救休克

E.预防感染

14.急腹症诊断不明时，可采用的处理是（　　）。

A.抗休克

B.高压灌肠

C.低压灌肠

D.应用泻剂

E.应用止痛剂

15.患儿男，5 岁。幼儿园老师反映上课时不停摇椅，多跑动，不专心，不能完成手工作业，但智力正常。最可能的诊断是（　　）。

A.注意缺陷多动障碍

B.多发性神经根神经炎

C.大脑发育不全

D.脑性瘫痪

E.癫痫小发作

16.类风湿关节炎患者进行关节功能锻炼的最佳时期是（　　）。

A.恢复期

B.急性期

C.症状前期

D.病变后期

E.晨僵期

17.患者，女，56 岁。有风湿性心脏病病史。自诉心慌，心电图示：P 波消失，代之以间距、振幅不等的畸形波，QRS波正常，心率 132 次/分，R-R 间距绝对不等。该患者的心电图诊断为（　　）。

A.室性期前收缩

B.房性心动过速

C.心房扑动

D.房性期前收缩

E.心房颤动

18.大隐静脉曲张术后早期活动的主要目的是防止（　　）。

A.患肢淤血

B.患肢僵硬

C.术后复发

D.血栓形成

E.血管痉挛

19. 初筛大肠癌的检查方法是（　　）。

A.大便隐血检查

B.X线气钡造影

C.直肠检查

D.肠镜检查

E.CT检查

20.慢性呼吸衰竭患者出现的最早、最突出的症状是（　　）。

A.发绀

B.呼吸困难

C.精神神经症状

D.其他器官损害

E.心血管系统症状

21.门静脉高压患者出血后采取的措施，错误的是（　　）。

A.输血、输液

B.应用静脉止血药物

C.应用保肝药物

D.应用肥皂水灌肠

E.应用三腔二囊管压迫止血

22.水痘的皮疹特点是（　　）。

A.皮疹弥漫性红疹

B.疹间无正常皮肤

C.皮疹按斑疹、丘疹、疱疹、结痂的顺序演变

D.出血性皮疹

E.糠皮样脱屑

23.应用 β受体激动剂控制哮喘发作时，首选的给药方法是（　　）。

A.口服法

B.静脉滴注法

C.吸入法

D.肌内注射法

E.舌下含化法

24.前尿道结石的治疗，最常用的方法是（　　）。

A.多饮水、运动排石

B.体外震波碎石

C.尿道切开取石

D.中药排石

E.经尿道钩取或钳出结石

25.可进行膀胱镜检查的患者是（　　）。

A.膀胱结石

B.尿道狭窄

C.膀胱容量过小

D.严重的心功能不全

E.急性尿路感染

26.患者女，35 岁，因便意频繁、便前肛门下坠感、里急后重，排便不尽感来诊。对于诊断该病最重要且简单易行的检查是（　　）。

A.粪便隐血检查

B.内镜检查

C.直肠指检

D.CT检查

E.B超检查

27.阴道脱落细胞中发现不典型细胞，但无恶性特征细胞，属良性改变。按照巴氏分类法诊断属于（　　）。

A.Ⅰ级

B.Ⅱ级

C.Ⅲ级

D.℃

E.°级

28.肝硬化的腹水属于（　　）。

A.漏出液

B.渗出液

C.血性

D.脓性

E.乳糜性

29.确诊中毒型细菌性痢疾最有价值的检查是（　　）。

A.粪便镜检

B.血白细胞计数

C.粪便细菌培养

D.咽拭子细菌培养

E.血清特异性抗体检查

30.脓性指头炎及早切开的目的是（　　）。

A.防止全身感染

B.防止肿胀

C.防止指骨坏死

D.防止皮肤坏死

E.防止疼痛

31.　　）。

A.从胎儿娩出到胎盘娩出

B.从宫颈口开全到胎儿娩出

C.从有规律性宫缩到宫口开全

D.从有规律性宫缩到胎儿娩出

E.从有规律性宫缩到胎盘娩出

32.消化道下段出血时，粪便性状为（　　）。

A.鲜血便

B.黏液脓血便

C.柏油样便

D.果酱样便

E.暗红色便

33.患者男，33 岁。左胸部受伤后，烦躁不安，极度呼吸困难伴发绀。查体：脉搏 110 次/分，血压 80/60mmHg，左胸叩诊鼓音，呼吸音消失，左胸广泛皮下气肿。其首要的急救措施是（　　）。

A.吸氧

B.镇静止痛

C.穿刺排气

D.剖胸探查

E.补充血容量

34. 67 岁，尿频及排尿困难 5 年余，无心肺疾病，BP 160/100mmHg，诊断为良性前列腺增生，残余尿量 200ml，合适的治疗方法是（　　）。

A.α受体阻滞剂

B.经尿道高温治疗

C.体外高强度聚焦超声

D.经尿道前列腺电切术

E.开放式前列腺切除术

35.急性感染性多发性神经根神经炎患者脑脊液的典型改变是（　　）。

A.压力增高

B.均匀血性

C.氯化物减少

D.糖明显增多

E.蛋白-细胞分离

36.下列关于急性乳腺炎的治疗，错误的是（　　）。

A.停止哺乳

B.排空乳汁

C.局部冷敷

D.应用抗菌药物

E.理疗

37.　　25 岁。因咳嗽、咳痰 3 个月，咯血 1 周就诊。查体：背部可闻及固定且持久的局限性湿啰音，X 线显示双下肺肺纹理增粗，可见气道壁增厚。患者的初步诊断是（　　）。

A.支气管扩张

B.支气管炎

C.支气管哮喘

D.肺炎

E.肺结核

38.刚排出的尿液即有氨味，该患者是（　　）。

A.尿崩症

B.膀胱直肠瘘

C.慢性膀胱炎

D.糖尿病酮症

E.结直肠癌晚期

39.患者男，50 岁，外伤，一周后发生破伤风入院。对其治疗的关键环节是（　　）。

A.抗炎

B.镇痛解痉

C.中和血内游离毒素

D.扩容

E.

40.患者，女，30 岁。心脏瓣膜病二尖瓣狭窄 4 年，头晕、心悸、心前区不适 1 小时。查体：脉搏 90 次/分，心率 110 次/分，第一心音强弱不等，心率极不规则。心电图示 P 波消失，代之以大小形态不等及规律不一的 f 波，QRS波群形态正常。该患者可能发生了（　　）。

A.心房纤颤

B.心室颤动

C.房性期前收缩

D.室性期前收缩

E.窦性心律不齐

41.急性盆腔炎主要的治疗措施是（　　）。

A.手术治疗

B.支持治疗

C.抗生素治疗

D.物理治疗

E.中西医结合治疗

42.低钾血症最早出现的临床表现是（　　）。

A.肌无力

B.肠麻痹

C.心律失常

D.神志模糊或淡漠

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/548127132106006133