

2024 江西省乐安县《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题王牌题库（夺冠）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 不属于抗乙型肝炎病毒的药品

- A: 干扰素
- B: 泛昔洛韦
- C: 拉米夫定
- D: 恩替卡韦

答案：B

2. 纠正细胞内缺钾的是

- A: A 和 B 均无效
- B: 胰岛素
- C: 磺酰脲类
- D: 二甲双胍

答案：B

3. 高血压伴精神抑郁者不宜选用

- A: 尼莫地平
- B: 硝苯地平
- C: 普萘洛尔
- D: 利血平

答案：D

4. 关于普萘洛尔抗心律失常作用的描述，错误的是

- A: 增强交感神经效应
- B: 延长房室结的功能性不应期
- C: 阻滞 β 肾上腺素能受体
- D: 减慢心房和房室结的传导

答案：A

5. 患者女,32 岁,孕 2 周既往有癫痫病史长期服用卡马西平治疗为防止引起新生儿出血,该患者妊娠晚期应当补充的维生素是()

- A: 维生素 D
- B: 维生素 B12
- C: 维生素 K
- D: 叶酸

答案：C

6. 低剂量用药时对中枢和外周多巴胺 D2, 受体有拮抗作用, 而高剂量用药时有较弱的 5-HT₂受体阻断作用, 可用于化疗所致恶心呕吐的是

- A: 甲氧氯普胺
- B: 氯丙嗪
- C: 帕洛诺司琼
- D: 劳拉西泮

答案：A

7. 癫痫大发作合并小发作选用

- A: 苯巴比妥
- B: 乙琥胺
- C: 丙戊酸钠
- D: 苯妥英钠

答案：C

8. 用 1% 麻黄素液滴鼻的主要目的是

- A: 收缩鼻黏膜，抑制腺体分泌
- B: 收缩鼻黏膜，改善鼻通气和鼻窦引流
- C: 收缩血管，降低其通透性
- D: 收缩血管，减轻炎症反应

答案：B

9. 主要降低总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇的调血脂药是

- A: 依折麦布
- B: 利血平
- C: 阿昔莫司
- D: 瑞舒伐他汀

答案：D

10. β -内酰胺酶抑制剂的抑酶活性由强到弱的顺序是 ()

- A: 他唑巴坦>克拉维酸>舒巴坦
- B: 舒巴坦>他唑巴坦>克拉维酸
- C: 舒巴坦>克拉维酸>他唑巴坦
- D: 他唑巴坦>舒巴坦>克拉维酸

答案：A

11. 不宜与三环类抗抑郁药合用的药物是

- A: 赛洛唑啉滴鼻液
- B: 羟甲唑啉滴鼻液
- C: 酚甘油滴耳液
- D: 麻黄碱滴鼻液

答案：D

12. 用药过程中需要监护迟发性腹泻的是()

- A: 伊立替康
- B: 紫杉醇
- C: 长春碱类
- D: 多柔比星

答案: A

13. 患者，女性，63 岁，诊断为支气管哮喘急性发作，使用布地奈德、沙丁胺醇吸入、氨茶碱静脉滴注治疗。

- A: 增加 25%
- B: 减少 50%
- C: 增加 10%
- D: 减少 25%

答案: B

14. 硫酸亚铁临床应用

- A: 缺血性脑卒中
- B: 急性中性粒细胞减少症
- C: 失去药效
- D: 缺铁性贫血

答案: D

15. 利福平与口服避孕药合用()

- A: 代谢加快而失效
- B: 子宫内膜突破性出血
- C: 代谢加速而导致意外怀孕
- D: 抑制排酸作用

答案：C

16. 对抗新产生的血栓应首选

- A: 尿激酶
- B: 肝素
- C: 右旋糖酐
- D: 华法林

答案：A

17. 氢氯噻嗪的利尿作用机制是

- A: 抑制远曲小管近端的 Na
- B: 对抗醛固酮的 K
- C: 抑制肾小管碳酸酐酶
- D: 抑制髓袢升支粗段的 Na

答案：A

18. 适用于心功能比较稳定的 II ~ III 级心力衰竭患者的是

- A: 米力农
- B: 卡维地洛
- C: 氯沙坦
- D: 氢氯噻嗪

答案：B

19. 患者，男，63 岁，2 型糖尿病病史 20 年，现服用二甲双胍 0.5g，一日 3 次；阿卡波糖 0.1g，一日 3 次；吡格列酮 30mg，一日 1 次。既往高血压病史 5 年，冠心病病史 5 年，心功能 I 级轻度肾功能不全，长期服用贝那普利和阿司匹林。

- A: 静脉用药剂量为口服的 1 / 2 时即可达到同样疗效

B: 肠道外用药宜静脉给药，不主张肌肉注射

C: 应用前应询问药物过敏史，对磺胺药过敏者不宜使用

D: 静脉注射时宜用葡萄糖注射液稀释

答案：D

20. 下列哪种药物属于抑菌药

A: 青霉素 G

B: 庆大霉素

C: 头孢氨苄

D: 四环素

答案：D

21. 患儿，男，5 日。昨起拒食、反应差，今日皮肤明显黄染入院。体检：颈周、前胸多个小脓疱，心肺无异常，肝右肋下 2.5cm，脾肋下 1cm，诊断为新生儿败血症，给予头孢曲松治疗。

A: 新生儿肝功能未发育完全，不宜使用头孢曲松

B: 新生儿肾功能未发育完全，不宜使用头孢曲松

C: 新生儿对头孢曲松不敏感

D: 新生儿出现明显皮肤黄染时，不宜使用头孢曲松

答案：D

22. 以上属于阿片类药物严重戒断症状的是

A: 神经过敏、失眠、恶心、呕吐

B: 胃痉挛、心动过速、极度疲乏

C: 惊厥、震颤、反射加速、发热

D: 哈欠、打喷嚏、流涕、出汗

答案：B

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

23. (2018 年真题) 可抑制粒细胞浸润和白细胞趋化,用于痛风急性发作的药物是 ()

- A: 秋水仙碱
- B: 苯溴马隆
- C: 非布索坦
- D: 别嘌醇

答案: A

24. (2017 年真题) 属于中枢和外周多巴胺 D2 受体阻断剂,具有镇吐、刺激泌乳素释放的促胃肠动力药是 ()

- A: 多潘立酮
- B: 昂丹司琼
- C: 甲氧氯普胺
- D: 莫沙必利

答案: C

25. 患者,女,55 岁,临床诊断为 2 型糖尿病。目前药物治疗方案如下:

- A: 服药期间不要饮酒,以免引起低血糖
- B: 定期监测血清维生素 B12 水平
- C: 可能出现的不良反应有腹痛,腹泻,腹胀
- D: 服药通常需 3-4 周的治疗才达降糖疗效

答案: D

26. 下列对利奈唑胺药理作用与作用机制的描述,错误的是

- A: 抑制 mRNA 与核糖体连接
- B: 与细菌核糖体 50S 亚单位结合
- C: 与细菌核糖体 30S 亚单位结合

D: 阻止 70S 起始复合物的形成

答案：C

27. 具有中枢和外周抗多巴胺双重作用的是

A: 西沙必利

B: 多潘立酮

C: 莫沙必利

D: 甲氧氯普胺

答案：D

28. 属于广谱Ⅲ类抗心律失常药的是

A: 胺碘酮

B: 苯妥英钠

C: 利多卡因

D: 维拉帕米

答案：A

29. 主要通过选择性抑制 5-HT 再摄取而起到抗抑郁作用的药物是 ()

A: 度洛西汀

B: 马普替林

C: 帕罗西汀

D: 吗氯贝胺

答案：C

30. 叶酸主要用于治疗

A: 溶血性贫血

B: 再生障碍性贫血

C: 缺铁性贫血

D: 妊娠期巨幼红细胞性贫血

答案: D

31. 属于 β 受体激动剂的非强心苷类正性肌力药是

A: 地高辛

B: 多巴酚丁胺

C: 依那普利

D: 米力农

答案: B

32. 下列药物中，与维生素 D 合用能出现高钙血症的药物是

A: 氢氯噻嗪

B: 硫酸铝

C: 考来烯胺

D: 矿物油

答案: A

33. 氯霉素属于

A: 氨基糖苷类

B: 四环素类

C: β -内酰胺类

D: 酰胺醇类

答案: D

34. 我国研制的可用于抗氯喹恶性疟和恶性疟脑型凶险发作的药物是

A: 磷酸咯萘啶

B: 伯氨喹

C: 青蒿素

D: 乙胺嘧啶

答案: A

35. 氯吡格雷临床应用

A: 失去药效

B: 缺血性脑卒中

C: 缺铁性贫血

D: 急性中性粒细胞减少症

答案: B

36. 不能减小前列腺的体积,也不能降低 PSA 水平但可松弛前列腺平滑肌,缓解膀胱和下尿道急性症状的药物是()

A: 他达拉非

B: 西地那非

C: 非那雄胺

D: 坦索罗辛

答案: D

37. (2016 年真题) 可使血小板内环磷腺苷 (cAMP) 浓度增高而产生抗血小板作用的药品是

A: 阿司匹林

B: 双嘧达莫

C: 替罗非班

D: 氯吡格雷

答案: B

38. 服用抗帕金森病药恩他卡朋的患者, 其尿液可变成

A: 红棕色

B: 蓝绿色

C: 深蓝色

D: 淡绿色

答案：A

39. 毒性较大，尤其对第Ⅷ对脑神经和肾损害严重的药物是

A: 异烟肼

B: 对氨基水杨酸

C: 利福平

D: 卡那霉素

答案：D

40. 患者，男性，26岁，因“咳嗽伴间断发热1周”入院，查体：T38.9℃，P90次/分，R21次/分，BP110/70mmHg，血常规：白细胞 $16.9 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比84.6%；胸部CT示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”。

A: 万古霉素是浓度依赖性抗菌药物

B: 在使用万古霉素的第4个维持剂量给药前测定谷浓度

C: 该万古霉素浓度偏低

D: 该患者用法不能维持全天稳定的血药浓度

答案：A

41. 属于Ⅰ类抗心律失常药且能引起金鸡纳反应的是()

A: 利多卡因

B: 奎尼丁

C: 胺碘酮

D: 普萘洛尔

答案：B

42. 患者女性，30 岁。以肺结核收治入院，给予抗结核治疗，链霉素肌肉注射后，10 分钟后患者出现头晕、耳鸣、乏力、呼吸困难等症状，继而出现意识模糊、晕倒、血压下降、心律失常等症状。

- A: 利多卡因
- B: 葡萄糖
- C: 葡萄糖酸钙
- D: 胺碘酮

答案：C

43. 急性室性心律失常可选用

- A: 硝苯地平
- B: 利多卡因
- C: 阿托品
- D: 美西律

答案：B

44. 低剂量可提供接近全效降压作用的药物是

- A: 氨苯蝶啶
- B: 阿米洛利
- C: 氢氯噻嗪
- D: 螺内酯

答案：C

45. 偏头痛，三叉神经痛选用

- A: 布桂嗪
- B: 佐匹克隆
- C: 丙戊酸钠

D: 多奈哌齐

答案: A

46. 属于 β_2 受体激动剂的平喘药是()

A: 茶碱

B: 孟鲁司特

C: 沙美特罗

D: 噻托溴铵

答案: C

47. (2020 年真题) 在体内主要经 CYP3A4 代谢的质子泵抑制剂是

A: 米索前列醇

B: 枸橼酸铋钾

C: 兰索拉唑

D: 铝碳酸镁

答案: C

48. (2018 年真题) 主要用于青光眼急性发作短期控制的药物是 ()

A: 布美他尼

B: 乙酰唑胺

C: 依他尼酸

D: 依托塞米

答案: B

49. 患者，男，41 岁。有吸烟史，间断少量饮酒。因“嗝气、反酸、上腹部疼痛”就诊。经查，医师诊断为“反流性食管炎”此时应给予治疗的药物是

A: 昂丹司琼

- B: 泮托拉唑
- C: 雷尼替丁
- D: 东莨菪碱

答案：C

50. 头孢噻吩

- A: 肾毒性较大
- B: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染
- C: 用于非典型病原体感染
- D: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注

答案：A

51. 抑制 HIV 整合酶的催化活性，可防止感染早期 HIV 基因组共价插入或整合到宿主细胞基因组上，该类药物是

- A: 整合酶抑制剂
- B: 蛋白酶抑制药
- C: 非核苷类反转录酶抑制药
- D: 核苷类反转录酶抑制药

答案：A

52. 下述关于抗皮肤寄生虫感染药物的描述中，不正确的是()

- A: 升华硫具有杀灭细菌、真菌及寄生虫的作用
- B: 克罗米通具有局部麻醉作用
- C: 苯甲酸苄酯高浓度可杀灭疥虫
- D: 林旦是杀灭疥虫的有效药物，但不能灭虱卵

答案：D

53. 根据糖皮质激素分泌的昼夜节律，慢性病治疗如何给药对下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴的抑制较轻

- A: 下午 4 时左右
- B: 上午 8 时左右
- C: 晚餐前
- D: 中午 12 时左右

答案：B

54. 治疗心绞痛急性发作的首选药物是()

- A: 地尔硫
- B: 维拉帕米
- C: 普萘洛尔
- D: 硝酸甘油

答案：D

55. 促消化的药物应()

- A: 空腹内服
- B: 饭前内服
- C: 定时内服
- D: 睡前内服

答案：B

56. 长期使用可引起骨质疏松的药物是

- A: 依替膦酸二钠
- B: 甲状腺素
- C: 胰岛素
- D: 糖皮质激素

答案：D

57. 红霉素在下列哪种组织中浓度较低

- A: 肝
- B: 肺
- C: 脑
- D: 胆汁

答案：C

58. (2019 年真题) β -内酰胺酶抑制剂的抑酶活性由强到弱的顺序是
()

- A: 舒巴坦>克拉维酸>他唑巴坦
- B: 他唑巴坦>舒巴坦>克拉维酸
- C: 舒巴坦>他唑巴坦>克拉维酸
- D: 他唑巴坦>克拉维酸>舒巴坦

答案：D

59. 放线菌素 D 的主要作用环节在

- A: G
- B: G
- C: S 期
- D: M 期

答案：B

60. 用于青春期前隐睾症的诊断和治疗的是

- A: 绒促性素
- B: 米非司酮
- C: 噻嘧啶
- D: 硝苯地平

答案：A

61. 米索前列醇可以

A: 在胃内直接中和胃酸

B: 竞争性的拮抗组胺与胃壁细胞上的 H 受体结合，抑制基础胃酸分泌及由组胺和食物刺激后引起的胃酸分泌

C: 与前列腺素 E 受体结合，降低胃壁细胞的胃酸分泌

D: 抑制 H⁺，K⁺-ATP 酶活性，使壁细胞内的 H⁺不能转运到胃腔中，阻断了胃酸分泌的最后步骤

答案：C

62. 噻嗪类利尿药可用于治疗肾性尿崩症及加压素无效的垂体性尿崩症，是因为其可以抑制

A: 远曲小管近端

B: Na⁺-K⁺-2Cl⁻同向转运子

C: Na⁺-Cl⁻共转运子

D: 磷酸二酯酶

答案：D

63. 肾上腺皮质功能不全采用

A: 早期、大剂量、短期应用糖皮质激素

B: 抗结核药与糖皮质激素合用

C: 糖皮质激素替代疗法

D: 抗菌药物与糖皮质激素合用

答案：C

64. 小剂量时有抑制血栓形成作用的是

A: 塞来昔布

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 吲哚美辛

C: 对乙酰氨基酚

D: 阿司匹林

答案: D

65. (2016 年真题) 对血小板聚集及凝血机制无影响的药品是

A: 罗非昔布

B: 阿司匹林

C: 对乙酰氨基酚

D: 吲哚美辛

答案: C

66. 下述药物不属于消毒防腐药的是()

A: 酚甘油

B: 盐酸麻黄碱溶剂

C: 过氧化氢溶剂

D: 硼酸溶剂

答案: B

67. 流行性脑脊髓膜炎首选药是

A: 柳氮磺吡啶

B: 磺胺甲

C: 磺胺米隆

D: 磺胺嘧啶

答案: D

68. (2018 年真题) 用青霉素治疗梅毒、钩端螺旋体病时能出现寒战、咽痛、心率加快等症状,其原因可能是大量病原体被杀灭后出现的全身性反应,这种反应称为 ()

- A: 赫氏反应
- B: 金鸡纳反应
- C: 青霉素脑病
- D: 瑞夷综合征

答案: A

69. (2020 年真题) 患者,女,26 岁。因心悸、手颤、易饥饿、烦躁易怒前来就诊,实验室检查游离甲状腺素(FT₃、FT₄)增高、促甲状腺素(TSH)降低,诊断为甲状腺功能亢进症。医师处方给予抗甲状腺药治疗。

- A: 利多卡因
- B: 碘化钾
- C: 特布他林
- D: 普萘洛尔

答案: D

70. 典型失神性发作(小发作)首选()。

- A: 氯巴占
- B: 乙琥胺
- C: 奥卡西平
- D: 苯妥莫钠

答案: B

71. 胆绞痛最好选用

- A: 阿托品

B: 阿司匹林

C: 吗啡

D: 阿托品+哌替啶

答案: D

72. 异丙托溴铵的作用机制是

A: 阻断白三烯受体

B: 阻断 M 受体

C: 抑制磷酸二酯酶

D: 阻断 α 受体

答案: B

73. 临床常用的巨幼红细胞性贫血治疗药物是

A: 维生素 B12

B: 肝素

C: 香豆素类

D: 维生素 K

答案: A

74. 新斯的明治疗重症肌无力的机制是

A: 增强运动神经乙酰胆碱合成

B: 抑制胆碱酯酶和兴奋骨骼肌 N 胆碱受体

C: 对大脑皮质有兴奋作用

D: 兴奋骨骼肌中 M 胆碱受体

答案: B

75. 为了保护亚胺培南，防止其在肾中破坏，应与其配伍的药物是()

A: 他唑巴坦

- B: 舒巴坦
- C: 克拉维酸
- D: 西司他丁

答案：D

76. 对氨基水杨酸的抗结核杆菌作用原理是

- A: 抑制结核杆菌叶酸的代谢
- B: 抑制蛋白质合成
- C: 抑制 RNA 多聚酶
- D: 抑制分枝菌酸合成

答案：A

77. 阿托品禁用于

- A: 遗尿症
- B: 全身麻醉前给药
- C: 青光眼
- D: 胆绞痛

答案：C

78. 主要不良反应为踝部关节水肿的药物是()

- A: 氨氯地平
- B: 硝酸甘油
- C: 哌唑嗪
- D: 依那普利

答案：A

79. 对呼吸无抑制的外周性镇咳药是

- A: 右美沙芬

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: N-乙酰半胱氨酸

C: 苯丙哌林

D: 可待因

答案: C

80. 下列药物中不用于抗心律失常的是

A: 单硝酸异山梨酯

B: 比索洛尔

C: 胺碘酮

D: 美西律

答案: A

81. 对阴道滴虫有很好疗效的是

A: 链霉素

B: 甲硝唑

C: 青蒿素

D: 二氯沙奈

答案: B

82. 与鲑降钙素合用，有可能急速降血钙，出现严重低钙血症的是

A: 维生素 D

B: 钙剂

C: 铁剂

D: 阿仑膦酸钠

答案: D

83. 关于胺碘酮的描述，正确的是()

A: 只对室性心动过速有效

- B: 只对室上性心动过速有效
- C: 特异性针对房颤有效
- D: 对室上性和室性心动过速都有效

答案：D

84. 属于耐酸耐酶的青霉素类药物是()

- A: 青霉素
- B: 甲氧西林
- C: 丙匹西林
- D: 阿莫西林

答案：B

85. 用于颅脑损伤的氨基酸制剂的是()

- A: 赖氨酸注射液
- B: 复方氨基酸注射液(20AA)
- C: 复方氨基酸注射液(18AA)
- D: 丙氨酰谷氨酰胺注射液

答案：A

86. 小剂量雌激素用于

- A: 痛经
- B: 绝经期综合征
- C: 回奶
- D: 再生障碍性贫血

答案：B

87. 下列不属于一线抗结核药的是

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 利福平

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/548135113042007022>