

2024 年山东省安丘市《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试真题附答案【培优 B 卷】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 6 个月～2 岁儿童 WBC 计数正常参考区间是

- A: $(4.0 \sim 10.0) \times 10$
- B: $(200 \sim 300) \times 10$
- C: $(11.0 \sim 12.0) \times 10$
- D: $(100 \sim 300) \times 10$

答案：C

2. 告知"培高利特致心脏瓣膜病风险已经撤市"属于

- A: 禁忌证
- B: 药品不良反应
- C: 合理用药信息
- D: 药物相互作用

答案：B

3. 妊娠后 3～5 周服用容易导致胎儿出现肢体、耳、内脏畸形的药物是

- A: 氯霉素
- B: 沙利度胺
- C: 四环素
- D: 叶酸拮抗剂

答案：B

4. 患者，男，68 岁，既往体健，因“受凉后咳嗽、咳黄脓痰，伴发热 2 天”入院。查体：体温 39.1℃，血压 138 / 80mmHg，心率 102 次 / 分，呼吸 32 次 / 分，左肺可闻及湿性啰音。化验结果：白细胞计数 $11.2 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 85%。胸部 x 线：左肺下叶渗出性阴影。痰培养结果待归。入院诊断：社区获得性肺炎。

- A: 病情稳定后可从静脉给药转为口服序贯治疗
- B: 在病原学送检后，可立即实施经验性抗感染治疗
- C: 抗菌药物应持续用至胸部 X 线病灶完全吸收
- D: 当体温正常 48~72h 且达到肺炎临床稳定标准后，可停用抗菌药物

答案：C

5. 促进尿酸排泄，用于痛风慢性期，应早餐后服用的药物是

- A: 枸橼酸氢钾钠
- B: 非布司他
- C: 拉布立酶
- D: 苯溴马隆

答案：D

6. 苯二氮

- A: 阿戈美拉汀
- B: 米氮平
- C: 唑吡坦
- D: 艾司唑仑

答案：D

7. 滴虫性阴道炎宜选用

- A: 制霉菌素
- B: 甲硝唑

C: 庆大霉素

D: 林可霉素

答案: B

8. 成年人血清中低密度脂蛋白胆固醇含量是

A: 3.1~5.7mmol / L

B: 2.1~3.1mmol / L

C: 1.03~2.07mmol / L

D: 0.56~1.70mmol / L

答案: B

9. 经皮下注射，主要用于控制一餐饭后高血糖的胰岛素制剂是

A: 低精蛋白锌胰岛素

B: 门冬胰岛素

C: 精蛋白锌胰岛素

D: 地特胰岛素

答案: B

10. 每日分泌量相近，清晨始升高，午后达高峰，凌晨跌低谷，是

A: 胃酸的分泌

B: 胰岛 B 细胞

C: 肝脏合成胆固醇

D: 糖皮质激素的分泌

答案: B

11. 处方中“溶液”的规范书写是

A: Dos

B: Liq

C: Mist

D: Dil

答案：B

12. 照料、监督记忆力差的老年患者用药

A: 使用分时药盒和用药记录

B: 针对患者生理及心理特点选药

C: 简化治疗方案

D: 使患者了解药物的重要性

答案：A

13. 主要不良反应为锥体外系反应的是

A: 甲氧氯普胺

B: 多潘立酮

C: 西沙必利

D: 莫沙必利

答案：A

14. 根据《中华人民共和国药典临床用药须知》，使用前必须做皮试的药物是

A: 克林霉素

B: 维生素 K1

C: 红霉素

D: 氨苄西林

答案：D

15. 患者，女，8岁，体重22kg，因出现咳嗽、呼吸困难急诊就诊，症状在2天内逐步加重。出现这些症状前，先出现病毒性上呼吸道感染的症状（咽喉痛、流涕和咳嗽）3天。在过去的2年，患者有过几次急性支气管炎发作，并在3个月前因肺炎住院。患者目前未接受任何药物治疗。查体：中度呼吸窘迫伴呼气喘鸣音，偶尔咳嗽，呼气相延长，胸部过度膨胀，胸骨上窝、锁骨上窝和肋间隙凹陷。听诊时可闻及双侧吸气和呼气喘鸣声，左侧呼吸音减弱。呼吸30次/分、血压110/83mmHg、心率130次/分、体温37.8℃，动脉血气分析血氧饱和度（SaO₂）90%。

- A: 沙丁胺醇静脉注射
- B: 雾化沙丁胺醇
- C: 孟鲁司特咀嚼片
- D: 茶碱片

答案：B

16. 硫酸镁用于救治中毒导泻，适宜

- A: 吸入给药
- B: 口服给药
- C: 肌肉注射
- D: 直肠给药

答案：B

17. 应用华法林抗凝过程中，出现严重出血时，可应用急救的药物是

- A: 维生素B₁
- B: 维生素K₁
- C: 维生素K₄
- D: 维生素K₃

答案：B

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

18. 选择合适药物的首要标准是

- A: 药物治疗的安全性
- B: 药物治疗的方便性
- C: 药物治疗的有效性
- D: 药物治疗的规范性

答案：C

19. 有利于创面及溃疡的愈合，葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症（有溶血性贫血倾向）患者禁用的药品是

- A: 酞丁安滴眼液
- B: 硫酸锌滴眼液
- C: 磺胺醋酰钠滴眼液
- D: 红霉素眼膏

答案：B

20. 患者，男，58岁，因心前区疼痛5年，加重伴呼吸困难入院。入院前6年常感心前区疼痛，疼痛性质系紧缩性或压迫感，多于劳累、餐后发作，每次持续3~5min，休息后减轻。入院检查：体温37.8℃，心率130次/分，血压80/40mmHg；呼吸急促，颈静脉稍充盈，双肺底部可闻及湿啰音，心界向左侧扩大，心音减弱。入院诊断为冠心病。

- A: 发作时可舌下含服作用较快的硝酸酯类制剂
- B: 严重主动脉瓣狭窄或肥厚型梗阻性心肌病的心绞痛患者优先使用硝酸酯类药物
- C: 阿司匹林是常用药物，主要不良反应为胃肠道出血或对阿司匹林过敏
- D: 稳定型心绞痛患者合并高血压、糖尿病、心力衰竭可选用卡托普利、依那普利等药物

答案：B

21. 治疗中度痤疮宜选用()

- A: 阿昔洛韦软膏
- B: 复方苯甲酸酊
- C: 氢化可的松软膏
- D: 维 A 酸乳膏

答案: D

22. 儿科用药中，最方便、最安全、最经济的给药途径是

- A: 静脉滴注
- B: 口服给药
- C: 肌肉注射
- D: 静脉注射

答案: B

23. 下列药物属于容积性泻药的是

- A: 欧车前
- B: 聚乙二醇
- C: 多库酯
- D: 乳果糖

答案: A

24. 关于治疗药物监测的论述，错误的是

- A: 治疗药物监测可以实现给药个体化
- B: 是临床药学服务的重要内容之一
- C: 所有的治疗药物都必须进行监测
- D: 治疗药物监测的常用英文缩写是“TDM”

答案: C

25. 餐后血糖升高为主，伴餐前血糖轻度升高的 2 型糖尿病患者首选

- A: 比格列酮
- B: 二甲双胍
- C: 阿卡波糖
- D: 格列喹酮

答案：A

26. 血栓性疾病患者的凝血酶原时间可能短于

- A: 16 秒
- B: 18 秒
- C: 10 秒
- D: 12 秒

答案：D

27. 口服或静滴 β 受体阻断剂用于解救

- A: 麦角胺中毒
- B: 亚硝酸盐中毒
- C: 瘦肉精中毒
- D: 异烟肼中毒

答案：C

28. 关于奥利司他说法错误的是

- A: 可干扰维生素的吸收
- B: 进餐时服用
- C: 对肝脏无影响
- D: 应在服药前 2h 补充维生素

答案：C

29. 患者，男，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

- A: 下肢深静脉血栓形成
- B: 病理性骨折
- C: 肺动脉栓塞
- D: 下肢动脉栓塞

答案：A

30. 可吸附砷、沉淀汞的是

- A: 3%~5%鞣酸溶液
- B: 鸡蛋白
- C: 1%氯化钠溶液
- D: 药用炭混悬液

答案：B

31. 抗过敏药可以治疗荨麻疹，可是驾车、高空作业、精密机械操作者服用后应休息

- A: 6 小时以上
- B: 5 小时以上
- C: 3 小时以上
- D: 4 小时以上

答案：A

32. 可引起驾驶员视物模糊的药物是

- A: 双嘧达莫
- B: 阿米洛利
- C: 抗过敏药
- D: 东莨菪碱

答案：D

33. 头孢菌素注射剂作为皮肤过敏试验的浓度是

A: 100 $\mu\text{g} / \text{ml}$

B: 750 μ / ml

C: 500 $\mu\text{g} / \text{ml}$

D: 250 $\mu\text{g} / \text{ml}$

答案：C

34. PDR 是由美国医学经济公司和 ThomsonHealthcare 公司编辑出版的药品集，每年综合汇编 1 册，主要介绍

A: 各国市场上的常用处方药

B: 美国市场上的药品

C: 美国市场上的常用处方药

D: 美国临床常用的药品

答案：C

35. 适用于有完整子宫，仍希望有月经样出血的妇女

A: 单纯雌激素补充治疗

B: 单纯孕激素补充治疗

C: 雌孕激素序贯用药

D: 雌孕激素连续联合用药

答案：C

36. 某患者，女性，28 岁，近半年出现面色苍白、头晕、乏力，近日头晕加重，并出现心慌、气短，到医院就诊，血常规检查示 $\text{Hb} < 90\text{g} / \text{L}$ 。

A: 睡前

B: 餐后

C: 餐前

D: 清晨

答案: B

37. 妊娠期使用某些药物可能导致胎儿发育异常，其中最易受到药物影响，可能产生形态或者功能上异常而造成胎儿畸形的阶段是：

A: 妊娠 13~27 周

B: 妊娠 27~32 周

C: 妊娠 1~2 周

D: 妊娠 3~12 周

答案: D

38. 患儿，女，4 岁半。身高 110cm，体重 15kg。一天前发热（39.1℃），咽喉痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗，发病 20h 左右出现腹泻，约 2~5h，一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐 1 次。体格检查：T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分。咽位充血，出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9/L$ （参考值 $4.0 \sim 10 \times 10^9/L$ ），粪便镜检可见红、白细胞。

A: 药用炭可以吸附细菌和毒素，可与抗生素同时服用？

B: 小檗碱和鞣酸蛋白不宜同时服用？

C: 首选口服补液，必要时静脉补液？

D: 腹泻可致电解质丢失，故须特别注意补充？

答案: A

39. 运动员长期使用可提高红细胞携氧能力，但易导致肝功能异常，易引起糖尿病的兴奋剂是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 人促红细胞生成素
- C: 苯丙酸诺龙
- D: 可待因

答案：B

40. (2017 年真题) 痛风缓解期宜选用的治疗药物是 ()

- A: 秋水仙碱
- B: 苯溴马隆
- C: 阿司匹林
- D: 泼尼松

答案：B

41. 下列方法中不属于制定和调整给药方案基本方法的是

- A: CTP 评分
- B: 一点法和重复一点法
- C: PK/PD 参数法
- D: 稳态一点法

答案：A

42. 敏感化作用的配伍用药是

- A: 应用地高辛与氢氯噻嗪
- B: 纳洛酮用于解救吗啡中毒
- C: 青蒿素与乙胺嘧啶或磺胺多辛联用延缓抗药性
- D: 阿托品联用吗啡镇痛

答案：A

43. 可以引起视物模糊、红绿色视野受限的药物是 ()

A: 对氨基水杨酸钠

B: 乙胺丁醇

C: 异烟肼

D: 链霉素

答案: B

44. 吸烟后延缓胃溃疡的愈合，而加重出的药物是

A: 氯丙嗪

B: 胰岛素

C: 西咪替丁

D: 呋塞米

答案: C

45. 药物信息按照其最初来源通常分为三级，即以期刊发表的原创性论著为主的一级信息源、引文和摘要服务为主的二级信息源以及参考书和数据库为主的三级信息源。

A: 内容全面、细致

B: 提供的信息丰富、详实

C: 内容广泛、使用方便

D: 能看到研究细节如试验设计、数据处理等

答案: C

46. 癫痫持续状态的好发年龄段为（）

A: 6 岁以内

B: 65 岁以上

C: 55 岁以上

D: 1 岁以内及 65 岁以上

答案: D

47. 儿童退热的用药选择和单次用量, 正确的是()

- A: 布洛芬 0.4~0.6g (12 岁以上儿童)
- B: 对乙酰氨基酚 10~15mg/kg
- C: 对乙酰氨基酚 25~50mg/kg
- D: 阿司匹林 30~60mg/kg

答案: B

48. 有机磷农药中毒后, 具有食欲缺乏、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、瞳孔缩小、视力模糊、多汗、流涎、支气管痉挛、呼吸道分泌物增多、呼吸困难、发绀等表现的是()。

- A: 骨骼系统症状
- B: 毒蕈碱样症状
- C: 中枢神经系统症状
- D: 烟碱样症状

答案: B

49. 敌百虫中毒应

- A: 静脉滴注烟酰胺
- B: 不宜用碳酸氢钠溶液洗胃
- C: 静脉注射毒毛花苷 K 或毛花苷丙
- D: 禁止使用肟类复能剂

答案: B

50. 在配制静脉输液时, 不宜用氯化钠注射液溶解的药品是

- A: 两性霉素 B
- B: 青霉素
- C: 维生素 K

D: 盐酸万古霉素

答案：A

51. 可致驾驶员排尿增多、视力改变的是

A: 东莨菪碱

B: 氯苯那敏

C: 阿米洛利

D: 阿司匹林

答案：C

52. 药师在进行药学服务时，经常查阅一些相关网站，获取一些有用信息} 中国药学会的网址是

A: www. cp

B: org. cn

C: www. cm

D: org. cn

答案：D

53. 高致吐性化疗药物所引起的恶心、呕吐，宜选用的止吐治疗方案是

A: 化疗前使用阿瑞吡坦，化疗后需要继续使用止吐药

B: 化疗联合使用昂丹司琼和地塞米松，化疗结束后给予地塞米松或昂丹司琼

C: 化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦，化疗结束后给予阿瑞吡坦和地塞米松

D: 化疗前使用昂丹司琼，化疗后不需要继续使用止吐药

答案：C

54. 患者，男，56 岁，因高血压常年服用苯磺酸氨氯地平 10mgqd，近期体检血脂指标为 LDL—C4.8mmol / L，药师应建议患者加服

- A: 叶酸
- B: 阿托伐他汀
- C: 福辛普利
- D: 二甲双胍

答案：B

55. 良性前列腺增生症老年患者应用 α_1 肾上腺素能受体阻断治疗时可能导致的不良反应是()

- A: 尿潴留
- B: 体位性低血压
- C: 干咳
- D: 乳腺增生

答案：B

56. 禁用阿朴吗啡催吐的毒物是()。

- A: 磷化锌
- B: 麦角胺
- C: 麻黄碱
- D: 阿片类药物

答案：D

57. 血脂调节药的合理应用有效降低 LDL-C 和 TG 水平，升高 HDL-C 水平的是（）

- A: 依折麦布
- B: 伊曲康唑
- C: 他汀类与贝特类联用

D: 普罗布考

答案: C

58. 一般给予肠外营养的热氮比为

A: 150kcal:1gN

B: NPC5: 5

C: NPC7:3

D: 100kcal:1gN

答案: A

59. 敌百虫中毒

A: 禁止使用肟类复能剂

B: 静脉滴注烟酰胺

C: 不宜用碳酸氢钠溶液洗胃

D: 静脉注射毒毛花苷 K 或毛花苷丙

答案: C

60. 患儿，女，4岁半。身高110cm，体重15kg。一天前发热（39.1℃），咽喉痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗，发病20h左右出现腹泻，约2~5h，一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐1次。体格检查：T38.8℃，P118次/分，R28次/分。咽位充血，出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9/L$ （参考值 $4.0 \sim 10 \times 10^9/L$ ），粪便镜检可见红、白细胞。

A: 动力性腹泻？

B: 感染性腹泻？

C: 分泌性腹泻？

D: 消化不良性腹泻？

答案：B

61. (2018 年真题) 瑞舒伐他汀钙的日剂量范围是 ()

A: 40~200mg

B: 10~20mg

C: 10~80mg

D: 5~20mg

答案：B

62. 口服用于肠道感染或肠道手术前准备的药物是

A: 新霉素

B: 妥布霉素

C: 异烟肼

D: 庆大霉素

答案：D

63. 用半衰期较长的药物或缓控释制剂，每日 1 次给药

A: 简化治疗方案

B: 针对患者生理及心理特点选药

C: 使患者了解药物的重要性

D: 使用分时药盒和用药记录

答案：A

64. (2019 年真题) 处方中外文缩写 mcg 代表

A: 临睡时

B: 微克

C: 必要时

D: 餐后

答案：B

65. (2017 年真题) 服用后可致嗜睡, 驾驶员应慎用的药物是 ()

- A: 氯苯那敏
- B: 胰酶
- C: 阿司匹林
- D: 吲达帕胺

答案：A

66. 下列关于烫伤救治措施的说法, 正确的是

- A: I 度烫伤可冷敷后外涂烧伤膏
- B: 可用清洁塑料薄膜覆盖创面, 以防创面感染
- C: 烫伤患者的镇痛、镇静药物首选氯丙嗪
- D: 创面及时外涂甲紫溶液预防感染

答案：A

67. 患者, 女, 64 岁, 患 2 型糖尿病、高脂血症, 给予二甲双胍肠溶片 0.59tidpo、瑞格列奈片 1mg tidpo、阿托伐他汀钙片 20mg qdpo 等药物治疗。

- A: 停用瑞格列奈片
- B: 停用瑞格列奈片和阿托伐他汀钙片
- C: 停用二甲双胍肠溶片
- D: 停用阿托伐汀钙片

答案：C

68. 以下所列治疗咳嗽的药物中, 属于处方药物的是

- A: 喷托维林
- B: 苯丙哌林

C: 美酚伪麻

D: 可待因

答案: D

69. 纳洛酮作解毒剂用于

A: 阿米替林中毒

B: 阿片中毒

C: 巴比妥类中毒

D: 有机氟中毒

答案: B

70. 下列关于失眠药物治疗策略的说法, 正确的是()

A: 原发性失眠在非药物治疗无效时首选苯二氮?类抗失眠药

B: 失眠继发于或伴发于其他疾病时, 应同时治疗原发或伴发疾病

C: 焦虑症患者存在失眠时以失眠药物为主

D: 药物治疗开始后应及时开展血药浓度监测

答案: B

71. 促进铁剂吸收的

A: 牛奶、蛋类

B: 胰酶

C: 维生素 C

D: 碳酸氢钠

答案: C

72. 药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素、药物因素。

- A: 药物的使用
- B: 药物制剂因素
- C: 药理作用
- D: 药动学相互作用

答案：B

73. 放射性静脉造影剂属于

- A: C 级高危药品
- B: E 级高危药品
- C: D 级高危药品
- D: B 级高危药品

答案：D

74. 患者，女性，32 岁，咳嗽、有脓性痰，痰液色黄或黄白相间，右侧胸痛，吸气时明显。体检：体型胖，神志清，急性病容，无口唇发绀，呼吸急促，体温 39.3℃，心率 100 次/分，肺部可闻及湿性啰音，WBC $14 \times 10^9/L$ ，对青霉素类药物过敏。临床诊断为社区获得性肺炎。

- A: 布地奈德
- B: 左氧氟沙星
- C: 链霉素
- D: 红霉素

答案：B

75. (2017 年真题) 患者到药店购买鱼肝油, 药师应给予 ()

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 维生素 A

B: 维生素

C: 维生素 AD

D: 鱼油

答案: C

76. 恶性肿瘤

A: 红细胞沉降率减慢

B: 血小板增多

C: 白细胞增多

D: 淋巴细胞增多

答案: C

77. 药学服务的具体工作不包括

A: 参与临床药物治疗

B: 处方审核

C: 治疗药物监测

D: 关注特殊人群

答案: D

78. 属于妊娠 X 级毒性药品的是

A: 青霉素、头孢哌酮-舒巴坦

B: 氧氟沙星

C: 辛伐他汀

D: 水溶性维生素

答案: C

79. 患者,女,38岁,已婚,妊娠2个月,近日自觉心慌、多汗,查 FT₃, FT₄ 偏高 TSH 0.01mU/L,临床诊断为甲状腺功能亢进症适宜的治疗方案为()

A: 维持妊娠,选用丙硫氧嘧啶治疗

- B: 维持妊娠,行甲状腺切除手术
- C: 维持妊娠,选用甲巯咪唑治疗
- D: 终止妊娠,选用丙硫氧嘧啶治疗

答案: A

80. 为减少和预防差错的发生,逐一核对药品与处方的相符性,检查药品剂型、规格、剂量、数量、包装,并签字属于()。

- A: 调配处方环节
- B: 接待投诉环节
- C: 药品储存环节
- D: 发药环节

答案: D

81. 峰值一般在清晨 7~8 时,谷值则在午夜 0 时,是指

- A: 糖皮质激素的分泌规律
- B: 胰岛 B 细胞的分泌规律
- C: 肝脏合成胆固醇的规律
- D: 胃酸的分泌规律

答案: A

82. 及早用药以利于杀灭结核菌株

- A: 联合
- B: 适量
- C: 早期
- D: 规律

答案: C

83. (2015 年真题)处方中“餐前给药”的外文缩写是()。

A: Ac

B: pc

C: qn

D: po

答案：A

84. (2018 年真题) 在患者入院、转科和出院时,药师通过核对新开的医嘱和已有的医嘱,核对患者目前的整体用药情况,避免漏用药物、重复用药。剂量错误和不良药物相互作用等,以保证患者用药安全的药学服务过程,属于 ()

A: 处方审核

B: 药物重整

C: 药物利用评价

D: 药学干预

答案：B

85. 可提示完全梗阻性黄疸的是

A: STB $17.1\ \mu\text{mol/L}$ ~ $34.2\ \mu\text{mol/L}$

B: STB $>342\ \mu\text{mol/L}$

C: STB $17.1\ \mu\text{mol/L}$ ~ $171\ \mu\text{mol/L}$

D: STB $34.2\ \mu\text{mol/L}$ ~ $171\ \mu\text{mol/L}$

答案：B

86. 下列复方药物中, 可使高血压患者血压升高的是

A: 复方酚咖伪麻胶囊

B: 银菊清解片

C: 速克感冒胶囊

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 速感宁胶囊

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/555024013314012033>