

2024 年广西壮族自治区岑溪市《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题大全附参考答案（精练）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 适宜清晨服用的是

- A: 格列美脲
- B: 普伐他汀
- C: 呋塞米
- D: 阿司匹林

答案：C

2. 患者，男，65 岁，慢性咳嗽、喘息 10 余年，活动后症状明显，近 7 天症状加重入院，伴便秘，每周 2 次排便。既往有高血压病史 12 年；长期口服硝苯地平控释片 30mgqd，血压控制良好。体格检查：体温 36.6℃，P82 次/分，R22 次/分，端坐位，喘息，桶状胸，双肺叩诊呈过清音，可闻及散在干鸣音，双下肺少许湿啰音，杵状指。辅助检查：血常规 WBC $11.2 \times 10^9/L$ ，肺功能 FEV₁/FVC60%，FEV₁55%。治疗方案如下：氨溴索注射液 30mg tid ivgtt，莫西沙星氯化钠注射液 0.4g bid ivgtt，异丙托溴铵溶液 0.5mg bid 雾化吸入，布地奈德混悬液 1mg bid 雾化吸入

- A: 布地奈德混悬液
- B: 硝苯地平控释片
- C: 氨溴索注射液
- D: 异丙托溴铵注射液

答案：D

3. 患者静脉滴注两性霉素 850mg，临床药师建议两性霉素 B 应该调节至适当的滴注速度。

A: 患者家属

B: 医生

C: 护士

D: 患者

答案：C

4. 记录患者用药问题、药学干预内容、药学监护计划的技能是

A: 药历书写技能

B: 药品警戒技能

C: 沟通技能

D: 自主学习能力

答案：A

5. 患者，男，26 岁，自述头痛、咽喉痛、全身乏力、畏寒，偶尔咳嗽，并有鼻塞、流鼻涕、打喷嚏等症状。经检查后，测量口腔体温 37.8℃，脉搏 72 次/分，白细胞计数 $3.7 \times 10^9/L$ 。医生为患者开具的处方如下：

A: 2 日

B: 3 日

C: 5 日

D: 4 日

答案：D

6. ADR 报告表对不良反应的主要临床表现和体征进行明确、具体的描述；如过敏性皮疹的类型、性质、部位、面积大小等；所对应的项目是

- A: ADR / ADE 过程描述
- B: 用药起止时间
- C: 不良反应 / 事件的结果
- D: 用药原因

答案：A

7. 下列病原体中，可导致沙眼的是

- A: 变形杆菌
- B: 豚解支原体
- C: 沙眼衣原体
- D: 大肠埃希菌

答案：C

8. 患者，男，50 岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方：氨氯地平片 10mgpoqd；美托洛尔缓释片 47.5mgpoqd；贝那普利片 20mgpoqd；阿司匹林肠溶片 100mgpoqd；辛伐他汀片 40mgpoqd。

- A: 氯吡格雷片
- B: 双嘧达莫片
- C: 华法林片
- D: 对乙酰氨基酚片

答案：A

9. ADR 与用药时间相关性不密切。反应表现与已知该药 ADR 不相吻合，原患疾病发展同样可能有类似的临床表现：该 ADR 因果关系可评价为

- A: 很可能
- B: 可能无关
- C: 可能
- D: 待评价

答案：B

10. 高胆固醇血症，首选的治疗药物是

- A: 烟酸类
- B: 他汀类
- C: 贝特类
- D: ω -3 脂肪酸制剂

答案：B

11. 下列关于烫伤救治措施的说法，正确的是

- A: 可用清洁塑料薄膜覆盖创面，以防创面感染
- B: 烫伤患者的镇痛、镇静药物首选氯丙嗪
- C: 创面及时外涂甲紫溶液预防感染
- D: I 度烫伤可冷敷后外涂烧伤膏

答案：D

12. 阿司匹林可能引起

- A: 尿沉渣结晶
- B: 尿肌酐
- C: 尿酮体
- D: 尿血红蛋白

答案：D

13. 脂溶性中等，作用持续 3~6h 的是

- A: 苯巴比妥
- B: 硫喷妥
- C: 巴比妥
- D: 戊巴比妥

答案：D

14. 疱疹性脑炎的致病原为

A: VZV

B: HSV-1

C: HCV

D: HSV-2

答案：B

15. 患者，女，53 岁，因“冠状动脉粥样硬化性心脏病、急性心肌梗死”住院治疗。医师处方：硝酸甘油片、比索洛尔片、注射用重组链激酶冻干粉针剂、依那普利片、肝素钠注射液、辛伐他汀片比索洛尔的主要不良反应是

A: 心动过缓、二至三度房室传导阻滞

B: 横纹肌溶解症

C: 出血

D: 高钾血症

答案：A

16. 成年男性的血尿酸正常参考范围是

A: $550 \sim 650 \mu\text{mol} / \text{L}$

B: $208 \sim 428 \mu\text{mol} / \text{L}$

C: $155 \sim 357 \mu\text{mol} / \text{L}$

D: $120 \sim 160 \mu\text{mol} / \text{L}$

答案：B

17. 治疗肠道蛔虫病可选用()

A: 双八面体蒙脱石散

B: 聚乙醇 4000

C: 阿苯达唑

D: 莫沙必利

答案：C

18. 患者，女，64 岁，既往高血压病病史 15 年，活动后心悸、气短 3 年，2 小时前无明显诱因突发喘憋。体检：端坐体位，BP190 / 110mmHg，R30 次 / 分，P108 次 / 分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿啰音。

A: 室性期前收缩

B: 心室颤动

C: 心房颤动

D: 阵发性室上性心动过速

答案：C

19. 李女士，40 多岁，来药店咨询皮肤瘙痒用药。经询问和查看后得知：李女士手心皮肤干燥、脱皮，没有破裂，没有水疱和渗出（无感染征象），瘙痒严重，尤其是夜间。自述症状在逐渐加重，之前有过类似症状，但都很轻微。进一步询问得知，她最近开始在餐厅厨房工作，每天需要清洗大量碗筷。

A: 氢化可的松软膏

B: 复方樟脑软膏

C: 复方片仔癀软膏

D: 异维 A 酸软膏

答案：A

20. 维 A 酸与过氧苯甲酰联合应用治疗痤疮时，正确的用法是

A: 睡前应用过氧苯甲酰凝胶，晨起洗漱后应用维 A 酸凝胶或乳膏？

- B: 将两种药物的凝胶或乳膏充分混合后同时应用？
- C: 两药的凝胶或乳膏间隔 2 小时交替使用？
- D: 睡前应用维 A 酸凝胶或乳膏，晨起洗漱后应用过氧苯甲酰凝胶？

答案：D

21. 治疗急性腹泻可选用 ()

- A: 阿苯达唑
- B: 双八面体蒙脱石散
- C: 莫沙必利
- D: 聚乙醇 4000

答案：B

22. 临床用药实践表明，人类正常饮食中的一些品种将影响某些药物的药理作用。酒是人类饮食中对药物疗效影响最大的品种。酒的主要成分为乙醇，饮用后人体先是兴奋，随之其对中枢神经产生抑制作用，并扩张血管，刺激或抑制肝药酶代谢系统；另外，有些药也可延迟酒的代谢和分解。总体上，药与酒的相互作用结果有两个：一是降低药效；二是增加不良反应发生率。

- A: 血糖不降
- B: 血压升高
- C: 低血糖症状
- D: 过敏反应

答案：C

23. 下列药物中使用前无需皮试的是 ()

- A: 苄星青霉素注射剂
- B: 抑肽酶注射剂
- C: 紫杉醇注射剂

D: 抗狂犬病血清注射剂

答案：C

24. 对强心苷类中毒引起的快速型心律失常疗效最佳的药物是

A: 普萘洛尔

B: 普鲁卡因胺

C: 阿托品

D: 苯妥英钠

答案：D

25. 注射后 10~30min 起效，作用维持时间 2~3h，属于速效强心苷的是

A: 米力农

B: 维拉帕米

C: 去乙酰毛花苷

D: 多巴胺

答案：C

26. 可与吸入性糖皮质激素合用的长效 M 胆碱受体阻断剂是

A: 沙美特罗

B: 噻托溴铵

C: 异丙托溴铵

D: 孟鲁司特

答案：B

27. 患者用药咨询的内容是

A: 抗菌药物的合理使用

B: 栓剂、气雾剂等外用剂型的正确使用方法

C: 减肥、补钙、补充营养素

D: 不宜选用氯化钠注射液溶解的药品

答案：B

28. 处方用药须与临床诊断密切相符，医师开具的处方在病情与诊断栏中应明确记录对患者的临床诊断。药师应审查处方用药与临床诊断的相符性，以加强合理用药监控。

A: 脂肪乳用于急性肝损伤、脂质肾病、脑卒中

B: 福辛普利用于降压

C: I 类手术切口应用第三代头孢菌素

D: 老年女性补钙给予阿托伐他汀钙

答案：A

29. 发热（发烧）指人体体温升高，超过正常范围，主要表现是体温升高、脉搏加快。按体温状况，发热分为低热、中等度热、高热、超高热。高热是指体温范围

A: 37.4℃～38.0℃

B: 37.0℃～38.3℃

C: 38.1℃～39.0℃

D: 39.1℃～41.0℃

答案：D

30. （2017 年真题）治疗肠道蛔虫病可选用（）

A: 莫沙必利

B: 阿苯达唑

C: 聚乙醇 4000

D: 双八面体蒙脱石散

答案：B

31. 用药期间粪便呈橘红至红色的药物是

- A: 水杨酸钠
- B: 硫酸钡
- C: 氢氧化铝制剂
- D: 利福平

答案：D

32. 患者，男，26 岁，自述头痛、咽喉痛、全身乏力、畏寒，偶尔咳嗽，并有鼻塞、流鼻涕、打喷嚏等症状。经检查后，测量口腔体温 37.8℃，脉搏 72 次/分，白细胞计数 $3.7 \times 10^9/L$ 。医生为患者开具的处方如下：

- A: 右美沙芬
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 氯苯那敏
- D: 伪麻黄碱

答案：B

33. 属于钙通道阻滞剂（第Ⅳ类）的抗心律失常药是

- A: 胺碘酮
- B: 维拉帕米
- C: 拉贝洛尔
- D: 美西律

答案：B

34. 咳嗽较弱者宜选用的药物是

- A: 喷托维林
- B: 苯丙哌林
- C: 右美沙芬

D: 氨溴索

答案：A

35. 一般不会出现中性粒细胞增多的中毒事例是

A: 铅中毒

B: 汞中毒

C: 乙醇中毒

D: 催眠药中毒

答案：C

36. 钙制剂+维生素 D+雌激素（雌激素受体调节剂）

A: 老年性骨质疏松

B: 妇女绝经后骨质疏松

C: 原发性骨质疏松

D: 抗癫痫药所致的骨质疏松

答案：B

37. 患者，男，40 岁，体重 70kg，因咳痰伴发热入院，诊断为肺炎，欲给予左氧氟沙星片实施治疗。该药说明书提示：肌酐清除率低于 50ml / min 时需要调整给药方案。该患者入院时行肾功能检查：血肌酐 (Cr) 130 μ mol / L。医师给出的治疗方案是

A: 延长给药间隔时间

B: 经验剂量的 3 / 4

C: 不需要调整给药方案

D: 经验剂量的 1 / 2

答案：C

38. 表现为“牛肉样舌”的疾病为()

- A: 再生障碍性贫血
- B: 白血病
- C: 巨幼细胞性贫血
- D: 缺铁性贫血

答案：C

39. 静滴、静注不良反应发生率较高

- A: 生活和饮食习惯
- B: 药物制剂因素
- C: 药物的使用
- D: 生理因素

答案：C

40. 某患者，女性，28 岁，近半年出现面色苍白、头晕、乏力，近日头晕加重，并出现心慌、气短，到医院就诊，血常规检查示 $Hb < 90g / L$ 。

- A: 奥美拉唑
- B: 氨基酸
- C: 维生素 B1
- D: 维生素

答案：A

41. 冠心病患者入不能耐受 ACEI，可考虑给予（）

- A: β 受体激动剂
- B: AR
- C: α 受体拮抗剂
- D: 地高辛

答案：B

42. 患者，男，36 岁。临床诊断痛风性关节炎急性发作期。症见左侧踝关节红肿，剧烈疼痛。为控制炎症，治疗首选药是

- A: 非布司他
- B: 布洛芬
- C: 秋水仙碱
- D: 尼美舒利

答案：C

43. 用于有机磷中毒症状的对抗药物是

- A: 碘解磷定
- B: 阿托品
- C: 亚甲蓝
- D: 毛果芸香碱

答案：B

44. 鲜血便主要见于（）

- A: 慢性菌痢
- B: 下消化道出血
- C: 霍乱
- D: 小肠炎症

答案：B

45. 轻症、慢性疾病治疗时，因用药持久，适宜选用

- A: 片剂
- B: 软膏剂
- C: 注射剂
- D: 栓剂

答案：A

46.（2017 年真题）下列关于抗抑郁药的合理应用与药学监护的说法，错误的是（）

- A: 抗抑郁药起效较快，使用 1 周后可判疗效
- B: 剂量递增尽可能采用最小有效剂量使不良反应减至最小
- C: 当单药治疗无效时可考虑联合使用两种作用机制不同的抗抑郁药
- D: 应尽可能单一用药，足量、足疗程治疗

答案：A

47. 增加患者出现高血糖或低血糖症隐患的药品是

- A: 头孢哌酮
- B: 拉氧头孢
- C: 加替沙星
- D: 利巴韦林

答案：C

48. 患者，女，60 岁。患肥胖症，检查可见 TG2.0mmol/L。主要降低 TG 的下列药物首选

- A: 考来烯胺
- B: 氟伐他汀
- C: 非诺贝特
- D: 普罗布考

答案：C

49. (2018 年真题) 患者, 女, 30 岁, 妊娠 7 个月, 既往有磺胺药过敏史。近日双眼沙眼症状加剧, 发痒、分泌物多, 有烧灼感。去年曾用酞丁安滴眼液治疗相似症状, 疗效较好, 今天到药店想再次购买该药。药师给予的用药建议是 ()

- A: 磺胺醋酰钠滴眼液
- B: 硫酸锌滴眼液
- C: 利巴韦林滴眼液
- D: 酞丁安滴眼液

答案: B

50. 患者服用抗菌药物的适宜时间是

- A: 餐中
- B: 清晨
- C: 餐前
- D: 睡前

答案: C

51. (2017 年真题) 下列药物使用方式, 正确的是 ()

- A: 乙酰半胱氨酸泡腾片用 100ml 温开水浸泡溶解后服用
- B: 硝酸甘油片在心绞痛发作的紧急情况下嚼碎用冰水送服
- C: 酵母片在餐后整片用水送服
- D: 氧氟沙星滴眼液打开使用后, 继续使用 3 个月

答案: A

52. (2019 年真题) 处方中外文缩写 p

- A: 微克
- B: 临睡时
- C: 代表

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 必要时

答案：B

53. 一旦误服中毒，必须用硫酸镁洗胃的是

- A: 香豆素类杀鼠药
- B: 磷化锌等杀鼠药
- C: 急性汞中毒
- D: 急性铅中毒

答案：D

54. 患者术后，给予肠外营养液 10%GS500ml、50%GS250ml、20%脂肪乳 250ml、8.5%复方氨基酸 750ml、水溶性维生素 10ml、脂溶性维生素 10ml、微量元素 10ml、10%氯化钠注射液 40ml、10%氯化钾注射液 30ml

- A: 200kcal
- B: 450kcal
- C: 1150kcal
- D: 700kcal

答案：B

55. 患者女，68 岁体重 54kg，因慢性阻塞性肺病急性加重再次入院，入院后生化检查 ALT20IU/L，血肌酐(Cr)1.8mg/dL，痰培养为铜绿假单胞菌。临床选用头孢他啶。头孢他啶药品说明书成人常用剂量为 1 日 1.5~6g，分 2~3 次给药肌酐清除率为 31~50ml/min 时剂量为每 12 小时 1g；肌酐清除率为 16~30ml/min 时剂量为每 24 小时 1g；肌酐清除率为 6~15ml/min 时量为每 24 小时 0.5g；肌酐清除率≤5ml/min 时剂量为每 48 小时 0.5g。

- A: 34ml/min
- B: 25.5ml/min
- C: 40ml/min

D: 30ml/min

答案：B

56. 患者，男，67 岁，因带状疱疹前来就诊，实验室检查肌酐清除率 100ml/min，医生处方阿昔洛韦片治疗，对于该患者，适宜的用法用量是()

A: 0.4g，每日 2 次

B: 0.4g，每日 5 次

C: 0.4g，每日 4 次

D: 0.8g，每日 3 次

答案：B

57. 防心绞痛药物

A: 胃黏膜保护剂

B: 硝酸甘油

C: 甘草合剂

D: 去氨加压素

答案：B

58. 患者，女，35 岁，在不知怀孕的情况下服用诺氟沙星胶囊。经询问，获知其服药时间距末次月经时间是 20 天。该用药行为对胎儿可能造成的影响是()

A: 腭裂

B: 牙齿色素沉着

C: 流产或发育成正常胚胎

D: 骨骼发育异常

答案：C

59. 医师无权调配处方，体现处方的

- A: 法律性
- B: 有效性
- C: 技术性
- D: 经济性

答案：A

60. 抗高血压不能合用的药物

- A: α 受体阻滞药和 β 受体阻滞药
- B: 钙通道阻滞药和硫酸镁
- C: 钙通道阻滞药和 ACEI 或 ARB
- D: 利尿药和 β 受体阻滞药

答案：B

61. 最方便、最安全、最经济的给药途径是

- A: 直肠给药
- B: 肌肉注射
- C: 静脉注射
- D: 口服给药

答案：D

62. 患者，男性，36 岁，主因“反复上腹部疼痛 3 年，加重伴黑便 2 天”以“胃溃疡”收住入院。患者于入院 3 年前，餐后偶感上腹部隐痛不适，曾在当地医院做胃镜检查示“胃溃疡”。经住院给予对症治疗（具体药物及剂量不详）后症状有所好转。入院前 2 天开始，上述症状发作较为频繁，以胃灼痛为主，多以辛辣刺激及不良饮食为诱因，伴反酸及嗝气，并伴有黑便，呈糊状，共排 3 次，每次约 250g 左右，同时伴有恶心。患者自发病以来，无头晕及头痛，有恶心但无呕吐，无胸闷及心慌，无咳嗽及咳痰，无腹泻，体重未见明显增减。查体：T36.2℃、P84 次/分、R20 次/分、BP110/70mmHg，腹平软，未见腹壁静脉显露及胃肠型和蠕动波，中上腹压痛但无反跳痛，肝、脾未扪及，肝、肾区无叩痛，移动性浊音阴性，肠鸣音 3~5 次/分。辅助检查：①便常规：红细胞满视野，隐血阳性；②胃镜检查：胃壁左侧有一 1.5cm×2cm 椭圆形溃疡；③尿素酶试验（+）。诊断结论：胃溃疡合并上消化道出血，幽门螺杆菌感染。

A: 左氧氟沙星 500mgqd+呋喃唑酮 100mgbid+四环素 500mgqid+枸橼酸铋钾 220mgbid，疗程 2 周

B: 阿莫西林 1000mgbid+克拉霉素 500mgbid+艾司奥美拉唑 20mgbid+枸橼酸铋钾 220mgbid，疗程 2 周

C: 克拉霉素 500mgbid+左氧氟沙星 200mgbid+甲硝唑 400mgqid+艾司奥美拉唑 20mgbid，疗程 2 周

D: 四环素 500mg tid+甲硝唑 400mg tid+艾司奥美拉唑 20mgbid+枸橼酸铋钾 220mgbid，疗程 2 周

答案：D

63. 正常血涂片白细胞分类计数，中性粒细胞占白细胞总数的

A: 0.01~0.05

B: 0.5~0.7

C: 0.05~0.5

D: 0.02~0.04

答案：B

64. 药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素、药物因素

。

- A: 肾病患者服用呋喃妥因可引起周围神经炎
- B: 氯霉素在新生儿体内蓄积呈现灰婴综合征
- C: 服用阿司匹林出现哮喘、慢性荨麻疹等
- D: 口服避孕药致阿米替林的清除率下降

答案：D

65. 女性，59 岁，间断咳嗽、咳痰 5 年，加重伴咯血 2 个月。患者表现为低热、乏力、食欲减退、咳白色黏痰、体重逐渐下降。

- A: 青霉素？
- B: 异烟肼？
- C: 布地奈德？
- D: 特布他林？

答案：B

66. 男性，72 岁。高血压病 3 年，血压 165/95mmHg，伴 II 型糖尿病。首选降压药物是

- A: β -受体阻滞剂
- B: 心痛定
- C: 利尿剂
- D: ACEI 类

答案：D

67. 连续使用不应超过 10 日，并在使用期间定期测量眼压的滴眼液是

- A: 泼尼松滴眼液
- B: 阿昔洛韦滴眼液
- C: 硫酸锌滴眼液
- D: 磺胺醋酸钠滴眼液

答案：A

68. 患者，男，66 岁，身高 170cm，体重 85kg，以“头晕、胸闷、乏力 1 周”为主诉入院治疗。空腹血糖 11.2mmol / L，餐后血糖 16.5mmol / L。诊断结果：2 型糖尿病。既往有磺胺类药过敏史，一直服用硝苯地平控释片、辛伐他汀片、阿司匹林肠溶片控制高血压和冠心病。医师处方：二甲双胍 0.5gbid、消渴丸 10 丸（规格 30g / 120 丸）bid、罗格列酮 4mgqd 治疗。

- A: 罗格列酮片
- B: 阿司匹林肠溶片
- C: 消渴丸
- D: 硝苯地平控释片

答案：A

69. 提示“每次用药前检查药品外观有无变化，发现异常立即停用”，是针对

- A: 特殊装置药品
- B: 特殊剂型用法
- C: 药品贮存
- D: 药品有效期

答案：C

70. 用药后 2 小时内尽量不排尿或局部冲洗的剂型是

- A: 舌下片
- B: 咀嚼片
- C: 泡腾片
- D: 阴道栓

答案：D

71. 属于胃黏膜保护剂的是()。

- A: 奥美拉唑
- B: 替普瑞酮
- C: 哌仑西平
- D: 雷尼替丁

答案: B

72. 有双侧肾动脉狭窄的高血压患者不宜选用

- A: 多沙唑嗪
- B: 哌唑嗪
- C: 维拉帕米
- D: 卡托普利

答案: D

73. 糖尿病合并肾病者首选

- A: 二甲双胍
- B: 比格列酮
- C: 格列喹酮
- D: 阿卡波糖

答案: C

74. 合并心力衰竭的高血压患者，降压目标值为

- A: <130 / 80mmHg
- B: <125 / 75mmHg
- C: <150 / 90mmHg
- D: <140 / 90mmHg

答案: D

75. 举重运动员使用后,可短时间内急速降低体重, 因此需按兴奋剂管理的药物是()

- A: 缬沙坦
- B: 硝苯地平
- C: 普萘洛尔
- D: 呋塞米

答案: D

76. (2018 年真题) 患者,女,21 岁,近半年来食欲亢进,多汗体重明显减轻,伴有乏力、心悸。就诊查体见双手震颤,心率 104 次/分,化验结果:血清促甲状腺素 (TSH) $<0.1\text{mU/L}$, FT3、FT4 明显升高,肝肾功能基本正常,白细胞计数正常,诊断为甲状腺功能亢进症。首选的治疗方案是 ()

- A: 甲状腺次全切除手术
- B: 注意休息补充营养,使用甲巯咪唑治疗
- C: 碘化钾治疗,定期复查
- D: 选用 ^{131}I 治疗

答案: B

77. 目前推荐治疗失眠的一线药物为 ()

- A: 艾司唑仑
- B: 佐匹克隆
- C: 多塞平
- D: 硝西泮

答案: B

78. 就乙肝血清免疫学检查而言,判别“大三阳”区别于“小三阳”的主要检查项目结果是

- A: HBsAg(+)
- B: HBeAg(+)
- C: 抗-HBs(+)
- D: 抗-HBe(+)

答案：B

79. 匹维溴铵的作用机制为()

- A: M 受体阻断剂
- B: M 受体激动剂
- C: β 受体阻断剂
- D: 钙拮抗剂

答案：D

80. 服用药物对粪外观的影响,保泰松

- A: 橘红至红色
- B: 黄色
- C: 变红或黑色
- D: 红至黑色

答案：C

81. 支气管扩张的临床表现是

- A: 多为轻咳或干咳，偶见少量薄白痰，并伴有背痛、发热、头痛、咽喉痛
- B: 多发生于儿童，为阵发性剧烈痉挛性咳嗽伴有鸡鸣样吸气吼声，病程可达 2~3 个月
- C: 可有低热或高热，清瘦、轻咳、盗汗，有黄绿色痰
- D: 有慢性咳嗽，伴有大量脓痰及反复咯血

答案：D

82. 患者，女，30 岁，情感低落、反应迟钝半年余，晨重夜轻，临床诊断为抑郁症。

- A: 药物治疗至少 2 周才会有显著的情绪反应
- B: 从最大有效剂量开始，逐步递减剂量
- C: 不宜与 MAOIs 类药物联合使用
- D: 如以上药物治疗无效，可考虑更换为同类的其他药物

答案：B

83. 典型结核病的临床表现错误的是

- A: 乏力
- B: 高热
- C: 食欲减退
- D: 咳嗽

答案：B

84. （2017 年真题）半衰期小于 30min 且治疗指数低的药物通常选择（ ）

- A: 2~3 个半衰期给药 1 次
- B: 每个半衰期给药 1 次
- C: 每日给药 1 次
- D: 静脉滴注给药

答案：D

85. 对蛔虫，蛲虫，鞭虫，钩虫，鞭虫，绦虫感染都有效的药物是

- A: 噻嘧啶
- B: 哌嗪

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 甲苯咪唑

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/555230023122012033>