

# 菌痢护理措施

汇报人：xxx

20xx-03-29



# 目录

contents

- 菌痢基本概念与流行病学
- 临床表现与诊断依据
- 一般护理措施
- 消化道隔离与饮食调整策略
- 药物治疗观察与不良反应预防
- 心理护理及健康教育普及

# 01

## 菌痢基本概念与流行病学



# 细菌性痢疾定义及简称

细菌性痢疾（bacillary dysentery）简称菌痢，是一种由志贺菌属（痢疾杆菌）引起的肠道传染病。

01

02

菌痢主要通过消化道传播，志贺菌感染人体后引起结肠黏膜的炎症和溃疡，并释放毒素入血，导致一系列临床表现。

# 流行病学特点



## 01

菌痢是全球性的传染病，尤其在发展中国家发病率较高。

## 02

菌痢的传播途径主要是粪-口途径，如食用被污染的食物或水、接触感染者的排泄物等。

## 03

菌痢的流行与卫生条件、饮食习惯、水源污染等因素密切相关。



## 高发人群及季节分布

儿童和青壮年是菌痢的高发人群，尤其是营养不良、免疫力低下的个体更易感染。

高发人群

季节分布

菌痢常年散发，但夏秋季节发病率较高。这与夏秋季节气温高、湿度大，有利于细菌繁殖和传播有关。同时，夏秋季节人们饮食生冷食物较多，也增加了感染的风险。

02

## 临床表现与诊断依据



# 典型临床表现



## 腹痛

以下腹痛为主，常有里急后重感。



## 全身毒血症症状

如头痛、乏力、食欲减退等。



## 发热

多为高热，可伴有寒战。



## 腹泻

频繁腹泻，初为稀便，后转为黏液脓血便。



## 严重症状

严重者可出现感染性休克和（或）中毒性脑病。





# 实验室检查及诊断依据



## 粪便常规检查

外观多为黏液脓血便，镜检有大量脓细胞、红细胞与巨噬细胞。

## 细菌培养

可培养出志贺菌，为确诊依据。

## 血清学检查


凝集试验等血清学检查有助于诊断。



# 鉴别诊断要点


## 与急性细菌性肠炎鉴别

后者也有腹痛、腹泻等症状，但一般无里急后重感和黏液脓血便。




## 与肠结核鉴别

肠结核多有低热、盗汗等结核毒血症状，粪便中一般无脓血，结肠镜检查及活检有助于鉴别。




## 与阿米巴痢疾鉴别

阿米巴痢疾起病缓慢，毒血症症状较轻，粪便或结肠镜取溃疡渗出物检查可找到溶zu组织阿米巴滋养体或包囊。



03

# 一般护理措施





# 隔离消毒措施执行

1

## 严格执行消毒隔离制度

对菌痢患者采取严格的消化道隔离措施，包括对患者排泄物的消毒处理，防止交叉感染。

2

## 消毒方法选择

采用敏感、高效的消毒剂对患者接触过的物品、餐具、便器等进行消毒，确保消毒效果。

3

## 解除隔离标准

患者症状消失、大便培养连续两次阴性后，方可解除隔离。






# 环境卫生管理要求

01

什么办法可以杀灭诺如病毒？



## 保持环境清洁



保持病房、居室等环境的清洁卫生，定期开窗通风，保持空气新鲜。

02

减盐  
减油  
吃得营养



## 饮食卫生管理



加强饮食卫生管理，避免食用不洁、变质食物，防止病从口入。

03



## 垃圾处理



对患者排泄物、呕吐物等垃圾进行及时、规范的处理，防止病菌传播。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：  
<https://d.book118.com/556112115134010142>