

2024 年广东省《执业药师之西药学专业二》 资格考试完整题库含答案（基础题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 属于 5 α 还原酶抑制剂的是

- A: 度他雄胺
- B: 坦洛新
- C: 西地那非
- D: 他达拉非

答案：A

2. 属于 β_2 受体激动剂的是

- A: 福莫特罗
- B: 孟鲁司特
- C: 异丙托溴铵
- D: 乙酰胆碱

答案：A

3. 复方氨基酸注射液（6AA）与等量 10% 葡萄糖注射液稀释后缓慢静脉滴注，滴速为

- A: 不超过 15 滴 / 分
- B: 滴速 20~30 滴 / 分
- C: 不超过 40 滴 / 分
- D: 滴速 80~100 滴 / 分

答案：C

4. 下列哪种属于长效青霉素

- A: 苄星青霉素
- B: 阿莫西林
- C: 青霉素 V
- D: 苯唑西林

答案：A

5. 患者，女，55 岁。经皮冠状动脉介入治疗（PCI）术后一直服用他汀类药物，但是低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）未达标，医师增加了他汀类药物的剂量后，患者的 ALT 升至 120U/L，故医师拟恢复原他汀药物的剂量，并联用其他调血脂药，该患者宜联用的药物是

- A: 氟伐他汀同德
- B: 依折麦布
- C: 辛伐他汀
- D: 非诺贝特

答案：B

6. 能治疗强心苷中毒引起的窦性心动过缓的是

- A: 哌替啶
- B: 利血平
- C: 苯妥英钠
- D: 阿托品

答案：D

7. 周某，男，31 岁，胃溃疡伴有慢性出血，大便潜血(+)，患者近日感无力、心悸，诊断：慢性失血性贫血。

- A: 对胃酸缺乏者，宜与稀盐酸并用，有利于铁剂的解离
- B: 注意预防铁负荷过重

C: 选择适宜的病期、疗程和监测

D: 尽量选择三价铁

答案: D

8. 由我国学者发现并用于抗疟的是

A: 青蒿素

B: 链霉素

C: 二氯沙奈

D: 甲硝唑

答案: A

9. 大剂量雌激素用于()

A: 绝经期综合征

B: 痛经

C: 再生障碍性贫血

D: 回奶

答案: D

10. 骨髓抑制较严重的是

A: 卡铂

B: 奥沙利铂

C: 顺铂

D: 亚叶酸钙

答案: A

11. 高浓度溶液对皮肤和黏膜产生刺激性灼伤，形成一疼痛“白痴”

A: 过氧化氢

B: 硼酸

C: 克罗米通

D: 羟甲唑啉

答案: A

12. 具有阿片样作用，长期大量服用可产生欣快感，并可能出现药物依赖性的止泻药是()

A: 乳果糖

B: 蒙脱石散

C: 洛哌丁胺

D: 地芬诺酯

答案: D

13. (2016 年真题) 属于神经激肽-1 受体阻断剂的止吐药是

A: 维生素 B6

B: 托烷司琼

C: 甲氧氯普胺

D: 阿瑞吡坦

答案: D

14. 具有杀灭痤疮丙酸杆菌作用，用于治疗痤疮的药品是

A: 维 A 酸

B: 阿达帕林

C: 过氧苯甲酰

D: 异维 A 酸

答案: C

15. 既可用于男性性功能减退，又可用于女性绝经后晚期乳腺癌治疗的药物是

- A: 坦洛新
- B: 十一酸睾酮
- C: 特拉唑嗪
- D: 西地那非

答案：B

16. 高效抑菌药是

- A: 异烟肼
- B: 磺胺嘧啶
- C: 氯霉素
- D: 头孢菌素

答案：B

17. 下列强心苷类药物中，主要经肝脏代谢的是()

- A: 洋地黄毒苷
- B: 地高辛
- C: 毒毛花苷 K
- D: 毛花苷丙

答案：A

18. 严重肝病患者应减量慎用、肾功能减退患者应避免使用的是

- A: 异烟肼
- B: 青霉素
- C: 红霉素
- D: 氟胞嘧啶

答案：D

19. 通过抑制 A 型单胺氧化酶，减少去甲肾上腺素、5-HT 及多巴胺的降解，增强去甲肾上腺素、5-HT 和多巴胺能神经功能，发挥抗抑郁作用的药物是

- A: 阿米替林
- B: 度洛西汀
- C: 吗氯贝胺
- D: 舍曲林

答案：C

20. (2019 年真题) 原发性肾病综合征患者，在院治疗时给予“注射用甲泼尼龙 40mgqd”静脉滴注，出院前调整为等效剂量的口服药物序贯治疗，适宜的方案是 ()

- A: 泼尼松片 50mgqd
- B: 地塞米松片 10mgqd
- C: 泼尼松片 20mgqd
- D: 泼尼松片 30mgqd

答案：A

21. 重度致吐性化疗药所引起恶心呕吐的治疗应选 ()

- A: 每日化疗前，应用 5-HT
- B: 5-HT
- C: 5-HT
- D: 奥美拉唑+口服地塞米松

答案：C

22. 治疗弥散性血管内凝血(DIC)宜选用 ()

- A: 肝素
- B: 达比加群酯

C: 叶酸

D: 阿司匹林

答案：A

23. 铁剂的适应证为

A: 巨幼细胞贫血

B: 恶性贫血

C: 缺铁性贫血

D: 再生障碍性贫血

答案：C

24. 抑酸剂西咪替丁可引起的典型不良反应是

A: 定向力障碍

B: 血糖升高

C: 低镁血症

D: 血尿酸升高

答案：A

25. 铁剂的适应证为()

A: 巨幼红细胞性贫血

B: 恶性贫血

C: 再生障碍性贫血

D: 缺铁性贫血

答案：D

26. 卡马西平用于

A: 特发性震颤

B: 慢性脑功能不全

C: 神经源性尿崩症

D: 早期帕金森病

答案：C

27. (2021 年真题) 水溶性他汀类药物能够选择性抑制肝脏胆固醇合成，而对肾上腺、性腺、心脏、大脑等部位的胆固醇合成影响极低，既有效降低了血清胆固醇水平，又减少了肝脏以外组织不良反应的发生。水溶性较强的他汀类药物是 ()

A: 氟伐他汀

B: 辛伐他汀

C: 普伐他汀

D: 洛伐他汀

答案：C

28. 以下不属于干扰核酸生物合成的药物是

A: 甲氨蝶呤

B: 表柔比星

C: 培美曲塞

D: 卡培他滨

答案：B

29. 克拉霉素与环孢素合用 ()

A: 不良反应叠加

B: 药理作用拮抗

C: 后者血药浓度下降，药效降低

D: 后者血药浓度升高，不良反应增加

答案：D

30. 属于长效糖皮质激素的药物是

- A: 醋酸可的松
- B: 曲安西龙
- C: 地塞米松
- D: 氢化可的松

答案：C

31. 用于抗结核杆菌的药物是

- A: 异烟肼
- B: 妥布霉素
- C: 新霉素
- D: 庆大霉素

答案：A

32. 主要作用是抗革兰阴性杆菌的半合成青霉素是

- A: 替莫西林
- B: 阿莫西林
- C: 哌拉西林
- D: 替卡西林

答案：A

33. 关于苯丙哌林与可待因镇咳作用强度比较，正确的是

- A: 可待因镇咳作用约为苯丙哌林的 2~4 倍
- B: 苯丙哌林镇咳作用约为可待因的 2~4 倍
- C: 可待因镇咳作用约为苯丙哌林的 2 倍
- D: 苯丙哌林镇咳作用约为可待因的 2 倍

答案：B

34. 在骨组织中分布浓度高，可用于骨和关节感染的药物是()

- A: 青霉素
- B: 林可霉素
- C: 四环素
- D: 万古霉素

答案: B

35. 以多酶或辅酶形式参与体内新陈代谢及重要的生化反应的是

- A: 葡萄糖
- B: 维生素
- C: 脂肪乳
- D: 果糖

答案: B

36. 属于非噻吩并吡啶类二磷酸腺苷(ADP)P2Y₁₂受体阻断剂的是

- A: 阿司匹林
- B: 双嘧达莫
- C: 替格瑞洛
- D: 替罗非班

答案: C

37. 对抗香豆素过量引起的出血可选用()

- A: 维生素 K
- B: 鱼精蛋白
- C: 维生素
- D: 垂体后叶素

答案: A

38. 可促进子宫颈成熟的药物有松弛子宫颈管，促进宫颈成熟，使宫口开大，缩短分娩时间，提高引产成功率等作用的药物是

- A: 普拉睾酮
- B: 地诺前列酮
- C: 缩宫素
- D: 麦角新碱

答案：A

39. 可加速硝基咪唑类药物清除，使血药浓度下降的是

- A: 替硝唑+华法林
- B: 甲硝唑+乙醇
- C: 替硝唑+苯巴比妥
- D: 奥硝唑+乙醇

答案：C

40. 青光眼患者应该慎用

- A: 孟鲁司特
- B: 噻托溴铵
- C: 沙丁胺醇
- D: 沙美特罗

答案：B

41. （2018 年真题）对沙眼、结核性眼病及某些病毒性眼病均有治疗作用的药物是（）

- A: 左氧氟沙星
- B: 阿托品
- C: 卡替洛尔
- D: 利福平

答案：D

42. 患者，女，26 岁。因心悸、手颤、易饥饿、烦躁易怒前来就诊，实验室检查游离甲状腺

- A: 碳酸锂
- B: 丙硫氧嘧啶
- C: 卡比马唑
- D: 甲巯咪唑

答案：D

43. （2017 年真题）主要降低总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇的调血脂药是（）

- A: 瑞舒伐他汀
- B: 依折麦布
- C: 阿昔莫司
- D: 利血平

答案：A

44. 眼部病毒感染宜选用

- A: 氯霉素滴眼剂
- B: 拉坦前列素滴眼剂
- C: 托吡卡胺滴眼剂
- D: 碘苷滴眼剂

答案：D

45. 属于 5α 受体还原酶抑制剂的抗良性前列腺增生症的药品是（）。

- A: 特拉唑嗪
- B: 酚妥拉明

C: 普适泰

D: 度他雄胺

答案: D

46. 可使尿酸浓度升高，可引起痛风急性发作的是

A: 吡嗪酰胺

B: 红霉素

C: 乙胺丁醇

D: 异烟肼

答案: A

47. (2018 年真题) 过度使用，会导致大量的中间代谢产物 N-乙酰对苯醌亚胺堆积，引起严重肝毒性的药物是 ()

A: 阿司匹林

B: 对乙酰氨基酚

C: 双氯芬酸

D: 塞来昔布

答案: B

48. 对阴道滴虫有很好疗效的是

A: 青蒿素

B: 链霉素

C: 二氯沙奈

D: 甲硝唑

答案: D

49. 糖尿病合并发热、感染者可选用 ()

A: 胰岛素

- B: 格列吡嗪
- C: 格列齐特
- D: 格列喹酮

答案：A

50. 用于真菌感染的药物是

- A: 氟康唑
- B: 磺胺嘧啶
- C: 利巴韦林
- D: 拉米夫定

答案：A

51. 男性，68 岁，发热伴咳嗽 1 周，表情淡漠，气急，近 2 天全身散在出血点及瘀斑，血压 60 / 40mmHg，血红蛋白 120g / L，白细胞 12×10^9 / L，血小板 30×10^9 / L，血涂片可见少量红细胞碎片，凝血酶原时间 18 秒(正常值 13 秒)，骨髓穿刺示增生活跃，巨核细胞多，诊断为弥散性血管内凝血。

- A: 鱼精蛋白
- B: 维生素 K1
- C: 低分子肝素
- D: 维生素 C

答案：A

52. 为高渗溶液，静脉给药后可提高血浆渗透压的药物是

- A: 甘油果糖
- B: 甘露醇
- C: 螺内酯
- D: 阿米洛利

答案：B

53. 某患者，63 岁，诊断为"慢性支气管炎急性发作"，痰培养为"铜绿假单胞菌"，下列哪种药物对铜绿假单胞菌无效()

- A: 哌拉西林
- B: 头孢他啶
- C: 头孢克洛
- D: 头孢哌酮

答案：C

54. 可见头晕、耳鸣、视力减退、出汗等不良反应的是

- A: 氨基己酸
- B: 卡巴克络
- C: 蛇毒血凝酶
- D: 甲萘氢醌

答案：B

55. 与第二代溶栓酶相比，瑞替普酶的作用优势不包括()

- A: 给药较方便，可以为抢救患者赢得时间
- B: 具有较强的、特异的纤维蛋白选择性
- C: 血浆半衰期长，栓塞开通率高，给药方便
- D: 全身纤溶活性大于链激酶、阿替普酶

答案：D

56. 患者，男，60 岁。入院诊断为:高胆固醇血症、支原体肺炎。医师拟选用克拉霉素治疗支原体肺炎，同时需进行调血脂治疗，不宜与克拉霉素合用的调血脂药是

- A: 氟伐他汀同德

- B: 依折麦布
- C: 辛伐他汀
- D: 非诺贝特

答案: C

57. 螺内酯利尿的作用机制是

- A: 抑制 Na^+ , K^+ - 2Cl^- 转运系统
- B: 拮抗醛固酮
- C: 抑制 Na^+ , K^+ - 2Cl^- 同向转运系统
- D: 抑制碳酸酐酶

答案: B

58. 可单独用于原发性高血压的药物是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 甘露醇
- C: 呋塞米
- D: 螺内酯

答案: A

59. 调血脂药中，升高 HDL-ch 作用最强，且具有降低脂蛋白 a 作用的是

- A: 阿昔莫司
- B: 烟酸
- C: 依折麦布
- D: 苯扎贝特

答案: B

60. 因抑制 P-糖蛋白使地高辛浓度增加 70%~100% 的是

- A: 硫酸镁
- B: 呋塞米
- C: 克拉霉素
- D: 胺碘酮

答案：D

61. 甲状腺功能亢进症的内科治疗宜选用()

- A: 甲状腺素
- B: 甲巯咪唑
- C: 小剂量碘剂
- D: 吡格列酮

答案：B

62. 属于疾病特异型肠内营养药的是

- A: TP
- B: 视黄醇
- C: 视黄酸
- D: TPF-D

答案：D

63. 是碘与表面活性剂聚乙烯吡咯烷酮经反应生成的复合物。含有效碘9%~12%。从载体中释出碘，可直接卤化菌体蛋白质，与细菌蛋白质的氨基酸结合，破坏菌体的蛋白质和酶，使微生物代谢功能发生障碍而死亡的广谱强效杀菌药是

- A: 聚维酮碘
- B: 氯己定
- C: 依沙吖啶
- D: 过氧乙酸

答案：A

64. 关于万古霉素，描述错误的是

- A: 属于杀菌剂
- B: 作用机制是阻碍细菌细胞壁的合成
- C: 肾功能不全者无需调整剂量
- D: 可用于对甲氧西林耐药的葡萄球菌引起的感染

答案：C

65. 用于治疗单纯性甲状腺肿的是

- A: 甲状腺素
- B: 放射性碘
- C: 糖皮质激素
- D: 丙硫氧嘧啶

答案：A

66. 可引起眼睛疼痛不适的是

- A: 噻托溴铵
- B: 氨溴索
- C: 喷托维林
- D: 沙丁胺醇

答案：A

67. (2021 年真题) 患者，女，27 岁，孕 34 周。诊断为轻度便秘，宜选用的药物是 ()

- A: 普芦卡必利
- B: 乳果糖
- C: 蓖麻油

D: 硫酸镁

答案：B

68. (2017 年真题) 抑制细菌核酸合成 ()

A: 头孢米诺

B: 头孢吡肟

C: 磺胺甲噁唑甲氧苄啶

D: 利福喷丁

答案：D

69. 属于白三烯受体阻断剂的平喘药是

A: 孟鲁司特

B: 沙美特罗

C: 多索茶碱

D: 布地奈德

答案：A

70. 长期频繁使用可致眼部真菌感染

A: 四环素可的松

B: 更昔洛韦

C: 氯霉素

D: 利巴韦林

答案：A

71. 可引起致死性肺毒性的抗心律失常药是 ()

A: 普萘洛尔

B: 胺碘酮

C: 奎尼丁

D: 利多卡因

答案: B

72. 患者，女，49 岁，间断上腹部饱胀、恶心 1 年。患者 1 年前无明显诱因出现恶心、上腹饱胀感，自行服用胃药（具体不详）治疗后症状好转。2 个月前患者上述症状再次发作，查体：上腹部轻微压痛，无反跳痛。胃镜、腹部 B 超检查未见明显异常。诊断：功能性消化不良。医嘱：枸橼酸莫沙必利片，5mg，口服，3 次/日。

A: 甲氧氯普胺

B: 胰酶

C: 多潘立酮

D: 莫沙必利

答案: B

73. 患者，男，22 岁，诊断为风湿热，可选用

A: 万古霉素

B: 苄星青霉素

C: 阿莫西林

D: 双氯西林

答案: B

74. 以下泻药中，半乳糖血症患者禁用的是

A: 乳果糖

B: 硫酸镁

C: 酚酞

D: 液状石蜡

答案: A

75. 通过抑制 GABA 的降解或促进合成而达到抗癫痫作用的药物是

- A: γ -氨基丁酸类似物
- B: 乙内酰脲类
- C: 脂肪酸类
- D: 二苯并氮革类

答案：C

76. 是第一个 P2Y₁₂ 拮抗剂，可抑制血小板聚集的是()

- A: 尿激酶
- B: 华法林
- C: 肝素
- D: 噻氯匹定

答案：D

77. 甲氧氯普胺的作用不包括

- A: 胃肠道兴奋作用
- B: 促进胃肠蠕动
- C: 促进胃酸分泌
- D: 刺激泌乳素释放

答案：C

78. 2 岁以下儿童腹泻，禁用的药品是

- A: 双八面体蒙脱石散
- B: 盐酸洛哌丁胺胶囊
- C: 地衣芽孢杆菌胶囊
- D: 双歧三联活菌胶囊

答案：B

79. 有明显耳毒性的药物是()

- A: 链霉素
- B: 磺胺嘧啶
- C: 青霉素
- D: 四环素

答案: A

80. 静脉滴注给药用于真菌性肺炎的药物是

- A: 两性霉素 B
- B: 特比萘芬
- C: 酮康唑
- D: 灰黄霉素

答案: A

81. 患者，男性，55 岁。每年冬春季常有哮喘发作，近日来上呼吸道感染，咳嗽加哮喘，门诊测血压亦升高，治疗方案：给予抗感染及平喘治疗外，尚考虑给予降压药，其中欲选择一种 β 肾上腺素受体阻断药，应选用

- A: 普萘洛尔
- B: 纳多洛尔
- C: 吲哚洛尔
- D: 美托洛尔

答案: D

82. 乳腺癌患者绝经前、后均可使用的内分泌治疗药是

- A: 阿那曲唑
- B: 氟他胺
- C: 曲妥珠单抗

D: 他莫昔芬

答案: D

83. 能进入含有结核杆菌的巨噬细胞中, 渗入结核菌体, 在菌体内特定酶的作用下化, 且在酸性环境中作用更强的抗结核药物是()

A: 链霉素

B: 利福平

C: 吡嗪酰胺

D: 乙胺丁醇

答案: C

84. (2017 年真题) 奥司他韦治疗流行性感, 首次用药的时间是 ()

A: 出现流感症状后 72 小时内

B: 出现流感症状后 96 小时内

C: 出现流感症状后 100 小时内

D: 出现流感症状后 36 小时内

答案: D

85. 具有预防和逆转血管平滑肌增厚及左心室肥厚的抗高血压药物是

A: 氨氯地平

B: 比索洛尔

C: 氢氯噻嗪

D: 卡托普利

答案: D

86. 日晒时有光敏现象的药品是

A: 庆大霉素

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 加替沙星

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/556114000102011030>