

2024 吉林省大安市《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库附参考答案（实用）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2018 年真题）碳酸钙用于肾衰竭患者降低血磷时，适宜的服药时间是（）

- A: 清晨或睡前
- B: 餐后 2h
- C: 餐中
- D: 餐前即刻

答案：C

2. 噻托溴铵平喘的主要机制是 ABCDE

- A: 阻断腺苷受体
- B: 拮抗 M 胆碱受体
- C: 抑制白三烯受体
- D: 激动肾上腺素 β_2 受体

答案：B

3. 强心苷最常见的早期心脏毒性反应是（）

- A: 二联律
- B: 房性期前收缩
- C: 房颤
- D: 室性期前收缩

答案：D

4. 属于 ACEI 类药，临床用于糖尿病肾病的是

- A: 硝苯地平
- B: 胍屈嗪
- C: 卡托普利
- D: 普萘洛尔

答案：C

5. 袢利尿药中，耳毒性最小，对听力有缺陷及急性肾衰竭者宜选用的药物是()

- A: 呋塞米
- B: 依他尼酸
- C: 托拉塞米
- D: 布美他尼

答案：D

6. 下列对外用糖皮质激素的叙述，不正确的是

- A: 糠酸莫米松是中效外用糖皮质激素
- B: 醋酸氢化可的松是弱效外用糖皮质激素
- C: 氟轻松是强效外用糖皮质激素
- D: 丁酸氢化可的松是中效外用糖皮质激素

答案：A

7. 硫脲类药物的基本作用是

- A: 抑制甲状腺素的生物合成
- B: 抑制甲状腺蛋白水解酶
- C: 抑制碘泵
- D: 抑制 Na^+-K^+ 泵

答案：A

8. 容积性泻药()

A: 地芬诺酯

B: 乳果糖

C: 甘油

D: 硫酸镁

答案：D

9. 患者，女，55 岁，2 型糖尿病史 5 年；心律失常病史 2 年长期使用胺碘酮治疗。关于胺碘酮的不良反应的说法，错误的是

A: 可掩盖低血糖症状（如心悸、手抖），但低血糖的其他症状（如出汗）仍然存在

B: 可致甲状腺功能减退较为常见发病隐匿

C: 可致甲状腺功能亢进，同时会加重心房颤动或出现快速室性心律失常

D: 可致肺毒性，早期一般表现为咳嗽，但病情发展时可出现发热和呼吸困难，表现为急性肺炎

答案：A

10. （2018 年真题）肝素过量所致出血的解救药物是（）

A: 维生素 K

B: 蛇毒血凝酶

C: 酚磺乙胺

D: 鱼精蛋白

答案：D

11. 适用于心功能比较稳定的 II～III 级心力衰竭患者的药物是

- A: 维拉帕米
- B: 卡维地洛
- C: 多巴酚丁胺
- D: 氯沙坦

答案：B

12. 以下使用雌激素类药物的方法错误的是

- A: 男性患者采用周期性治疗。即用药 3 周后停药 1 周
- B: 应用最低有效量，时间尽可能缩短，以减少可能发生的不良反应
- C: 女性子宫切除后患者采用周期性治疗，即用药 3 周后停药 1 周
- D: 有子宫的女性在周期的最后 5~7 日加用孕激素

答案：D

13. (2020 年真题) 用于散瞳的眼用药物是

- A: 复方托吡卡胺
- B: 溴莫尼定
- C: 噻吗洛尔
- D: 毛果芸香碱

答案：A

14. (2020 年真题) 患者，男，65 岁。高血压病史 8 年，血压峰值 180/110mmHg，冠心病史 5 年，双侧肾动脉狭窄，不宜选用的抗高血压药是

- A: 普萘洛尔
- B: 赖诺普利
- C: 吲达帕胺
- D: 氨氯地平

答案：B

15. 治疗血吸虫病宜选用

- A: 甲苯咪唑
- B: 甲硝唑
- C: 吡喹酮
- D: 氯喹

答案：C

16. 阿片类镇痛药与硫酸镁合用，可增强中枢抑制，导致不良反应是

- A: 便秘
- B: 低血压
- C: 胆绞痛
- D: 躁狂

答案：B

17. （2018 年真题）患者，女，28 岁，因“多汗、心慌、消瘦、易怒半月余”就诊，实验室检查显示 FT₄ 和 FT₃ 均升高，TSH 降低，甲状腺 I 度肿大，心率 92 次/分，诊断为“甲状腺功能亢进症”简称甲亢”。给予甲巯咪唑片 10mg，一日 3 次盐酸普萘洛尔片 10mg，日 3 次。患者 1 月后复查，FT₃ 和 FT₄ 恢复正常，但出现膝关节疼痛。

- A: 甲状腺激素水平恢复正常后即可停药准备妊娠
- B: 不可停药妊娠，应手术切除甲状腺后再准备妊娠
- C: 可以妊娠，选择适当的抗甲状腺药物以最小剂量维持
- D: 妊娠期间应将甲状腺功能维持在正常下限

答案：C

18. 作用机制是竞争雌激素受体的是

- A: 巯嘌呤

B: 枸橼酸他莫昔芬

C: 紫杉醇

D: 吉非替尼

答案：B

19.（2020 年真题）通过抑制 5-HT 和去甲肾上腺素（NA）再摄取，增加突触间隙 5-HT 和 NA 浓度从而增强中枢 5-HT 和 NA 能神经功能而发挥抗抑郁作用的药物是

A: 吗氯贝胺

B: 舍曲林

C: 阿米替林

D: 度洛西汀

答案：D

20.（2018 年真题）紫杉醇抗肿瘤的作用机制是（）

A: 干扰微管蛋白的合成

B: 直接抑制拓扑异构酶，并与拓扑异构酶形成复合物

C: 与 DNA 发生共价结合，使其失去活性或使 DNA 分子发生断裂

D: 抑制二氢叶酸还原酶，使二氢叶酸不能被还原成四氢叶酸

答案：A

21. 既能抗室性心律失常，又能抗癫痫的药物

A: 利多卡因

B: 地高辛

C: 胺碘酮

D: 苯妥英钠

答案：D

22. 常作为氨基糖苷类的替代品，与其合用可加强对铜绿假单胞菌作用的药物是()

- A: 美罗培南
- B: 氨曲南
- C: 克拉维酸
- D: 他唑巴坦

答案: B

23. 西咪替丁的作用原理是()

- A: 阻断 H
- B: 阻断 H
- C: 阻断 β 受体
- D: 阻断 α 受体

答案: B

24. 下述不属于扩瞳药不良反应的是()

- A: 一过性针刺感
- B: 接触性眼睑皮肤炎
- C: 结膜炎
- D: 眼压降低

答案: D

25. 禁用于妊娠妇女和小儿的药物是()

- A: 氨基糖苷类
- B: 氟喹诺酮类
- C: 大环内酯类
- D: 头孢菌素类

答案: B

26. 有促进骨骼致密作用，可用于绝经期妇女治疗骨质疏松的药物是

- A: 短效口服避孕药
- B: 孕激素
- C: 雌激素
- D: 长效避孕药

答案：C

27. 下列对甲状腺素应用的表述，错误的是

- A: 左甲状腺素是主要替代治疗药，一般需终身替代
- B: 成人初始剂量 25~50 μg ，一日 1 次
- C: 可用于呆小病的治疗
- D: 本类药起效迅速，24h 达血药浓度高峰

答案：D

28. 对急性心肌梗死引起的室性心律失常有效，对室上性心律失常基本无效的药物是()

- A: 苯妥英钠
- B: 利多卡因
- C: 地高辛
- D: 胺碘酮

答案：B

29. 心律失常者慎用的治疗浅表真菌感染的药物是

- A: 咪康唑
- B: 益康唑
- C: 两性霉素 B
- D: 制霉菌素

答案：A

30. 地高辛的中毒血清浓度为()

A: >50ng/ml

B: >5ng/ml

C: >2ng/ml

D: >20ng/ml

答案：C

31. 华法林过量导致的出血可选用的拮抗剂是()

A: 氨甲苯酸

B: 维生素 B

C: 维生素 K

D: 硫酸鱼精蛋白

答案：C

32. 不宜与三环类抗抑郁药合用的是()

A: 酚甘油滴耳液

B: 麻黄碱

C: 赛洛唑啉

D: 羟甲唑啉

答案：B

33. 某些慢性疾病使用地塞米松长期治疗，为减少外源性激素对下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴的抑制，推荐给药时间是

A: 上午 8 时左右

B: 中午 12 时左右

C: 下午 4 时左右

D: 空腹

答案：A

34. 丙烯胺类抗真菌的代表药为 ()

A: 卡泊芬净

B: 伏立康唑

C: 伊曲康唑

D: 特比萘芬

答案：D

35. 可用于治疗乙型肝炎病毒感染的药物是

A: 更昔洛韦

B: 金刚烷胺

C: 阿昔洛韦

D: 恩替卡韦

答案：D

36. 与避孕药合用，可能导致避孕失败的药物不包括

A: 苯巴比妥

B: 利福平

C: 环孢素

D: 四环素

答案：C

37. 阿米卡星与万古霉素合用 ()

A: 药理作用拮抗

B: 不良反应叠加

C: 后者血药浓度升高，不良反应增加

D: 后者血药浓度下降，药效降低

答案：B

38. 以下哪项不属于硝酸酯类药物的使用禁忌证()

A: 收缩压<90mmHg 的严重低血压

B: 梗阻性肥厚型心肌病

C: 急性前壁心肌梗死

D: 重度主动脉瓣和二尖瓣狭窄

答案：C

39. 氢氯噻嗪的药理作用是()

A: 抑制远曲小管 Na

B: 与醛固酮受体结合

C: 提高血浆渗透性，产生组织脱水作用

D: 抑制近曲小管的碳酸酐酶活性

答案：A

40. (2017 年真题) 可用于吗啡中毒解救的药物是 ()

A: 苯甲酸钠咖啡因

B: 纳洛酮

C: 阿托品

D: 氟马西尼

答案：B

41. 需要内因子辅助吸收的维生素是

A: 叶酸

B: 维生素 B6

C: 维生素 B12

D: 烟酸

答案: C

42. 多黏菌素主要作用于

A: 厌氧菌

B: 革兰阳性菌

C: 支原体

D: 革兰阴性杆菌

答案: D

43. 外耳道红肿局部治疗可选用

A: 3%硼酸乙醇

B: 赛洛唑啉

C: 伪麻黄碱

D: 2%酚甘油

答案: D

44. 治疗厌氧菌引起的严重感染最适合的是

A: 万古霉素

B: 克拉霉素

C: 红霉素

D: 克林霉素

答案: D

45. 对焦虑型、夜间醒来次数较多或早醒者可选用的苯二氮?类镇静催眠药是

A: 非苯二氮?类药物

B: 地西泮

C: 苯二氮?类药物

D: 氟西泮

答案：D

46. 外用糖皮质激素作用强度的比较，正确的是()。

A: 卤米松>氟轻松>地塞米松

B: 地塞米松>卤米松>氟轻松

C: 卤米松>地塞米松>氟轻松

D: 地塞米松>氟轻松>卤米松

答案：A

47. (2019 年真题) 服用异烟肼进行抗结核治疗的患者，为预防周围神经炎，应补充的维生素是 ()

A: 维生素 B2

B: 维生素

C: 维生素 B6

D: 维生素 A

答案：C

48. 属于 5a 还原酶抑制剂的是

A: 他达拉非

B: 坦洛新

C: 度他雄胺

D: 西地那非

答案：C

49. 甲氨蝶呤主要用于

A: 室管膜瘤

- B: 慢性粒细胞性白血病
- C: 儿童急性白血病
- D: 神经母细胞瘤

答案：C

50. 不属于抗代谢抗肿瘤药的是

- A: 环磷酰胺
- B: 阿糖胞苷
- C: 氟尿嘧啶
- D: 甲氨蝶呤

答案：A

51. 对耐药金黄色葡萄球菌感染有效的 β -内酰胺类抗生素是()

- A: 苯唑西林
- B: 甲硝唑
- C: 喹诺酮类
- D: 四环素

答案：A

52. 甲氨蝶呤、培美曲塞属于()

- A: DNA 多聚酶抑制剂
- B: 二氢叶酸还原酶抑制剂
- C: 胸腺核苷合成酶抑制剂
- D: 核苷酸还原酶抑制剂

答案：B

53. 不得与碱性物质或铁器接触的是()

- A: 克罗米通

- B: 阿达帕林
- C: 林旦霜
- D: 苯甲酸苄酯

答案：C

54. 腺病毒可致

- A: 角膜炎
- B: 流行性结膜炎
- C: 巨细胞病毒性视网膜炎
- D: 急性出血性结膜炎

答案：B

55. 下列关于眼部抗菌药物的描述，错误的是

- A: 夫西地酸不可用于治疗葡萄球菌感染
- B: 氟喹诺酮类及氨基糖苷类具有广谱抗菌活性
- C: 多黏菌素 B 对铜绿假单胞菌引起的感染有效
- D: 妥布霉素对铜绿假单胞菌引起的感染有效

答案：A

56. 胰岛素的不良反应有

- A: 低血糖昏迷
- B: 酮症酸中毒
- C: 高血糖高渗性昏迷
- D: 骨髓抑制

答案：A

57. 可引起下肢水肿的抗高血压药物是

- A: 普萘洛尔

B: 硝酸甘油

C: 洛伐他汀

D: 硝苯地平

答案：D

58. (2016 年真题) 外用糖皮质激素作用强度的比较，正确的是

A: 地塞米松>氟轻松>卤米松

B: 卤米松>氟轻松>地塞米松

C: 卤米松>地塞米松>氟轻松

D: 地塞米松>卤米松>氟轻松

答案：B

59. 使用奥沙利铂后最需要关注的典型不良反应是

A: 肝毒性

B: 消化道反应

C: 神经毒性

D: 肾毒性

答案：C

60. 作用于 DNA 拓扑异构酶 II 的抗肿瘤药物是

A: 依托泊苷

B: 来曲唑

C: 顺铂

D: 紫杉醇

答案：A

61. 血管紧张素转化酶 I 抑制剂是()

A: 多巴酚丁胺

B: 依那普利

C: 米力农

D: 地高辛

答案：B

62. 碳酸钙用于肾衰竭患者降低血磷时,适宜的服药时间是()

A: 餐后 2h

B: 餐前即刻

C: 餐中

D: 清晨或睡前

答案：C

63. 患者，女，45 岁。因持续的烧心和反酸就诊，诊断为胃食管反流病，宜选用的抑酸药物是（）

A: 米索前列醇

B: 雷尼替丁

C: 吉法酯

D: 乳酶生

答案：B

64. 对抗香豆素过量引起出血可选用

A: 维生素

B: 垂体后叶素

C: 维生素 K1

D: 鱼精蛋白

答案：C

65. 属于电解质补充药,可用于低钾血症和洋地黄中毒引起的心律失常的药物是()

- A: 多烯磷脂酰胆
- B: 门冬氨酸钾镁
- C: 双环醇
- D: 异甘草酸镁

答案: B

66. 替罗非班的作用机制是

- A: 阻断血小板糖蛋白 IIb/IIIa 受体
- B: 抑制凝血酶
- C: 拮抗维生素 K
- D: 抑制凝血因子 X

答案: A

67. (2017 年真题) 药师在急诊药房值班时,接听病房咨询电话,得知一新入院耐甲氧西林金黄葡萄球菌肺部感染的 7 岁儿童患者,出现高热、肺纹加重,患儿肾功能正常。欲静脉滴注万古霉素。

- A: 替考拉宁
- B: 头孢哌酮
- C: 头孢曲松
- D: 阿米卡星

答案: A

68. 关于青霉素不良反应的说法不正确的是

- A: 有明显的肾毒性和耳毒性
- B: 可发生过敏性休克、荨麻疹、血管神经性水肿等
- C: 局部刺激症状如注射部位疼痛、硬结较常发生

D: 可引起接触性皮炎、血清病样反应等

答案：A

69. 下列不属于胃肠解痉药的是

A: 山莨菪碱

B: 颠茄

C: 阿托品

D: 多潘立酮

答案：D

70. () 与利福平合用时，在用利福平前和疗程中不需调整剂量

A: 糖皮质激素

B: 地高辛

C: 氨茶碱

D: 氯霉素

答案：B

71. 具有磺胺类药物结构，作用于近曲小管的利尿药是

A: 螺内酯

B: 氢氯噻嗪

C: 乙酰唑胺

D: 呋达帕胺

答案：C

72. 对心肌梗死患者，若无禁忌，应尽快给予阿司匹林的初始剂量为每日

A: 150~300mg

B: 75~150mg

C: 10~25mg

D: 25~50mg

答案：A

73. 呋塞米可增加下列哪种药物的耳毒性

A: 四环素

B: 青霉素

C: 链霉素

D: 磺胺嘧啶

答案：C

74. 需要迅速抗血小板作用时，不能选用的二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断剂是

A: 氯吡格雷

B: 替格雷洛

C: 替罗非班

D: 噻氯匹定

答案：D

75. 抑制 Na

A: 乙酰唑胺

B: 氨苯蝶啶

C: 呋塞米

D: 氢氯噻嗪

答案：D

76. (2018 年真题) 关于胶体果胶铋用药教育的说法, 错误的是 ()

A: 妊娠期妇女禁用胶体果胶铋

- B: 胶体果胶铋使用后大便可能会变黑
- C: 胶体果胶铋宜与牛奶同时服用
- D: 胶体果胶铋使用后口中可能有氨味

答案：C

77. 下列药物中，不属于蒽环类抗肿瘤抗生素的是

- A: 红霉素
- B: 柔红霉素
- C: 多柔比星
- D: 表柔比星

答案：A

78. 不易透过血-脑屏障，药理作用单一，主要用于治疗膀胱过度活动症的非选择性 M 受体阻断药是

- A: 奥昔布宁
- B: 托特罗定
- C: 黄酮哌酯
- D: 索利那新

答案：B

79. 能进入含有结核杆菌的巨噬细胞中，渗入结核菌体，在菌体内特定酶的作用下化，且在酸性环境中作用更强的抗结核药物是()

- A: 链霉素
- B: 利福平
- C: 吡嗪酰胺
- D: 乙胺丁醇

答案：C

80. 以下哪项不是雷洛昔芬的禁忌症

- A: 心力衰竭患者
- B: 肝肾功能不全者
- C: 正在或既往患有静脉血栓栓塞性疾病者
- D: 有子宫内膜癌症状和体征者

答案：A

81. 属于棘白菌素类的是

- A: 卡泊芬净
- B: 制霉菌素
- C: 氟胞嘧啶
- D: 特比萘芬

答案：A

82. 用于呼吸道合胞病毒引起的肺炎与支气管炎治疗的抗病毒药物是

- A: 利巴韦林
- B: 阿昔洛韦
- C: 金刚烷胺
- D: 碘苷

答案：A

83. 长期频繁使用可致眼部真菌感染

- A: 利巴韦林
- B: 四环素可的松
- C: 氯霉素
- D: 更昔洛韦

答案：B

84. 可用于治疗精神分裂症的是

- A: 地西泮
- B: 卡马西平
- C: 硫酸镁
- D: 氯丙嗪

答案：D

85. 属于单酰胺菌素类，抗菌谱窄，与青霉素、头孢菌素无交叉过敏反应的药物是

- A: 氨曲南
- B: 卡泊芬净
- C: 特比萘芬
- D: 复方磺胺甲噁唑

答案：A

86. 以下避孕药不受月经周期限制的是

- A: 左炔诺孕酮
- B: 去氧孕烯
- C: 双炔失碳酯
- D: 孕二烯酮

答案：C

87. 对红霉素的描述，下列不正确的是

- A: 对青霉素耐药的金黄色葡萄球菌有效
- B: 属繁殖期杀菌剂
- C: 具有肝脏毒性
- D: 抗菌谱与青霉素相似但略广

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/556200140110011030>