

# 2024 年西藏自治区那曲市医疗三严三基理论考试题库及答案

医院科室：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_ 考场：\_\_\_\_\_ 考号：\_\_\_\_\_

## 一、选择题

1. 已在主动脉第二听诊区闻及舒张期喘息性杂音,下列哪项体征支持主动脉瓣关闭不全的诊断( )

A、心尖区舒张期震颤

B、P 亢进分裂

C、交替脉

D、心界向左扩大

E、血压 150/70mmHg

答案:

E

2. 肾功能衰竭患者应( )

A、供给大量豆制品

B、禁用鱼肉类食品

C、生物价值高的低蛋白质膳食

D、限制碳水化物供给

E、限制维生素的供给

答案：

C

3. 下列哪种属甲类传染病( )

A、霍乱

B、艾滋病

C、梅毒

D、炭疽

E、麻疹

答案：

A

4. 咽鼓管鼓口开口于鼓室的( )

A、上壁

B、下壁

C、前壁

D、内壁

E、后壁

答案:

C

5. 以下关于颅骨凹陷骨折的说法错误的是( )

A、有明确的头部外伤史

B、凹陷面积大时,可有颅高压症状

C、CT 骨窗可了解颅骨凹陷深度及部位

D、非功能区的轻度凹陷骨折以保守治疗为主

E、多发生于枕部

答案:

E

6. 当被沾有 HBsAg 阳性血的针头刺伤时,立即应做的主要处理是( )

A、伤口立即涂以碘酊

B、给受伤者立即注射丙种球蛋白

C、受伤者立即抽血作乙型肝炎病毒全套抗原抗体检测

D、乙型肝炎病毒高价免疫血清注射

E、乙型肝炎病毒疫苗注射

答案:

D

7. 男,22岁,血压 143/90 mmHg,大量尿蛋白,血浆清蛋白 25 g/L。下列何种疾病可能性大( )

A、隐匿性肾炎

B、高血压肾小动脉硬化

C、急性肾炎

D、肾病综合征

E、慢性肾炎

答案:

D

8. 核素诊断肝海绵血管瘤的最恰当的方法是( )

A、肝胶体显像

B、肝阳性显像

C、肝血池显像

D、肝胶体和肝血池联合显像

E、肝胆显像

答案:

D

9. 下列哪项不是高血压的并发症?()

A、心力衰竭

B、脑梗死

C、眼底血管病变

D、肝脏受累

E、肾脏受累

答案:

D

10. 药物产生的副作用剂量是

A、中毒量

B、LD

C、无效剂量

D、极量

E、治疗剂量

答案:

E

11. 下列恶性组织细胞病临床表现中哪项有误( )

- A、不规则发热
- B、进行性全血细胞减少
- C、进行性肝脾大
- D、进行性淋巴结肿大
- E、进行性呼吸困难

答案:

E

12. 深部脓肿的特点是( )

- A、局部波动感明显
- B、全身中毒症状不明显
- C、局部仅有红肿现象,但无压痛
- D、局部红肿,压痛明显,穿刺可抽到脓液
- E、局部红、肿、热、痛明显

答案:

D

13. 阿托品的禁忌症是:( )

- A、心动过缓
- B、感染性休克
- C、肾上腺素
- D、前列腺肥大
- E、支气管哮喘

答案:

D

14. 纠正呼吸性酸中毒最主要的措施是( )

- A、输碱性溶液
- B、纠正电解质紊乱
- C、改善通气
- D、用脱水剂
- E、输注生理盐水

答案:

C

15. 输尿管的3个狭窄,由起始端至末端依次为( )

- A、出肾门处、与髂血管交叉处、壁内段

- B、与肾盂移行处、与髂血管交叉处、壁内段
- C、出肾门处、越小骨盆入口处、壁内段
- D、与肾盂移行处、越小骨盆入口处、膀胱后部
- E、与肾盂移行处、与髂血管交叉处、膀胱后部

答案：

B

16. 肝性脑病给予肠道消毒剂的最主要目的是( )

- A、清除致病菌的毒素
- B、减少真菌繁殖
- C、抑制肠道细菌减少氨的形成
- D、预防原发性腹膜炎
- E、防止继发性肠道感染

答案：

C

17. 测血压时,袖带过窄将使测得的血压( )

- A、增高
- B、降低

C、舒张压降低,脉压增大

D、脉压变小

E、不受影响

答案:

A

18. 药物产生不良反应的剂量是( )

A、中毒量

B、TD

C、无效剂量

D、极量

E、治疗剂量

答案:

E

19. 斯氏并殖吸虫所致的皮下包块病理学检查可见

A、嗜酸性肉芽肿

B、虫卵

C、尾蚴

、夏科-雷登晶体

E、成虫

A

20. 习惯性晚期流产最常见的原因是( )

A、孕卵发育异常

B、黄体功能不全

C、甲状腺功能不全

D、染色体异常

E、子宫颈内口松弛

答案：

E

21. 脊髓灰质炎病毒的传播方式下述哪项是不可能的

A、通过粪-口传播

B、通过输血传播

C、通过污染的食物、手及玩具传播

D、通过污染的水传播

、通过呼吸道传播

B

22. 在宿主抗移植物排斥反应中,下列哪种反应最严重( )

A、急性排斥反应

B、超急性排斥反应

C、慢性排斥反应

D、亚急性排斥反应

E、迟发排斥反应

答案:

B

23. 细胞外液量占体重的

A、30%

B、20%

C、15%

D、5%

答案:

24. 药膳的组成是( )

A、中药与食物

B、西药与食物

C、中药、食物与调料

D、食物与调料

E、中药与西药

C

25. 清创术下列操作哪项是错误的( )

A、伤口周围油污应用松节油擦去

B、伤口周围皮肤用碘酊、乙醇消毒

C、切除失去活力的组织和明显挫伤的创缘组织

D、深部伤口不宜再扩大

E、用无菌生理盐水或过氧化氢冲洗伤口

答案:

D

· 胃癌分化最好的类型是( )

A、髓样癌

B、硬癌

C、粘液癌

D、腺癌

E、未分化癌

D

27. 显示组织及细胞内多肽和蛋白的最佳方法是:( )

A、免疫细胞化学术

B、同位素示踪术

C、PAS 反应

D、Feulgen 反应

E、H-E 染色

答案:

A

28. 高钾血症时心电图的特点是( )

、T波高尖,QRS波群增宽

B、T波低平,QT间期缩短

C、T波低平,QT间期延长

D、T波正常,QT间期延长

E、T波低平,出现U波

A

29. 开放性骨折清创术中哪项处理是错误的( )

A、对仍有血液供应的皮肤,只切除1~2 mm 的污染区

B、若皮肤剥离面广,应将表面皮肤切开,显露皮下创腔或隧道

C、彻底切除失去活力的筋膜、肌肉和肌腱

D、彻底清除大小游离碎骨片

E、保留与骨膜和软组织有联系的小骨片

答案:

D

30. 推动人体生长发育及脏腑功能活动的是( )

A、中气

、营气

C、卫气

D、元气

E、宗气

D

31. 循环血液中的凝血块,随血流运行至相应大小的血管,引起管腔阻塞的过程叫做:( )

A、血栓

B、血栓形成

C、血栓栓塞

D、梗塞

E、血栓栓子

答案:

D

32. 描述一组偏态分布资料的平均水平,以下列哪个指标较好( )

A、算术均数

B、几何均数

C、百分位数

D、四分位数间距

E、中位数

答案：

E

33. 除了哪一项外,下列均为胃溃疡的肉眼病变特点( )

A、溃疡通常只有一个

B、溃疡呈圆形或椭圆形

C、溃疡直径一般大于 2cm

D、溃疡底部干净、光滑、边缘整齐

E、溃疡深达肌层或浆膜层

答案：

C

34. 判断肾功能最常用的指标是( )

A、放射性核素邻 I 马尿酸钠测定肾血浆流量

B、经皮肾活检病理组织学检查

C、内生肌酐清除率

D、静脉肾盂造影

E、菊粉清除率

答案：

C

35. 术前患者的营养补充最好的选择是( )

A、高蛋白膳食

B、粗细粮搭配食用

C、低盐

D、低胆固醇膳食

E、高热能、高维生素膳食

答案：

E

36. 病历书写不正确的是( )

A、入院记录需在 24 小时内完成

B、出院记录应转抄在门诊病历中

C、接收(转入)记录由接受科室医师书写

D、转科(转出)记录由转出科的住院医师书写

E、手术记录由参加手术者均可书写

答案：

E

37. 心交感神经末梢释放( )

A、去甲肾上腺素

B、血管紧张素

C、肾上腺素

D、乙酰胆碱

E、组胺

答案：

A

38. 属非细胞型微生物的是( )

A、立克次体

B、衣原体

C、真菌

D、支原体

E、病毒

答案：

E

39. 高压氧的绝对禁忌证之一是( )

A、急性鼻窦炎

B、活动性肺结核

C、未经处理的气胸

D、有颅骨缺损者

E、妇女月经期与妊娠期

答案：

C

40. 儿童最常见的原发性眶内恶性肿瘤是

A、海绵状血管瘤

B、炎性假瘤

C、脑膜瘤

D、横纹肌肉瘤

答案：

D

41. 测量小儿血压时的袖带宽度应为( )

A、上臂长度的 4/5

B、上臂长度的 2/3

C、上臂长度的 1/2

D、上臂长度的 1/3

E、上臂长度的 1/4

答案:

B

42. 内毒素特性( )

A、强抗原性

B、毒性强

C、细菌的细胞壁裂解后才能游离出来

D、经甲醛处理可脱毒为类毒素

E、不耐热,易变性

答案:

C

43. 检查发现病人胸廓的前后径等于横径,肋间隙增宽,应考虑为( )

- A、扁平胸
- B、鸡胸
- C、正常胸廓
- D、漏斗胸
- E、桶状胸

答案：

E

44. 一侧瞳孔直接对光反应消失,间接光反应存在,病变在( )

- A、同侧动眼神经
- B、对侧动眼神经
- C、同侧视神经
- D、对侧视神经
- E、视交叉

答案：

C

45. 股静脉内血栓脱落引起栓塞下列哪一项是不正确的( )

- A、大多数栓塞于肺

- B、都发生出血性梗死
- C、如栓塞于肺动脉主干常引起猝死
- D、伴有心力衰竭时一定发生相应部位的梗死
- E、如有心间隔缺损亦可栓塞于脑

答案：

B

46. 食管异物最危险的并发症是( )

- A、颈部皮下气肿
- B、食管周围炎
- C、食管周围脓肿
- D、纵隔气肿
- E、刺破大血管

答案：

E

47. 男,60岁,发热、咳嗽月余,伴乏力消瘦,体格检查叩得右下肺浊音。下列情况可除外( )

- A、肺空洞

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/556235114242010225>