

2020 年新入护理人员 8 月考试试题（内科）

科室：[填空题] *

姓名：[填空题] *

1.抗甲状腺药物治疗的总疗程一般为（） [单选题] *

- A.0.5 ~ 1 年
- B.1 ~ 1.5 年
- C.1 ~ 2 年
- D.1.5 ~ 2 年(正确答案)
- E.2 ~ 3 年

2.早餐前注射常规胰岛素，发生低血糖多在（） [单选题] *

- A.注射后半小时
- B.注射后 2 ~ 4 小时(正确答案)
- C.午餐后
- D.晚餐前
- E.夜间

3.西方国家急性胰腺炎最常见的原因（） [单选题] *

- A.胆道系统疾病
- B.胰管阻塞
- C.酗酒(正确答案)
- D.暴饮暴食

E.胰、胆手术

4.某人患1型糖尿病，查餐后2小时血糖15mmol/L(270mg/dl)。给胰岛素静滴，静滴时患者自觉多汗、手抖、饥饿，应考虑其原因是（） [单选题] *

A.低血压

B.低血糖(正确答案)

C.静滴速度过快

D.药物过敏

E.精神紧张

5.下列哪项为痛风的首发症状（） [单选题] *

A.高尿酸血症

B.突发性脚趾关节疼痛(正确答案)

C.痛风石

D.间质性肾炎

E.尿酸性尿路结石

6.甲状腺功能亢进患者大便次数多，是因为（） [单选题] *

A.肠蠕动过快(正确答案)

B.甲状腺素过少

C.高热

D.饮水过多

E.进食纤维素过多

7.糖尿病患者在家注射速效胰岛素，出现极度饥饿、软弱、手抖、出汗、头晕等，此时应当（） [单选题] *

A.让患者卧床休息至症状消失

- B.让患者平卧并协助活动四肢
- C.立即给一些口服糖块(正确答案)
- D.立即打电话询问保健医生
- E.立即送至附近医院

8.某糖尿病患者经常发生发热、腰痛、尿频、尿痛、尿急，经医院确诊糖尿病合并肾盂肾炎，其病情反复发作的原因是（） [单选题] *

- A.身体衰弱
- B.尿中有糖易于感染(正确答案)
- C.膀胱结石
- D.前尿道有损伤
- E.会阴部疾病

9.某II型糖尿病患者，体态肥胖，“三多一少”症状不太明显，长期采用饮食控制、休息、口服降糖药，但血糖仍高，对此下列哪项处理最恰当（） [单选题] *

- A.改用胰岛素治疗
- B.增加运动疗法(正确答案)
- C.加大降糖药剂量
- D.加强血糖自我监测
- E.住院进一步检查

10.造成糖尿病患者失明的主要原因是（） [单选题] *

- A.白内障
- B.颅内压增高
- C.视网膜病变(正确答案)
- D.脑血管意外
- E.视乳头水肿

11.抗甲状腺药物致命性不良反应为（） [单选题] *

- A.低血糖
- B.过敏反应
- C.粒细胞缺乏(正确答案)
- D.肝损害
- E.甲状腺功能低下

12.能反映患者取血前 8 ~ 12 周血糖水平的检查是（） [单选题] *

- A.尿糖
- B.随机血糖
- C.口服葡萄糖耐量试验
- D.糖化血红蛋白(正确答案)
- E.餐后 2 小时血糖

13.肝硬化最突出的临床表现为（） [单选题] *

- A.肝大
- B.脾大
- C.腹水(正确答案)
- D.呕血
- E.交通支扩张

14.治疗溃疡性结肠炎的首选药物是（） [单选题] *

- A.肾上腺糖皮质激素
- B.柳氮磺胺吡啶(正确答案)
- C.前列腺素
- D.甲硝唑

E.阿莫西林

15.血清淀粉酶超过正常值至少多少倍可诊断为急性胰腺炎 () [单选题] *

A.2 倍

B.3 倍(正确答案)

C.4 倍

D.5 倍

E.6 倍

16.消化性溃疡的发生与何种病原菌感染有关 () [单选题] *

A.链球菌

B.肺炎球菌

C.幽门螺杆菌(正确答案)

D.金黄色葡萄球菌

E.肠埃希菌

17.肝硬化并发自发性腹膜炎患者的腹水性质一般为 () [单选题] *

A.渗出液(正确答案)

B.漏出液

C.乳糜液

D.血性

E.草黄色

18.甲状腺肿大压迫食管可出现 () [单选题] *

A.呼吸困难

B.吞咽困难(正确答案)

C.声音嘶哑

D.浅静脉扩张

E.食管梗阻

19.关于 I 型糖尿病的描述，下列哪项错误（） [单选题] *

A.多见于青少年

B.起病较急

C.“三多一少”症状常较显著

D.血糖波动小而稳定(正确答案)

E.有自发性酮症倾向

20.肝硬化腹水性质一般为（） [单选题] *

A.渗出液

B.漏出液(正确答案)

C.乳糜液

D.血性

E.草黄色

21.患者男性，40岁，上腹隐痛伴反酸、暖气2个月，诊为十二指肠溃疡。对其用药指导中错误的是（） [单选题] *

A.硫糖铝在餐前服用

B.硫糖铝有黏膜保护作用

C.奥美拉唑应在餐前服用(正确答案)

D.奥美拉唑应避免与牛奶同时服用

E.奥美拉唑可有效抑制胃酸分泌

22.原发性甲状腺功能减退症最常见原因（） [单选题] *

A.使用抗甲状腺药物

- B.缺碘
- C.碘过量
- D.自身免疫性甲状腺炎(正确答案)
- E.甲状腺手术切除

23.肝性脑病最早出现的临床表现是 () [单选题] *

- A.定向力障碍
- B.性格改变和行为失常(正确答案)
- C.睡眠障碍
- D.神志丧失
- E.昏睡

24.消化性溃疡患者节律性疼痛变为持续性，进食或服用制酸药后长时间不能缓解，并向背部放射时，可能是发生了 () [单选题] *

- A.癌变(正确答案)
- B.出血
- C.穿孔
- D.幽门梗阻
- E.胃底静脉破裂

25.十二指肠溃疡患者上腹部疼痛的典型节律是 () [单选题] *

- A.疼痛-进食-缓解(正确答案)
- B.进食-缓解-疼痛
- C.缓解-疼痛-进食
- D.进食-疼痛-缓解
- E.疼痛-进食-疼痛

26.消化性溃疡患者出血不宜采用的止血方法是 () [单选题] *

- A.用冰盐水洗胃
- B.内镜下喷洒止血药
- C.三腔二囊管(正确答案)
- D.用激光止血
- E.口服止血药

27.口服葡萄糖耐量试验的采血时间为 () [单选题] *

- A.0-15'-30'-45'-60'
- B.0-15'-30'-60'-120'
- C.0-30'-60'-90'-120'
- D.0-30'-60'-120'-180'(正确答案)
- E.0-60'-120'-180'-240'

28.肝硬化腹水患者饮食中钠含量应限制在 () [单选题] *

- A.300 ~ 500mg/d
- B.400 ~ 500mg/d
- C.500 ~ 800mg/d(正确答案)
- D.800 ~ 1000mg/d
- E.1000 ~ 2000mg/d

29.甲状腺功能减退症患者饮食指导 () [单选题] *

- A.高蛋白、高脂饮食
- B.高维生素、低脂、高钠饮食
- C.优质蛋白、低钠饮食
- D.高蛋白、低脂、限制维生素摄入
- E.高蛋白、高维生素、低脂、低钠饮食(正确答案)

30.糖尿病酮症酸中毒的特征性表现为 () [单选题] *

- A.呼吸加深加速
- B.皮肤黏膜干燥
- C.昏迷
- D.二氧化碳结合力下降
- E.呼气有烂苹果味(正确答案)

31.确诊慢性胃炎最可靠的检查方法 () [单选题] *

- A.活组织检查
- B.胃肠钡餐检查
- C.纤维胃镜检查(正确答案)
- D.胃液分析
- E.血清学检查

32.患者女性, 46岁, 3年前出现皮肤瘙痒和黄疸, 诊断为原发性胆汁性肝硬化, 近一周黄疸加深, 出现大量腹水, 在护理中不正确的是 () [单选题] *

- A.按医嘱给予利尿剂
- B.指导患者取半坐卧位以减轻呼吸困难
- C.定期测量腹围
- D.进水量限制在 1000ml/d 左右, 准确记录每日出入液量
- E.低盐饮食, 限制每日食盐 5g(正确答案)

33. II型糖尿病患者最常见的死亡原因是 () [单选题] *

- A.感染
- B.低血糖
- C.糖尿病肾病
- D.酮症酸中毒
- E.心脑血管意外(正确答案)

34.慢性胃炎的主要病原菌是（） [单选题] *

- A.肠埃希菌
- B.幽门螺杆菌(正确答案)
- C.链球菌
- D.金黄色葡萄球菌
- E.军团菌

35.幽门螺杆菌根治后复查首选方法（） [单选题] *

- A.快速尿素酶试验
- B.幽门螺杆菌培养
- C.¹⁴C 尿素呼气试验(正确答案)
- D.血清抗幽门螺杆菌抗体检测
- E.粪便幽门螺杆菌检查

36.下列属于糖尿病急性并发症的是（） [单选题] *

- A.糖尿病神经病变
- B.动脉粥样硬化
- C.糖尿病视网膜病病变
- D.酮症酸中毒(正确答案)
- E.糖尿病肾病

37.下面有关食管胃底静脉曲张破裂出血患者的饮食护理不妥的是（） [单选题] *

- A.出血期间应禁食
- B.止血后可渐进高热量饮食、高蛋白饮食(正确答案)
- C.避免粗糙、坚硬食物
- D.避免刺激性食物

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/557021001062006036>