

# 急诊科护理岗位定级考核试题

## 一、单选题

1、残疾和神经功能评估不包括（） [单选题] \*

A、意识水平

B、瞳孔大小和反应

C、肢体活动 V

D、神经定位

E、脊髓损伤平面

2、下列对于《医疗废物管理规定》描述不正确的是（） [单选题] \*

A、医疗废物可暂存在水房 V

B、隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的医疗废物应当使用双层包装物，并及时密封

C、盛装医疗废物达到包装物或容器的 3/4 时，应使用有效的封口方式

D、医疗废物储存时间不得超过 2 天

E、《医疗废物交接记录表》双方签字，一式两份，记录单保存 3 年

3、I、II级不良事件需要在（）小时内，通过不良事件软件上报。 [单选题] \*

A、2 小时

B、12 小时

C、24 小时 ✓

D、48 小时

E、72 小时

4、患者李某，饮酒后烦躁，由平车推入急诊多学科合一诊室，接诊护士在与家属沟通登记时，患者不慎坠车，护士与医生急忙上去，经检查左前额有一约 3.5cm 伤口，活动性出血，CT 检查未见明显异常，其他无阳性指征。该护理不良事件属于（）级。 [单选题] \*

- A、Ⅰ级
- B、Ⅱ级
- C、Ⅲ级 ✓
- D、Ⅳ级
- E、Ⅴ级

5、患者王某，女性，身高 161 厘米，体重 62kg,该患者体重按照中国体重指数标准属于（） [单选题] \*

- A、体重过轻
- B、体重正常，
- C、超重
- D、肥胖
- E、超级肥胖

6、患者的交接内容不包括以下哪项（） [单选题] \*

- A、神志及生命体征
- B、交接上一班患者病情、治疗及护理经过
- C、交接各种管路，包括名称、数量、部位、固定、有无打折滑脱、以及引流液的颜色性质量
- D、交接患者目前用的药及剩余的药物
- E、交接各种物品及药品的数量 ✓

7、颅脑外伤的患者为防止颅内继发感染应采取（） [单选题] \*

- A、头部受伤后可见血液和脑脊液从耳、鼻流出，应将患者采取头高脚底位

- B、可用布类或棉花堵塞外耳道或鼻腔
- C、有脑脊液或血液流出时，应将患者平卧位，患侧向下 V
- D、以上都正确

8、心肺复苏机适应症不包括（） [单选题] \*

- A、心肌梗塞引起的心脏停搏
- B、溺水引起的心脏停搏
- C、脑卒中引起的
- D、婴幼儿心脏停搏 ✓
- E、新冠引起的心脏停搏

9、心电监护电极片常规（）时间更换一次，血压袖带每（）更换测量部位 [单选题] \*

- A、24 小时，半小时
- B、1-2 天，2 小时
- C、3 · 4 天， 4 小时 ✓
- D、5-6 天，8 小时
- E、一周，12 小时

10、Ⅱ型呼吸衰竭，关于 PaO<sub>2</sub> 和 PaCO<sub>2</sub> 描述正确的是（ [ [单选题] \*

- A、PaO<sub>2</sub><60mmHg,PaCO<sub>2</sub> 正常或下降
- B、PaO<sub>2</sub><60mmHg,PaCO<sub>2</sub>>50mmHg V
- C、PaO<sub>2</sub>>60mmHg,PaCO<sub>2</sub><50mmHg
- D、PaO<sub>2</sub>>60mmHg,PaCO<sub>2</sub>>50mmHg
- E、PaO<sub>2</sub>>60mmHg,PaCO<sub>2</sub> 正常

A、 7.35-7.45v

B、 7.25-7.35

C、 7-7.25

D、 6.75-7.15

E、 7.35-7.5

12、血气分析中，PH 值正常， $\text{PaCO}_2 < 35\text{mmHg}$ ,  $\text{BE} < -3\text{mmol/L}$  表示该患者处于（） [单选题] \*

A、呼碱合并代碱

B、呼碱合并代酸 ✓

C、呼酸

D 代酸

E、正常

13、关于呼吸机报警"气道压高"原因错误的是（） [单选题] \*

A、模式设置不当 ✓

B、呼吸机管路打折

C、人工气道脱出

D、患者气道分泌物多

E、肺 J 顺应性降低

14、责任护士职责中对所分管患者的八知道，不包括（） [单选题] \*

A、床号，姓名，诊断

B、病情

C、治疗、护理

D、饮食、心理

E、出院指导 ✓

15、患者王某，入院后评估患者自理能力为轻度依赖（60 分<ADL< 100 分），未明确诊断仍需观察，该患者因给予（）级护理 [单选题] \*

A、特级

B、I 级护理

C、II 级护理 ✓

D、III 级护理

16、护士作为健康协调者的角色，是因为护士在临床护理中要（） [单选题] \*

A、满足病人需要

B、具有开拓精神

C、起协调和促进作用 ✓

D、给病人进行健康宣教

17、法律规定应当向患者告知真实病情,但在保护性医疗情况下不宜向患者说明时,应当（） [单选题] \*

A、只能向患者的配偶说明 ✓

B、向患者的近亲属说明

C、向患者的单位领导说明

D、向患者所在街道办事处说明

18、因抢救急危患者，未能及时书写病历的，有关医务人员应当在抢救结束后（）据实补记，并加以注明。 [单选题] \*

A、2 小时

B、4 小时

C、6 小时 ✓

D、12 小时

19、全血、红细胞的储藏温度应当控制在（） [单选题] \*

A、0℃以下

B、2-6℃

C、8-10℃

D、常温

20、PN 宜现用现配，应在（）小时内输注完毕。 [单选题] \*

A、4

B、8

C、12

D、24h

21、连续输液时，输液器应在（）更换 1 次，如怀疑被污染或完整性受到破坏时，应立即更换。 [单选题] \*

A、6h

B、12h

C、24h

D、48h

22、自理能力重度依赖的患者可确定为几级护理：（） [单选题] \*

A、特级护理

B、一级护理 ✓

C、二级护理

D、三级护理

23、中医入院护理评估表要求护理人员（）小时内完成。 [单选题] \*

A、 4

B、 8√

C、 12

D、 24

24、临时医嘱的有效时长（） [单选题] \*

A、 4

B、 8

C、 12

D、 24√

25、头、躯干有病变者，"电子腕带"佩戴（）侧 [单选题] \*

A、健侧

B、患侧 √

C、左手

D、右手

26、抢救结束后（），护士长组织科室护理人员对抢救患者进行病例讨论，总结经验与不足，不断提升急救护理能力。 [单选题] \*

A、 6 小时

B、 12 小时

C、 24 小时

D、7 天 ✓

27、血糖的危急低值（）mmo1/1 [单选题] \*

A、 2.2v

B、 3.5

C、 5.6

D、 6.1

28、非急症患者急诊响应时间应为（） [单选题] \*

A、 120minv

B、 60min

C.30min

D、 100min

29、下胃管长度一般（） [单选题] \*

A、 约 40~50cm

B、 45-50cm

C、 45-55cmv

D、 14-16cm

## 二、多选题

30、论文评价体系中，主要分类为（） [多选题] \*

A、 论文

B、 论著 ✓

C、 经验交流 ✓

D、 个案报告 ✓

E、综述 ✓

31、仓 I1 伤的初次评估 ABCDE, 包括 ( ) [多选题] \*

A、A: 气道通畅与颈椎保护 ✓

B、B: 呼吸: 通气与氧合 ✓

C、C: 循环: 控制出血 ✓

D、D: 残疾和神经功能评估 ✓

E、E: 暴露与环境控制 ✓

32、急性右心衰竭 (ARHF) 临床表现包括 ( ) [多选题] \*

A、低新排量 ✓

B、组织器官低灌注,

C、突发明显的对氧依赖 ✓

D、肺循环淤血

E、体循环淤血 ✓

33、不良事件按照严重程度包括下列 ( ) 等级。 [多选题] \*

A、I 级: 警训事件 ✓

B、II 级: 不良后果事件 ✓

C、III 级: 未造成后果事件 ✓

D、IV 级: 隐患事件 ✓

E、V 级: 无问题事件

34、徒手肌力评估包括以下 ( ) 级。 [多选题] \*

A、O 级: 完全瘫痪, 不能做任何自由活动 ✓

B、I 级: 可见肌肉轻微收缩 ✓

C、II 级: 肌体能在床上平行运动 ✓

D、Ⅲ级：肢体可以克服对抗地<sup>↑</sup>引力，能抬离床面 ✓

E、Ⅳ级：肢体能做对抗外界阻力的运动，

F、Ⅴ级：肌力正常，运动自如 ✓

35、对于常见引流管的护理下列描述正确的是（） [多选题] \*

A、T型管留置达4周左右引流出的正常胆汁色泽金黄色或棕色稠厚色清，无渣每日约600-1000ml

B、胸腔闭式引流，观察水柱波动情况及幅度，一般3-5cm ✓

C、胸腔闭式引流，8小时内引流液少于50毫升，肺完全复张，考虑拔管。 ✓

D、脑室引流管的开口需高于侧脑室额角（眼睛外角）10-15厘米 ✓

E、硬脑膜下引流，术后引流瓶低于头部10-15厘米，病人卧向患侧，便于引流。 ✓

36、关于破伤风的描述正确的是（） [多选题] \*

A、破伤风的潜伏期为3-21天，可能为1天到数月余 ✓

B、破伤风临床类型分为全身型破伤风、局部型破伤风和头部型破伤风 ✓

C、创伤后早期彻底清创是关键措施之一 ✓

D、污染伤口清创、消毒、清除坏死组织后建议常规使用抗生素预防破伤风梭菌感染。

E、破伤风临床表现为张口受限、苦笑面容、肌张力增高 ✓

37、关于电除颤下列叙述正确的是（） [多选题] \*

A、除颤按电极放电的时间分为同步方式和非同步方式。 ✓

B、放电时两电极板之间间隔至少10厘米 ✓

C、选择能量：单向波200J~360J，双向波120J~200J ✓

D、电极放置于心底部（右锁骨中线第2肋间），心尖部（左腋中线第5肋间） ✓

E、评估患者安装了起搏器，禁止使用电除颤

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/557051165026006041>