中医科院感培训试题

1.经临床长期应用证明安全、有效，价格相对较低的抗菌药物在抗菌药物分级管理中属于（）

A．非限制使用抗菌药物(正确答案)

B．限制使用抗菌药物

C．特殊使用抗菌药物

D．以上都不是

2.三级医院抗菌药物品种原则上不能超过多少种（）

A . 35 种

B . 50 种(正确答案)

C . 40 种

D . 30 种

3.发生医院感染的患者，医院感染诊断相关病原学送检率不低于（）

A . 30%

B . 50%

C . 80%

D . 90%(正确答案)

4. 血培养适应症及采集套数不包括（）

A．急性脓毒症，抗微生物药物使用之前，10min 内从不同部位采集 2-3 套血培养。

B.上呼吸道感染、轻度社区获得性肺炎、非复杂性蜂窝组织炎、单纯性膀胱炎，采集一套血培养送检(正确答案)

C．不明原因发热，从不同部位采集 2-4 套。

D．导管相关的血流感染，未拔出导管的情况下，同时从留置管和外周静脉采集血液，各采集一套送检;血液培养;拔出导管的情况下，剪下 5cm 导管尖端送检培养，

同时送检一套外周血液培养。

5．哪些标本是合适的?（）

A 抗菌药物使用前从不同静脉穿刺点采集 2-4 套血标本(正确答案)

B．导尿管收集袋中的尿液

C．被表面物污染的标本

D．唾液、口咽分泌物

6.标本的转运，哪一项不正确

A.血液标本室温下 2h 内送检

B.脑脊液标本室温下 2h 内送检(正确答案)

C.痰液标本室温下 2h 内送检

D.尿液标本室温下 2h 内送检

7．以下哪种不是多重耐药菌（）

A．耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 MRSA

B．耐万古霉素肠球菌 VRE

C．肺炎链球菌(正确答案)

D．耐碳青霉烯类肠杆菌属 CRE

E．耐碳青霉烯类鲍曼不动杆菌 CRAB

8.为提高血培养阳性率，最好的抽血时间（）

A．发热开始时

B．寒战开始时

C．发热最高峰时

D．预计寒战发热前(正确答案)

9.接受抗菌药物治疗的住院患者，抗菌药物使用前病原学送检率不低于（）

A .20%

B .30%

C .50%(正确答案)

D .80%

10.接受两个或以上重点药物联用的住院患者，联合使用前病原学送检率应达到（）

A .50%

B .80%

C .90%

D .100%(正确答案)

11.标本的采集应尽量在 （）

A． 抗菌药物使用前(正确答案)

B． 抗菌药物使用中

C． 抗菌药物使用后

D． 以上情况都可以

12.以下哪种细菌不是皮肤软组织感染常见的细菌病原体（）

A． 金黄色葡萄球菌

B． 化脓性链球菌

C． 表皮葡萄球菌

D． 消化链球菌属(正确答案)

13．为改善临床实践，降低医疗费用，遏制细菌耐药发展，应遵循"恰当患者、恰当时间、恰当检测、恰当报告、恰当解读"的医学检验"5R 原则"，下列说法恰当的是（）

A．一患者术后 1h 内出现发热，建议立即进行血培养

B．对长期留置尿管患者进行尿标本采集时，可将导管从尿袋上拆下直接进行采集

C．送检外科手术标本时，应积极使用拭子采集

D．对感染部位进行采集时，适当涂抹感染部位附近的皮肤或粘膜可以使结果更加准确

E．抗微生物药物治疗前、起始治疗后、疾病初发时均为病原学送检时机(正确答案)

14. 对高压蒸汽灭菌效果的监测，最可靠的方法是 （）

A.生物监测法(正确答案)

B.物理监测法

C.化学指示胶带监测

D.程序(工艺)监测法

E.化学指示卡监测法

15. 某供应室护士，使用下排气式压力蒸汽灭菌器进行物品灭菌,10:15 灭菌器内压力达到灭菌所需压力值，其后一直维持在 103~137kPa 之间，结束灭菌时间正确的是（）

A.10: 20

B.10:25

C.10:45(正确答案)

D.10: 55

E.11::15

16. 某护士采用紫外线灯对病室进行空气消毒,其操作方法不正确的是（）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/557134166124006102