

2024 江西省丰城市《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题王牌题库（综合卷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 容易水解的药物是

- A: 牛痘菌苗
- B: 阿扑吗啡
- C: 青霉素类
- D: 胃蛋白酶

答案：C

2. 剧烈频繁干咳宜选用的药物是

- A: 阿司匹林
- B: 多奈哌齐
- C: 吗啡
- D: 可待因

答案：D

3. 巴比妥类使口服避孕药效果降低属于()。

- A: 作用于同一受体的拮抗作用
- B: 酶诱导作用
- C: 排泄
- D: 与血浆蛋白结合

答案：B

4. 对由营养不良、婴儿期所致的恶性贫血者应选用

- A: 甲磺酸去铁胺
- B: 富马酸亚铁
- C: 维生素 K
- D: 叶酸+维生素 B

答案：D

5. 肥胖、某些疾病、中毒都可成为非酒精性脂肪肝的诱因。脂肪肝合并其他疾病时应采取相应的治疗措施

- A: 别嘌醇
- B: 奥利司他
- C: 替米沙坦
- D: 二甲双胍

答案：C

6. 苯妥英、地塞米松、地西泮在妊娠 26~29 周时游离药物浓度达高峰，是由于

- A: 妊娠晚期血流动力学发生改变较多
- B: 妊娠期药物分布容积明显增加
- C: 胃肠活动程度减弱，使吸收减慢
- D: 血容量增加使血浆清蛋白浓度降低

答案：D

7. 用于有机氟杀虫农药中毒的解毒剂是

- A: 维生素 K1
- B: 青霉胺
- C: 硫酸阿托品
- D: 乙酰胺

答案：D

8. 胆酸螯合剂

A: 考来烯胺

B: 辛伐他汀

C: 吉非贝齐

D: 阿昔莫司

答案：A

9. 肾脏的功能主要是分泌和排泄尿液、废物、毒物和药物，调节和维持体内环境的平衡。变态反应、感染、肾血管病变、代谢异常、先天性疾病、全身循环和代谢性疾病、药物、毒素对肾脏的损害均可影响肾功能。

A: $45\sim 84\ \mu\text{mol/L}$

B: $53\sim 97\ \mu\text{mol/L}$

C: $27\sim 62\ \mu\text{mol/L}$

D: $18\sim 35\ \mu\text{mol/L}$

答案：D

10. (2019 年真题) 儿童退热的用药选择和单次用量，正确的是

A: 对乙酰氨基酚 $10\sim 15\text{mg/kg}$

B: 阿司匹林 $30\sim 60\text{mg/kg}$

C: 对乙酰氨基酚 $25\sim 50\text{mg/kg}$

D: 布洛芬 $0.4\sim 0.6\text{g}$ (12 岁以上儿童)

答案：A

11. 患者，男，65 岁，患有骨质疏松症，根据患者饮食习惯，每日需补充元素钙 600mg，药师为其推荐碳酸钙(0.5g/片)，该患者适宜的用法用量是()

- A: 1 片 tid
- B: 2 片 tid
- C: 4 片 qd
- D: 6 片 qd

答案：A

12. 不宜与麻杏止咳片、通宣理肺丸、消咳宁片合用的药品是

- A: 地高辛
- B: 氨茶碱
- C: 可待因
- D: 氯苯那敏

答案：A

13. 对沙眼衣原体有强大的抑制作用的药物是

- A: 米诺环素?
- B: 硫酸锌滴眼液?
- C: 酞丁安滴眼液?
- D: 泼尼松龙?

答案：C

14. 增加出血危险的配伍用药是

- A: 山莨菪碱联用盐酸哌替啶
- B: 肝素钠联用阿司匹林
- C: 氨基糖苷类抗生素联用依他尼酸
- D: 普萘洛尔联用硝酸酯类

答案：B

15. 适用于有完整子宫，仍希望有月经样出血的妇女

- A: 单纯雌激素补充治疗
- B: 雌孕激素序贯用药
- C: 单纯孕激素补充治疗
- D: 雌孕激素连续联合用药

答案：B

16. 排便在一日内超过 3 次，或粪便中脂肪成分增多，或带有未消化的食物、黏液、脓血者称为腹泻。腹泻是由多种不同病因所致，在应用止泻药治疗的同时，实施对因治疗不可忽视。

- A: 谷维素
- B: 黄连素
- C: 天麻素
- D: 磷霉素

答案：B

17. 对主要临床表现和体征进行明确、具体的描述；如过敏性皮疹的类型、性质、部位、面积大小等

- A: 不良反应 / 事件的结果
- B: ADR/ADE 过程描述
- C: 用药起止时间
- D: 用药原因

答案：B

18. 具有心脏毒性，治疗期间每 3 个月进行一次心脏评估，且在治疗后每 6 个月重复一次，直至停止治疗后 24 个月的靶向药是

- A: 帕博利珠单抗
- B: 利妥昔单抗
- C: 曲妥珠单抗
- D: 贝伐珠单抗

答案：C

19. 1 型糖尿病患者首选的药物是

- A: 胰岛素
- B: 格列喹酮
- C: 格列苯脲
- D: 二甲双胍

答案：A

20. 以下对 ADR 监测的目的和意义的叙述中，不正确的是

- A: 简化或缩短新药临床试验
- B: 促进临床合理用药
- C: 减少 ADR 的危害
- D: 促进新药的研制开发

答案：A

21. 患者，男，71 岁。患良性前列腺增生症。下列药物中不能用于治疗该病的是

- A: 选择性 α_1 受体阻断剂
- B: 雄激素
- C: 抗胆碱药物
- D: 5α 还原酶抑制剂

答案：B

22. 主要用于降低三酰甘油的药物是

- A: 他汀类
- B: 贝丁酸类
- C: 考来烯胺
- D: 普罗布考

答案：B

23. 属于抗过敏非处方药的是

- A: 异丙嗪
- B: 依巴斯汀
- C: 氯雷他定
- D: 息斯敏

答案：A

24. 高血压病的治疗原则低危患者（）

- A: 立即进行抢救治疗
- B: 立即使用抗高血压药物
- C: 先观察（血压及危险因素）数周，然后决定是否进行药物治疗
- D: 观察相当一段时间，再决定是否进行药物治疗

答案：D

25. 阿卡波糖片的适宜服药时间是

- A: 餐中
- B: 清晨
- C: 餐后
- D: 餐前

答案：A

26. 具有肝毒性和性功能障碍不良反应，与其他药物同服时容易影响后者的血药浓度，不应成为该类药物首选的是

- A: 硫糖铝
- B: 西咪替丁
- C: 埃索美拉唑
- D: 莫沙必利

答案：B

27. “滴、量滴、滴剂”的外文缩写为()。

- A: gtt
- B: Add
- C: Ad
- D: qod

答案：A

28. (2017 年真题) 半衰期 12h 的药物通常选择 ()

- A: 静脉滴注给药
- B: 2~3 个半衰期给药 1 次
- C: 每个半衰期给药 1 次
- D: 每日给药 1 次

答案：C

29. 氯霉素可引起

- A: 癫痫发作
- B: 锥体外系反应
- C: 听神经障碍
- D: 再生障碍性贫血

答案：D

30. 再感染

- A: 治疗后症状消失，尿菌阴性，但在停药 6 周后再次出现真性细菌尿，菌株与上次不同
- B: 患者无尿路感染症状，但中段尿培养连续两次，尿细菌数 $>10^5$ cfu/ml
- C: 治疗后症状消失，尿菌阴转后在 6 周内再出现菌尿，菌种与上次相同
- D: 宜选用毒性小的抗菌药物

答案：A

31. 服用地西泮等苯二氮

- A: 烟
- B: 浓茶
- C: 酒
- D: 咖啡

答案：A

32. 急性支气管炎呈自限性，对于急性单纯性支气管炎不建议常规使用抗菌药物，除非是出现了肺炎。治疗通常是对症和支持疗法。

- A: 伪麻黄碱
- B: 愈创木酚甘油醚
- C: 右美沙芬
- D: 苯海拉明

答案：A

33. 长期应用氨基糖苷类抗生素，应定期检查器官功能，以防出现

- A: 味觉障碍

B: 视力障碍

C: 智力障碍

D: 听力障碍

答案：D

34. 呋塞米

A: 宜餐后服用

B: 宜清晨服用

C: 宜睡前服用

D: 宜餐前服用

答案：B

35. 消化性溃疡的注意事项中，服用最高剂量二甲双胍的糖尿病患者，长期服用 PPI，需补充

A: 维生素 B12?

B: 维生素 D3?

C: 维生素 E?

D: 维生素 C?

答案：A

36. 某男性，27 岁，间断上腹痛 3 年，表现为餐后痛，约 1~2h 后缓解，以冬春季多发。

A: 氯化钾片

B: 兰索拉唑

C: 法莫替丁

D: 氢氧化铝

答案：A

37. 异丙嗪属于

- A: 抗组胺药
- B: 镇痛药
- C: 血管扩张药
- D: 利尿剂

答案：A

38. 下列药品中，与血浆蛋白结合率高、分布容积随年龄增长而降低、容易造成老年人血药浓度升高而致中毒的是

- A: 碳酸钙
- B: 地西泮
- C: 巴比妥
- D: 维生素 C

答案：B

39. 药物治疗结核病的标准方案中，间歇疗法的含义是

- A: 一周用药 1 次
- B: 一日用药 1 次
- C: 一日用药 1~2 次
- D: 一周用药 2~3 次

答案：D

40. 单纯饮食控制及体育锻炼治疗无效的 2 型糖尿病患者宜选用

- A: 二甲双胍
- B: 大剂量碘剂
- C: 胰岛素
- D: 格列本脲

答案：A

41. 药师应及时向患者交待有关用药的注意事项，以避免误用药物，减轻患者不必要的恐慌，提高用药依从性。根据患者用药情况，发药时药师应有针对性的提示患者各类药物的应用注意事项。

- A: 患者二?
- B: 患者三?
- C: 患者一?
- D: 患者四?

答案: A

42. (用药与尿液检查异常)阿司匹林可能引起

- A: 尿肌酐
- B: 尿血红蛋白
- C: 尿酮体
- D: 尿沉渣结晶

答案: B

43. 中度贫血，Hb 为 ()

- A: 小于 60g/L
- B: 60~90g/L
- C: 90~120g/L
- D: 60~120g/L

答案: B

44. 避免用于儿童退热，可能引起 Reye's 综合征的药物是

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 塞来昔布
- C: 布洛芬

D: 阿司匹林

答案: D

45. 患者，女性，32 岁，咳嗽、有脓性痰，痰液色黄或黄白相间，右侧胸痛，吸气时明显。体检：体型胖，神志清，急性病容，无口唇发绀，呼吸急促，体温 39.3℃，心率 100 次/分，肺部可闻及湿性啰音，WBC $14\times 10^9/L$ ，对青霉素类药物过敏。临床诊断为社区获得性肺炎。

A: 3 天

B: 5 天

C: 7 天

D: 10 天

答案: B

46. (2018 年真题) 患者，男，57 岁，化验结果：TC 4.6mmol/L (参考值 $<5.2\text{mmol/L}$)，TG 1.0mmol/L (参考值 0.56—— 1.70mmol/L) 尿酸 508umol/L (参考值 $<420\text{umol/L}$)，应首选的调脂药物为 ()

A: 烟酸

B: 考来烯胺

C: 非诺贝特

D: 依折麦布

答案: C

47. 作为多重用药的管理策略，“用药列表”的作用最可能见效的是

A: 可判断治疗疾病的主要药物、辅助治疗药物，甚至是不必要的药物

B: 有助于指出不适合患者服用的、相互作用存在潜在危险性的药物

C: 减少联合用药的药物种类

D: 有助于指出需特别监测、必要时应停服的药物

答案: C

48. 稳定型心绞痛发作时应选用的治疗药物是（）

- A: 氟伐他汀
- B: 硝酸甘油
- C: 美托洛尔
- D: 阿司匹林

答案：B

49. 妊娠期尿路感染

- A: 治疗后症状消失，尿菌阴性，但在停药 6 周后再次出现真性细菌尿，菌株与上次不同
- B: 宜选用毒性小的抗菌药物
- C: 患者无尿路感染症状，但中段尿培养连续两次，尿细菌数 $>10^5$ cfu/ml
- D: 治疗后症状消失，尿菌阴转后在 6 周内再出现菌尿，菌种与上次相同

答案：B

50. 以下毒物一旦误服中毒，须用硫酸铜洗胃、导泻的是

- A: 可待因中毒
- B: 地西泮中毒
- C: 杀鼠药磷化锌
- D: 香豆素类杀鼠药

答案：C

51. 能使人长时间忍受肌肉疼痛的是

- A: 麻醉药品
- B: 利尿剂

C: 肽类激素

D: 蛋白同化激素

答案：A

52. (2015 年真题) 过量服用维生素 D 所发生中毒的典型临床表现是 ()。

A: 横纹肌溶解或肌痛

B: 骨骼发育不良或骨软化

C: 骨质疏松症或骨折

D: 间质性肾炎或肾结石

答案：D

53. 5%葡萄糖注射液 500ml 含有葡萄糖的克数是 ()

A: 33.3

B: 25

C: 10

D: 30

答案：B

54. 属于新型抗凝药物的是

A: 美托洛尔

B: 胺碘酮

C: 达比加群酯

D: 氯吡格雷

答案：C

55. 下列关于抗抑郁药的合理应用与药学监护的说法，错误的是

A: 应尽可能单一用药，足量、足疗程治疗

B: 抗抑郁药起效较快，使用 1 周后可判定疗效

C: 当单药治疗无效时，可考虑联合使用两种作用机制不同的抗抑郁药

D: 剂量逐步递增，尽可能采用最小有效剂量，使不良反应减至最小

答案：B

56. 患者，女，21 岁，未婚，患有甲状腺功能亢进症，应用丙硫氧嘧啶 150mg tid 治疗 4 个月后，出现体重增加，乏力，怕冷，突眼加重，治疗方案应该调整为()

A: 丙硫氧嘧啶减量并加甲状腺素片

B: 换用另一种抗甲状腺药物

C: 放射性 I

D: 加大丙硫氧嘧啶用量

答案：A

57. 归属"患者基本情况"的是

A: 临床诊断

B: 医保和费用支付情况

C: 主要实验室检查数据

D: 联合用药

答案：B

58. 患者，女，45 岁，常有上腹部饱胀、恶心、食欲不振等消化不良症状。宜选用的药物是

A: 干酵母片

B: 复方阿嗝米特肠溶片

C: 奥美拉唑肠溶胶囊

D: 蒙脱石散

答案：A

59. 更年期综合征最具特征性的症状是

- A: 潮热、出汗
- B: 心悸、胸闷不适
- C: 阴道萎缩
- D: 月经周期延长，经量减少，最后绝经

答案：A

60. 是否增加房颤患者死亡率尚无定论，可谨慎地用于房颤的心室率控制的是()

- A: 地尔硫
- B: 普罗帕酮
- C: 美托洛尔
- D: 地高辛

答案：D

61. 毒物种类很多，中毒方式各异，虽然有的毒物中毒尚无特效的解毒药，但救治原则基本相同。

- A: 卡马西平
- B: 苯巴比妥
- C: 阿米替林
- D: 硝西泮

答案：D

62. 下列治疗老年痴呆药物可通过酸化尿液而显著增加其排泄的是

- A: 美金刚
- B: 加兰他敏
- C: 多奈哌齐

D: 碳酸氢钠

答案：A

63. 服用 α 受体阻断剂后，如果服用西地那非，建议服药间隔时间应为

A: 48 小时

B: 1 周

C: 24 小时

D: 4 小时

答案：D

64. 禁用阿朴吗啡催吐的毒物是()。

A: 阿片类药物

B: 麻黄碱

C: 磷化锌

D: 麦角胺

答案：A

65. “主要对成本进行量化分析，也同时考虑效果，用于两种或多种药物治疗方案的选择”是指

A: 成本一效用分析方法

B: 最小成本分析方法

C: 最大效果分析方法

D: 成本一效益分析方法

答案：B

66. 频繁应用可引起局部组织萎缩的药物是()

A: 地塞米松粘贴片

B: 氯己定含漱液

C: 替硝唑含漱液

D: 西地碘含片

答案: A

67. 氯喹与伯氨喹合用

A: 引起心脏房室传导阻滞

B: 诱发癫痫

C: 根治间日疟

D: 加重神经肌肉接头抑制作用

答案: C

68. 患者，女，68 岁，既往有高血压，双侧肾动脉狭窄，因水肿复诊，体检和实验室检查：血压 172 / 96mmHg，尿蛋白>29 / 24h(正常值 <150mg / 24h)，血尿酸 416 $\mu\text{mol} / \text{L}$ (正常值 180~440 mmol / L)，血钾 6.1 mmol / L (正常值 3.5~5.5 mmol / L)。在已经服用氨氯地平的基础上，应考虑联合应用的抗血压药品是

A: 卡托普利

B: 螺内酯

C: 依那普利

D: 呋塞米

答案: D

69. 患者，女，27 岁，感染乙型肝炎病毒。实验室检测 HBeAg 阳性，HBVDNA30000IU / ml，ALT200U / L，血清总胆红素 50U / L。决定使用抗病毒药物治疗。有关抗乙肝病毒药物的用药注意事项，正确的是

A: 无禁忌证前提下，干扰素 α 是治疗乙肝的首选抗病毒药

B: 聚乙二醇干扰素 α 每周给药 3 次或隔日给药 1 次

C: 替比夫定、阿德福韦和拉米夫定被推荐为临床治疗乙型肝炎的一线药物

D: 普通干扰素 α 睡前皮下注射给药

答案: D

70. 化疗前血常规检查患者白细胞计数 $<2.0 \times 10^9 / L$ 或粒细胞计数 $<1.0 \times 10^9 / L$ ，可给予

A: 人粒细胞巨噬细胞刺激因子(GM—CSF)

B: 甲氧氯普胺

C: 昂丹司琼

D: 白介素-11(IL-11)

答案: A

71. 需要用 10%酒精或植物油冲洗是清除 ()

A: 眼内进入固体腐蚀性颗粒

B: 毛发被毒物污染

C: 皮肤污染酚类毒物

D: 眼内污染毒物

答案: C

72. 抗结核治疗中，主要针对细胞内有抗菌杀菌作用的是

A: 异烟肼

B: 吡嗪酰胺

C: 乙胺丁醇

D: 利福平

答案: B

73. “以快速、准确地获得问询问题答案”的咨询服务方法步骤是

- A: 确立有效的检索方法、查阅文献
- B: 对文献进行评价、分析和整理
- C: 形成答案并以口头形式提供给询问者
- D: 对问题进行确定并归类

答案：B

74. (2018 年真题) 患者, 女, 30 岁, 既往体健, 无癫痫病史怀孕 8 个月, 突然出现抽搐, 从小腹开始, 发展至全身, 口唇发绀, 意识丧失, 诊断为子痫, 应选用的治疗方法是 ()

- A: 50%葡萄糖注射液湿敷
- B: 25%硫酸镁注射液稀释后静脉注射
- C: 50%硫酸镁溶液口服
- D: 5%氯化钙注射液静脉滴注

答案：B

75. 肌肉注射给药的外文缩写是

- A: i. h
- B: iv
- C: im
- D: ivgtt

答案：C

76. 容易引湿的药物是

- A: 青霉素类、头孢菌素类
- B: 胃蛋白酶
- C: 阿朴吗啡、水杨酸钠
- D: 牛痘菌苗

答案：B

77. 对衣物或毛发具有氧化漂白作用，应尽量避免接触的痤疮治疗药是

- A: 口服短效避孕药
- B: 米诺环素
- C: 过氧化苯甲酰
- D: 维 A 酸

答案：C

78. 不需要睡前服用的他汀类药物为

- A: 普伐他汀
- B: 辛伐他汀
- C: 阿托伐他汀
- D: 洛伐他汀

答案：C

79. (2019 年真题) 合并闭角型青光眼的前列腺增生患者，不宜选用的药物是

- A: 多沙唑嗪
- B: 非那雄胺
- C: 坦索罗辛
- D: 托特罗定

答案：D

80. 患者，女，69 岁，体型偏胖，BMI30.1 主诉夜间咳嗽、咽部有异物感，平躺时常有反酸、烧心胸痛伴背痛，自用止咳糖浆无效。查体：咽红听诊双肺未闻及干湿性啰音，偶有哮鸣音。既往史：高血压病史 12 年，服用氨氯地平片 5mgqd 血压控制在 140/85mmHg 左右，高脂血症 10 年，服用阿托伐他汀钙片 20mgqd

- A: 胃食管反流病
- B: 胃溃疡
- C: 心绞痛
- D: 支气管哮喘

答案：A

81. 患者，男，72 岁。体重 75kg，1 小时前出现右上肢体活动不利，半小时后自行缓解。查体：血压 210/90mmHg；检查结果示：糖化血红蛋白 9.3%，血肌酐 143.2 $\mu\text{mol/L}$ 。既往有高血压、糖尿病、心病病史。诊断为短暂性脑缺血发作。

- A: 阿替普酶
- B: 阿司匹林
- C: 阿司匹林联合氯吡格雷
- D: 氯吡格雷

答案：C

82. 多见于青年女性，好发于躯干及上肢，偶见延及面部

- A: 幼小荨麻疹
- B: 热性荨麻疹
- C: 冷性荨麻疹
- D: 人工荨麻疹

答案：B

83. 开具新药或增加药物前需考虑患者总体情况和药物相互作用，是指

- A: 医嘱完整不漏项
- B: 医嘱清楚准确
- C: 实现个体化治疗
- D: 修订医嘱及时沟通

答案：C

84. 对反复发作的短暂性脑缺血发作患者首选（）

- A: 辛伐他汀
- B: 华法林
- C: 巴曲酶
- D: 阿司匹林

答案：D

85. 稳定型心绞痛发作时的治疗选用

- A: 氯贝丁酯
- B: 低分子肝素
- C: 阿司匹林
- D: 硝酸甘油

答案：D

86. 下列药学服务的对象中，不属于药学服务的特殊人群是

- A: 住院患者
- B: 特殊体质者
- C: 小儿、老人
- D: 血液透析者

答案：A

87. 急性传染病的恢复期可呈现

- A: 淋巴细胞增多
- B: 嗜酸性粒细胞增多
- C: 中性粒细胞增多

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 单核细胞增多

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/557162151046010024>