

## 临床护士应知应会及三基理论练习题与答案

1、患者男性, 60 岁, 有胃溃疡病史, 近日来腹痛加剧, 医嘱做粪便隐血试验, 隐血试验前 3 天可食用的菜谱是

- A、卷心菜, 五香牛肉
- B、菠菜, 红烧青鱼
- C、茭白, 豆腐
- D、油豆腐, 鸡血汤
- E、青菜, 炒猪肝

答案: C

2、气管切开术后应抬高床头( )

- A、 $30^{\circ} - 45^{\circ}$
- B、 $25^{\circ} - 30^{\circ}$
- C、 $20^{\circ} - 45^{\circ}$
- D、 $45^{\circ} - 55$

答案: A

3、病变主要在肾脏, 临床表现主要在膀胱, 见于下列哪疾病:

- A、肾肿瘤
- B、肾结石
- C、多囊肾
- D、肾结核
- E、急性肾盂肾炎

答案: D

4、呼吸道和消化道的共同通道是

- A、鼻
- B、咽
- C、喉
- D、气管
- E、肺泡

答案: B

5、患者女, 25 岁, 似定早孕诊断实验, 留取尿标本最适宜的时间是

- A、即刻
- B、下午
- C、临睡前
- D、晨起 E 中午

答案: D

6、 男性, 56 岁, 突然心悸, 气促, 咯粉红色泡沫痰, 血压 195/90mmHg, 心率 135 次/分。护士应首先备好下列哪组药物( )

- A、 西地兰, 硝酸甘油, 异丙肾上腺素
- B、 硝普钠、 西地兰, 速尿
- C、 毒 K, 硝普钠, 心得安
- D、 胍乙啶, 酚妥拉明, 西地兰
- E、 硝酸甘油, 西地兰, 多巴胺

答案: B

7、 林某, 男, 70 岁。今天突发糖尿病眼症酸中毒昏迷, 经补碱及静脉滴注小剂量胰岛素和大量补液后神志转清, 后又进入昏迷。此时应首选的处理措施为( )

- A、 静脉补钾
- B、 静脉补钙
- C、 吸氧
- D、 停止补液
- E、 停止补碱并静脉滴注甘露醇

答案: E

8、 患者进入手术室后在麻醉实施前必须由具有执业资质的( )共同核查。

- A、 手术医师和麻醉医师
- B、 麻醉医师和手术护士
- C、 手术医师和手术室护士
- D、 麻醉医师和巡回护士
- E、 手术医师、 麻醉医师和手术室护士

答案: D

9、 患者, 女性, 50 岁。寒战、 发热伴下腹坠胀 2 天。有便意不尽、 排尿困难。直肠指检于直肠前壁触及压痛肿块, 有波动感。患者最可能的诊断为

- A、 高位肌间脓肿
- B、 骨盆直肠间隙脓肿
- C、 坐骨肛管间隙脓肿
- D、 直肠壁内脓肿
- E、 直肠后间隙脓肿

答案: B

10、 检查肾小管浓缩功能时, 实验期 1 天控制全天饮食中水分总量应为( )

- A、 100-200ml
- B、 300-400ml
- C、 500-600ml

D、1000-2000ml

E、2000-3000ml

答案：C

11、某病人输液时,述胸部不适,随即出现呼吸难,严重发绀,胸前区听诊可闻及响亮的持“水泡声”,该病人可能发生了()

A、发热反应

B、空气栓塞

C、,右心衰竭

D、,过敏反应

E、急性肺水肿

答案：B

12、女性,28岁,A因车祸致大腿严重挤压伤就诊,尿蛋白++++,其蛋白尿的类型可能为

A、肾小球性

B、肾小管性蛋白尿

C、溢出性蛋白尿

D、分泌性蛋白尿

E、组织性蛋白尿

答案：C

13、患者、女性、28岁,腰痛,阵发性下腹部疼痛,尿频,尿急,尿痛,伴畏冷,发热1天就诊,查尿蛋白(+),白细胞10/HP,红细胞12/HP.诊断最可能的是()

A、急性膀胱炎

B、尿道综合征

C、泌尿系结石

D、急性肾盂肾炎

E、急性肾炎

答案：D

14、王先生,36岁,右股股沟肿块1个月余,肿块于咳嗽、用力时出现,平卧休息后可消失,体格检查:肿块突入阴囊,回纳后压住深环肿块不突出,则其目前最可能的病情是()

A、易复性腹股沟直疝

B、易复性腹股沟斜疝

C、难复性腹股沟直疝

D、难复性腹股沟斜疝

E、绞窄性腹股沟直疝

答案：B

15、右心功能不全的呼吸困难是由于：

- A、气道反应性增强
- B、支气管狭窄及阻塞
- C、肺循环淤血
- D、气道炎症
- E、体循环淤血

答案：E

16、治疗低血容量性休克的关键是：

- A、原发病的处理
- B、一般紧急治疗
- C、纠正酸碱平衡
- D、原发病的处理和及时补充血容量,恢复有效灌注
- E、应用血管活性药物

答案：D

17、在鼻饲插管过程中病人出现呛咳、发绀,应采取的措施是

- A、嘱病人深呼吸
- B、嘱病人做吞咽动作
- C、托起病人的头部插管
- D、用注射器抽吸胃液
- E、拔出胃管休息片刻后再插管

答案：E

18、下列属于先天性心血管病的是（ ）

- A、原发性高血压
- B、法洛氏三联症
- C、风湿性心脏病
- D、冠心病
- E、心血管神经症

答案：B

19、系统性红斑狼疮的皮肤损害的部位最常见于（ ）

- A、腹部
- B、暴露部位
- C、颈部
- D、前胸上部
- E、下肢

答案：B

20、谢某,男,23岁。因甲状腺功能亢进症收入院。治疗过程中突然出现烦躁不安、大汗淋漓、恶心、呕吐,继而昏迷。体温41℃,心率160次/分。首先考虑该病人可能出现了( )

- A、甲状腺功能亢进性心脏病
- B、糖尿病酮症酸中毒
- C、甲亢伴低血糖
- D、甲状腺危象
- E、甲亢继发感染

答案：D

21、空气栓塞患者采取的体位时( )

- A、半坐卧位
- B、头高足低左侧卧位
- C、头高足低右侧卧位
- D、头低足高右侧卧位
- E、头低足高左侧卧位

答案：E

22、患者女,40岁。侵蚀性葡萄胎。给予5-氟尿嘧啶和放线菌素D联合化疗8天。该患者可能出现的最严重不良反应是

- A、恶心、呕吐
- B、脱发
- C、骨髓抑制
- D、出血性膀胱炎
- E、口腔溃疡

答案：C

23、为昏迷患者进行口腔护理,防止误吸的措施是( )

- A、使用开口器协助患者张口
- B、由外向内擦洗牙齿各面
- C、协助患者漱口
- D、血管钳夹紧棉球,挤出多余液体
- E、检查口腔粘膜

答案：D

24、提示T管引流病人胆道远端通畅的表现是( )。

- A、腹痛和黄疸减轻,引流量增多
- B、体温正常,引流量增多

- C、上腹胀痛,引流量减少
- D、食欲好转,黄疸消退,引流量减少
- E、黄疸消退,引流量增多,食欲无变化

答案: D

25、出现黑便,出血量至少应是:

- A、5ml 以上
- B、20ml 以上
- C、30ml 以上
- D、60ml 以上
- E、100ml 以上

答案: D

26、患者转科时应重点交接以下内容,除了:

- A、病情及护理重点
- B、检查引流管
- C、患者的贵重药品及物品
- D、患者的经济情况
- E、全身皮肤情况

答案: D

27、患者男性,70岁。患冠心病20年,近1年活动后易发生心悸、气短,医生诊断为心功能II级,护士指导该患者活动与休息的原则应为

- A、可不限活动,增加午休时间
- B、可起床轻微活动,需增加活动间歇时间
- C、以卧床休息、限制活动量为宜
- D、以卧床休息为主,间断起床活动
- E、需严格卧床休息

答案: B

28、患者女性,32岁,头痛一年半,近两个月头痛加重,伴有喷射样呕吐。烦躁后出现意识障碍,右侧瞳孔缩小,后又散大,光反应迟钝,左侧肢体运动障碍。

呼吸加快,CT示左顶叶肿瘤。首先采取的急救措施应是

- A、立即开颅切除肿瘤
- B、20%甘露醇静脉注射
- C、脑脊液体外引流
- D、去骨瓣减压
- E、气管插管,保持呼吸道通畅

答案: B

29、护士自执业证书被吊销之日起( )年内不得申请执业注册。

- A、 1
- B、 2
- C、 3
- D、 4
- E、 5

答案： B

30、护理记录的PIO格式中的O是指( )

- A、 护理评估
- B、 护理措施
- C、 护理结果
- D、 护理问题
- E、 护理评价

答案： C

31、王女士, 42岁。阑尾炎术后需输液 2000ml, 其输液速度为 50 滴/分, 可在几小时内输完

- A、 8 小时
- B、 9 小时
- C、 10 小时
- D、 7 小时
- E、 6 小时

答案： C

32、下列不属于新冠病毒肺炎病例密切接触者的是：

- A、 与病例共同居住、学习、工作的人员
- B、 诊疗、护理、探视落实有效防护的人员
- C、 病例同室的其他病友
- D、 与病例共同乘坐同一交通工具并密切接触者
- E、 接触确诊患者时未有效防护的人员

答案： B

33、留痰标本时, 找癌细胞可选用什么固定标本( )

- A、 75%乙醇
- B、 95%乙醇
- C、 40%甲醛
- D、 . 20% 甲醛
- E、 10%甲苯

答案：B

34、患儿,女性,5岁。B超发现右侧甲状腺一直径1.3cm实性结节,无包膜。颈部未探及肿大淋巴结。治疗方案选择

- A、密切随访
- B、<sup>131</sup>I内照射治疗
- C、手术切除
- D、服用甲状腺素片
- E、穿刺活检

答案：C

35、给昏迷病人插胃管时,将下颌贴近胸骨柄,是为了

- A、增大咽喉部通道弧度
- B、顺利通过气管分叉处
- C、顺利通过膈肌
- D、减少食道黏膜损伤
- E、减轻病人不适

答案：A

36、一病人精神紧张、烦躁不安、面色苍白、尿量减少、脉压小。此时治疗上应首先给( )

- A、血管收缩药
- B、血管扩张药
- C、静脉补液
- D、强利尿剂
- E、5%碳酸氢钠溶液

答案：C

37、下列哪项不符合消毒隔离原则( )

- A、体温表用有效碘500mg/L的消毒剂浸泡30分钟或75%乙醇浸泡30分钟
- B、护理做到一床一毛巾、一桌一抹布
- C、不穿污染的工作服进食堂、会议室等
- D、无菌操作时严格遵守无菌技术操作原则
- E、洗手设施符合要求,遵守手卫生管理要求

答案：A

38、急性血源性化脓性骨髓炎最常见的发病部位为( )

- A、脊椎
- B、髌骨
- C、桡骨小头



D、胫骨近端

E、肱骨近端

答案：D

39、陈女士, 28 岁, 发作性呼吸困难 16 年, 多在春秋季节发病, 发病前鼻痒、打喷嚏。最可能的诊断是( )

A、感染性哮喘

B、运动性哮喘

C、外源性哮喘

D、内源性哮喘

E、混合性哮喘

答案：C

40、胰岛素最主要的不良反应是：

A、过敏性休克

B、皮下脂肪萎缩

C、血管神经性水肿

D、皮肤破损硬结

E、低血糖

答案：E

41、 吞咽障碍评定时, 某患者喝 30ml 水, 两次以上喝完, 没有发生呛咳, 该患者饮水试验结果属于几级( )

A、 I

B、 II

C、 III

D、 IV

E、 V

答案：B

42、注某, 男, 65 岁。确诊为冠心病 2 年。护士为其进行健康教育时, 告知其引起发病的危险因素不包括

A、高血压

B、肥胖

C、高纤维素饮食

D、吸烟

E、缺少运动

答案：C

43、李某,男,35岁。确诊为慢性乙型肝炎病毒携带者。对其进行的健康指导不妥的是( )

- A、早期抗病毒治疗
- B、避免饮酒
- C、适当运动
- D、定时复查
- E、食具等应专用

答案: A

44、对口腔粘膜的护理评估包括口腔气味、口唇色泽、口腔粘膜是否完整等,当患者出现心肺功能不全表现( )

- A、烂苹果味
- B、氨臭味
- C、大蒜味
- D、口唇发绀
- E、口唇樱桃红色

答案: D

45、 护士给病人氧气雾化吸入时,操作不当的是( )

- A、先讲解示范
- B、协助病人漱口
- C、将药液稀释至 5-10ml
- D、氧气雾化中的湿化瓶内用水不宜过多
- E、嘱病人用嘴吸气、用鼻呼气

答案: D

46、静脉留置针,皮肤消毒直径多少 cm 并于穿刺点上方多少 cm 扎止血带( )

- A、5cm6cm
- B、6-8cm6cm
- C、5-7cm10cm
- D、6-8cm10cm

答案: D

47、 李某,男,67岁。患慢性阻塞性肺疾病近 20 年,1 周前突发高热.咳嗽伴咳痰急诊入院。入院后给予抗生素经验性治疗,体温持续在 39—40℃,并出现寒战。疑有菌血症,为明确诊断,此时应考虑做的检查是( )

- A、血常规
- B、胸部 X 线检查
- C、痰培养

- D、血培养
- E、肺功能检查

答案：D

48、哮喘持续状态,是指严重哮喘持续时间达( )

- A、6 小时
- B、10 小时
- C、24 小时
- D、48 小时
- E、12 小时

答案：C

49、陈女士,56 岁,深静脉血栓抗凝治疗期间,测得凝血时间 22 分钟,有轻度牙龈出血的护理措施最恰当的是( )

- A、减少抗凝药物剂量
- B、请示医师调整用量
- C、维持原用药剂量
- D、立即停止用药
- E、鼓励病人下地活动

答案：B

50、侯先生,41 岁,乙肝史 10 余年,近来自觉右上腹胀痛,首选的检查是( )

- A、MRI
- B、腹腔镜
- C、肝动脉造影
- D、核素肝扫描
- E、超声检查

答案：E

51、指导出院后继续服药的患者应该( )服药

- A、.按时、正确、安全
- B、.按时、足量、正确
- C、.按时、足量、全程
- D、.规律、全程、足量
- E、.根据不适随时调节

答案：A

52、青年患者左膝半月板损伤 1 年。反复疼痛,关节肿胀,最合理的治疗方法为

- A、常规半月板切除术

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/558030047060006035>