

新生儿喂养问题护理查房

一、汇报病史

- 床号：10床
- 姓名：
- 住院号：
- 性别：男
- 年龄：13小时
- 主诉：吃奶差13小时
- 入院诊断：1、新生儿喂养问题
- 2、高危儿

一、汇报病史

患儿父亲代诉，患儿系G4P2，胎龄38周+1天，于2022-12-08 02:55，在妇产科足位剖宫产娩出，出生体重：3400g，Apgar评分9分，羊水清，胎盘正常，脐带正常，反应一般，哭声一般，13小时以来患儿吃奶差；患儿因吃奶差故请我科会诊，2022-12-08产科血常规：
WBC: $16.27 \times 10^9/L$ ，RBC: $4.52 \times 10^{12}/L$ ，HGB:169g/L，HCT:0.491，PLT: $303 \times 10^9/L$ ，NEU%:66.30%，LYM%:24.40%，CRP: $<10.0\text{mg}/L$ 。血型：B型，Rh阳性；血糖：2.80mmol/L；拟诊“1.新生儿喂养问题2.高危儿”收治入科，暂母婴分离。大便已解，小便未解，已开奶，吃奶差。

一、汇报病史

入院时查体：

体温 36.6°C ，脉搏130次/分，呼吸48次/分，体重：3.35kg，血氧饱和度：95%，疼痛评分（NIPS）：1分。

于2022-12-08 02:55抱入院，入院时呼吸稍粗，反应一般，哭声一般，全身皮肤无黄染，鼻翼无煽动，口唇无发绀，咽红，颈软，无抵抗，两肺呼吸音粗，未闻及干湿性啰音，心律齐，心音可，未闻及病理性杂音，腹柔软，肝脾未触及肿大，肠鸣音正常，四肢活动自如、无畸形，肌力、肌张力正常，原始反射可引出。

一、汇报病史

12-9反应一般，哭声一般，有呕吐2次胃内容物，全身皮肤无黄染，给予置保暖、补液、能量支持等治疗;加用头孢噻肟钠抗感染、西咪替丁护胃等对症治疗调整奶量15ml;今行小儿颅脑超声、腹部彩超等检查。

12-10 反应一般，哭声一般，全身皮肤轻度黄染，调整奶量30ml。

12-11反应一般，哭声一般，全身皮肤轻中度黄染，口服茵栀黄退黄，调整奶量45ml。

12-12反应一般，哭声一般，全身皮肤轻中度黄染，调整奶量60ml。

12-13反应一般，哭声一般，全身皮肤轻中度黄染，调整奶量70ml。

12-14反应一般，哭声一般，全身皮肤中度黄染，行蓝光治疗退黄。

12-16反应可，哭声可，全身皮肤轻中度黄染，奶量70-90ml，病情好转，予以办理出院。

二、实验室检查（血常规）

二、实验室检查（肝、肾功能、电解质）

辅助检查

- 小儿颅脑超声检查，腹部彩超未见异常。12-9
-

三、护理问题

- 1、营养失调 与患者纳差摄入低于机体需要量有关。
- 2、有窒息的危险 与患儿呼吸系统发育不完善及呕吐有关
- 3、潜在并发症 胆红素脑病
- 4、知识缺乏 与缺乏母乳喂养经验有关

1、营养失调 与患者纳差摄入低于机体需要量有关。

预期目标：患儿奶量逐步增加，体重平稳增加：

- 1) 根据患儿进食情况，遵医嘱给予静脉补液，满足机体需要量
- 2) 观察进食情况，如有呕吐、腹胀及时通知医生，给予处理。
- 3) 对于吸吮力弱，耐心、合理喂养。
- 4) 每日记录患儿吃奶情况，每日监测体重。

护理评价：患儿奶量及体重均增长。（12-16）

日期	12-8	12-9	12-10	12-11	12-12	12-13	12-14	12-15
奶量	5	15	30	45	60	70	70	70
体重 (kg)	3.35	3.31	3.4	3.41	3.42	3.38	3.41	3.45

2、有窒息的危险 与患儿呼吸系统发育不完善及呕吐有关

预期目标：住院期间无窒息发生

护理措施：

- 1) 密切监测生命体征及血氧变化，及时发现窒息先兆并处理。
- 2) 遵医嘱喂养，喂养后轻拍背部，帮助排出胃内积气，头偏向一侧，若出现呕吐及呛咳现象，立即停止喂奶，清除呕吐物，保持呼吸道通畅，必要时吸痰。
- 3) 取合适体位，肩背部垫高。
- 4) 重点床头交接班、勤巡视。
- 5) 如有病情变化，立即通知医师，予以进一步处理

护理评价：患儿未出现窒息，于12-16办理出院。

3、潜在并发症：胆红素脑病

预期目标：患儿无胆红素脑病。

护理措施：

- 1) 密切观察病情，注意胆红素脑病征象。
- 2) 密切监测皮肤黄染情况，观察消退情况。
- 3) 根据经皮胆红素值，遵医嘱及时给予蓝光治疗。
- 4) 遵医嘱给予退黄等药物治疗。

护理评价：患儿住院期间未发生胆红素脑病。（12-16）

日期	12-10	12-11	12-12	12-13	12-14	12-15	12-16
经皮胆 (最高)	11.6	14.2	14.4	15.4	16.1	上午12 下午11.6	12.5

4、知识缺乏 与缺乏母乳喂养经验有关

预期目标：患儿家属明白母乳喂养重要性并能正确进行母乳喂养。

护理措施：

- 1) 为家属建立母乳喂养信心
- 2) 教育正确哺乳姿势
- 3) 乳房的正确护理
- 4) 为妈妈母乳喂养建立良好家庭氛围

效果评价：患儿回家后母乳喂养顺利（12-20）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/558043007022006060>