

2024 年福建省柘荣县《执业药师之西药学专业二》资格考试题库有答案

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 高浓度使细胞膜的渗透性增加，钾离子和其他内容物漏出，细胞死亡的是

- A: 特比萘芬
- B: 环吡酮胺
- C: 制霉菌素
- D: 阿莫罗芬

答案：B

2. 关于链激酶的叙述不正确的是

- A: 是 β 溶血链球菌产生的一种蛋白质
- B: 可促使纤溶酶原激活形成纤溶酶
- C: 对各种早期栓塞有溶解作用
- D: 链球菌感染可增强其作用

答案：D

3. 严重低钾血症、高钠血症、高血压、心力衰竭、肾功能衰竭者禁用的药物是

- A: 多烯磷脂酰胆碱
- B: 雷尼替丁
- C: 甘草酸二铵
- D: 甲氧氯普胺

答案：C

4. 头孢曲松

- A: 肾毒性较大
- B: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注
- C: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染
- D: 用于非典型病原体感染

答案：C

5. 黄体酮治疗先兆流产，必须肌肉注射给药的主要理由是()

- A: 口服吸收缓慢
- B: 肌肉注射吸收迅速
- C: 口服用药排泄快
- D: 口服后在消化道和肝内被迅速破坏

答案：D

6. 属于高选择性非肽类血小板膜糖蛋白 IIb/IIIa 受体抑制剂的是

- A: 替格雷洛
- B: 替罗非班
- C: 噻氯匹定
- D: 氯吡格雷

答案：B

7. 乳腺癌患者绝经前、后均可使用的内分泌治疗药是

- A: 氟他胺
- B: 他莫昔芬
- C: 阿那曲唑
- D: 曲妥珠单抗

答案：B

8. 通过抑制 Ca

- A: 硝酸甘油
- B: 硝苯地平
- C: 胍乙啶
- D: 普萘洛尔

答案：B

9. 患者，女，49 岁。身高 164cm，体重 55kg，因更年期月经不调，经药物治疗效果不佳，而行“子宫切除术”。无药物过敏史。

- A: 克林霉素
- B: 头孢西丁
- C: 左氧氟沙星
- D: 阿奇霉素

答案：B

10. 影响微管的装配，阻碍纺锤体的形成

- A: 羟喜树碱
- B: 紫杉醇
- C: 他莫昔芬
- D: 长春碱

答案：D

11. 中枢性或肾性尿崩症可选用

- A: 氢氯噻嗪
- B: 乙酰唑胺
- C: 呋塞米
- D: 螺内酯

答案：A

12. 降低心脏前、后负荷，对急性心肌梗死及高血压所致的慢性心力衰竭效果较好()

- A: 多巴酚丁胺
- B: 硝普钠
- C: 氨力农
- D: 地高辛

答案：B

13. 属于膨胀性泻药的是()

- A: 硫酸镁
- B: 聚乙二醇 4000
- C: 蓖麻油
- D: 乳果糖

答案：B

14. 用于抗结核杆菌的药物是

- A: 庆大霉素
- B: 新霉素
- C: 妥布霉素
- D: 异烟肼

答案：D

15. 辅助治疗不孕症的维生素是

- A: 维生素 B2
- B: 维生素 B6
- C: 烟酸

D: 维生素 E

答案：D

16. 以下不属于强心苷的禁忌证的是()

A: 室性心动过速、心室颤动

B: 梗阻性肥厚型心脏病

C: 预激综合征伴心房颤动或扑动

D: 慢性收缩性心力衰竭

答案：D

17. 属于硝基呋喃类的是()

A: 夫西地酸

B: 甲硝唑

C: 磺胺甲噁唑

D: 呋喃妥因

答案：D

18. 对非磺酰脲类胰岛素促泌剂的描述正确的是

A: 此类药物可降低 2 型糖尿病者的餐前血糖

B: 此类药物需在餐前即刻服用

C: 此类药物不能单独服用

D: 格列美脲属于本类药物

答案：B

19. 患者，男，15 岁，因咳嗽、咳痰，发热 3 天入院，确诊为社区获得性肺炎，给予静滴青霉素钠 10 分钟后出现头昏，面色苍白，呼吸困难，血压下降等症状，对该患者首选的抢救药物是（）

A: 地塞米松

B: 肾上腺素

C: 去甲肾上腺素

D: 多巴胺

答案：B

20. 他昔莫芬为前药，主要在肝脏经肝药酶代谢，该肝药酶是

A: CYP3A4

B: CYP286

C: CYP2C19

D: CYP2D6

答案：D

21. 不溶于水，微溶于有机溶剂的是

A: 替尼泊昔

B: 依托泊昔

C: 博来霉素

D: 羟喜树碱

答案：D

22. 下列关于眼部细菌感染说法错误的是()

A: 淋球菌性结膜炎采用眼局部抗菌药物治疗即可

B: 局部给予抗菌药物是眼科细菌感染疾病的首选方法

C: 急性期或严重的衣原体感染可口服阿奇霉素治疗

D: 眼科术后引起细菌性眼内炎，可向眼内注射万古霉素

答案：A

23. (2017 年真题) 维 A 酸软膏治疗痤疮时,合理的用法是 ()

A: 一日一次,固定时间使用

- B: 一日二次，早晚使用
- C: 一日一次，睡前使用
- D: 一日一次，晨起使用

答案：C

24. 下列关于袢利尿药不良反应的描述，错误的是()

- A: 耳毒性与剂量无关
- B: 长期使用多数患者可出现高尿酸血症
- C: 常见水、电解质紊乱
- D: 当低血钾和低血镁同时存在时，如不纠正低血镁，即使补充钾也不易纠正低钾血症

答案：A

25. 患者，男，50岁。旅游登山时突发头晕，症状持续不缓解。查体：148 / 90mmHg，心率 80 次 / 分，医嘱卡托普利、氢氯噻嗪治疗。

- A: 抑制循环系统的转换酶，减少血管紧张素 II 的生成
- B: 作用于 RAAS 初始环节，从源头减少血管紧张素 II 的生成
- C: 阻断 AT1 受体
- D: 促进缓激肽水解

答案：A

26. 可引起肺间质纤维化的抗心律失常药物是()

- A: 美托洛尔
- B: 维拉帕米
- C: 地尔硫
- D: 胺碘酮

答案：D

27. 属于黏痰溶解剂，适用于大量痰液堵塞气管导致呼吸困难的祛痰药物是

- A: 乙酰半胱氨酸
- B: 氨溴索
- C: 糜蛋白酶
- D: 溴己新

答案：A

28. 主要用于房颤与心房扑动(房扑)的复律、复律后窦性节律的维持和危及生命的室性心律失常的是()

- A: 奎尼丁
- B: 维拉帕米
- C: 普萘洛尔
- D: 利卡多因

答案：A

29. 关于钙通道阻滞剂(CCB 类)药物的说法错误的是()

- A: 对既往有脑卒中病史的老年高血压患者, 优先选择 CCB 类降压药
- B: CCB 类主要扩张小动脉, 对小静脉和毛细血管作用较小, 可导致下肢或脚踝水肿
- C: 红霉素可显著增加硝苯地平或非洛地平的生物利用度
- D: CCB 类对冠状动脉痉挛所致的变异型心绞痛无效

答案：D

30. 治疗醛固酮升高引起的顽固性水肿的药物是

- A: 阿米洛利
- B: 甘露醇
- C: 氨苯蝶啶

D: 螺内酯

答案：D

31. 双香豆素与苯巴比妥合用可

A: 产生协同作用

B: 诱导肝药酶加速灭活，作用减弱

C: 竞争性对抗

D: 与其竞争结合血浆蛋白

答案：B

32. 关于应对顺铂所致肾毒性的措施，下列说法错误的是

A: 必要时给予碳酸氢钠碱化尿液和别嘌醇

B: 使用时应充分水化，并及时给予利尿剂

C: 肾功能不全者可以使用

D: 定期检测电解质、肾功能，同时观察 24h 尿量及尿颜色

答案：C

33. 患者，男，57 岁，肾功能正常，既往有动脉粥样硬化、高血压合并 2 型糖尿病，用下列药物后出现踝关节肿胀，到药房咨询，药师提示有可能引起该不良反应的药物是

A: 硝苯地平缓释片

B: 格列吡嗪肠溶片

C: 赖诺普利片

D: 阿司匹林肠溶片

答案：A

34. (2016 年真题) 属于 α_1 受体阻断剂的抗良性前列腺增生症的药品是

- A: 特拉唑嗪
- B: 度他雄胺
- C: 普适秦
- D: 酚妥拉明

答案：A

35. 与可待因合用，不仅加重便秘，还可增加麻痹性肠梗阻和尿潴留危险的是

- A: 阿托品
- B: 哌替啶
- C: 硫酸镁
- D: 美沙酮

答案：A

36. 红霉素在下列哪种组织中浓度较低

- A: 胆汁
- B: 肝
- C: 肺
- D: 脑

答案：D

37. 大剂量应用下列哪种维生素时，可使尿液呈黄色

- A: 维生素 B
- B: 维生素 B
- C: 维生素 C
- D: 维生素 B

答案：D

38. 因抑制 P-糖蛋白使地高辛浓度增加 70%~100%的是

- A: 硫酸镁
- B: 胺碘酮
- C: 克拉霉素
- D: 呋塞米

答案：B

39. 华法林应用过量可选用的拮抗药是()

- A: 鱼精蛋白
- B: 维生素 K
- C: 葡萄糖酸钙
- D: 氨基己酸

答案：B

40. (2018 年真题) 具有长效、平稳、血药浓度无峰值特点的胰岛素/胰岛素类似物是()

- A: 预混胰岛素注射液
- B: 甘精胰岛素注射液
- C: 普通胰岛素注射液
- D: 精蛋白锌胰岛素注射液

答案：B

41. 氯霉素与剂量和疗程无关的严重不良反应是()

- A: 严重的再生障碍性贫血
- B: 可逆的性骨髓抑制
- C: 二重感染
- D: 灰婴综合征

答案：A

42. 高钠血症是指

- A: 血钠 $>135\text{mmol/L}$
- B: 血钠 $>130\text{mmol/L}$
- C: 血钠 $>145\text{mmol/L}$
- D: 血钠 $>140\text{mmol/L}$

答案：C

43. 维生素 A 缺乏时可引起

- A: 角膜软化
- B: 成人佝偻病
- C: 坏血病
- D: 脚气病

答案：A

44. 秋水仙碱的注意事项错误的是

- A: 可致可逆性维生素 B
- B: 不可用于长期痛风的预防
- C: 肾功能下降时可造成蓄积
- D: 尽量避免静脉注射和长期口服给药

答案：A

45. 磷酸二酯酶抑制剂的机制

- A: 抑制血小板表面的 ADP 受体
- B: 使血小板内 cAMP 浓度增高而产生抗血小板作用
- C: 抑制葡萄糖脱氢酶
- D: 抑制纤维蛋白原与血小板膜表面糖蛋白受体的结合

答案：B

46. 四环素的抗菌作用机制

- A: 与核糖体 50S 亚基结合，抑制肽酰基转移酶的活性
- B: 影响胞浆膜通透性
- C: 与核糖体 50S 亚基结合，抑制移位酶的活性
- D: 与核糖体 30S 亚基结合，抑制蛋白质的合成

答案：D

47. 连续使用应间隔 4h 以上

- A: 麻黄碱
- B: 酚甘油滴耳液
- C: 羟甲唑啉
- D: 赛洛唑啉

答案：C

48. 属于 β 受体阻断剂，对正常人血压影响不明显，而对高血压患者具有降压作用的降压药是()

- A: 氢氯噻嗪
- B: 美托洛尔
- C: 利血平
- D: 硝苯地平

答案：B

49. 口角炎患者用选用的维生素是

- A: 维生素 A
- B: 维生素 B
- C: 维生素 B
- D: 维生素 D

答案：C

50. (2021 年真题) 属于二肽基肽酶-4 (DPP-4) 抑制剂的药物是 ()

- A: 利拉鲁肽
- B: 西格列汀
- C: 格列美脲
- D: 那格列奈

答案：B

51. 长期大量服用维生素 K

- A: 视物模糊、疲乏、乳腺肿大
- B: 疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、食欲减退、贫血、眼球突出等中毒现象
- C: 视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等
- D: 低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症

答案：A

52. 甲氧氯普胺治疗呕吐和促胃肠运动的机制是 ()

- A: 阻断 CTZ 的 D
- B: 抗幽门螺杆菌
- C: 阻断 H
- D: 抑制胃壁细胞的 H

答案：A

53. 支气管哮喘急性发作时宜使用的药物是 ()

- A: 沙丁胺醇气雾剂
- B: 孟鲁司特钠咀嚼片
- C: 沙美特罗氟替卡松粉吸入剂

D: 吸入用布地奈德混悬液

答案: A

54. 关于氟喹诺酮类药物的说法不正确的是

A: 不良反应少

B: 口服吸收好，组织药物浓度高

C: 抗菌谱广，抗菌力强

D: 与其他药物有交叉耐药性

答案: D

55. 患者，女，42 岁。双掌指关节、腕关节肿痛伴晨僵 1 月，诊断为类风湿关节炎，给予抗风湿药治疗，下列不属于该类药物的

A: 糖皮质激素

B: 萘普生

C: 依那西普

D: 司来吉兰

答案: D

56. 属于多巴胺受体阻断剂的止吐药的是()。

A: 阿瑞吡坦

B: 托烷司琼

C: 甲氧氯普胺

D: 维生素 B

答案: C

57. 关于地西泮的叙述，错误的是

A: 抗焦虑作用时间长，是临床上常用的抗焦虑药之一

B: 是一种长效镇静催眠药物

C: 抗癫痫作用强，可用于治疗癫痫小发作

D: 在临床上可用于缓解炎症引起的反射性肌肉痉挛

答案: C

58. 对择期手术者，且无需抗血小板治疗者，应于术前多久考虑停用抗血小板药、抗凝血药

A: 1 周

B: 1 天

C: 5 天

D: 3 天

答案: A

59. (2020 年真题) 患者，女，26 岁。因心悸、手颤、易饥饿、烦躁易怒前来就诊，实验室检查游离甲状腺素(FT3、FT4)增高、促甲状腺素(TSH)降低，诊断为甲状腺功能亢进症。医师处方给予抗甲状腺药治疗。

A: 碘化钾

B: 利多卡因

C: 特布他林

D: 普萘洛尔

答案: D

60. 为高分子聚合物，通过增加局部渗透压软化大便，对肠道 pH 没有影响的是

A: 乳果糖

B: 酚酞

C: 开塞露

D: 聚乙二醇 4000

答案：D

61. (2017 年真题) 可导致新生儿药物性黄疸的是 ()

- A: 阿莫西林
- B: 磺胺嘧啶
- C: 兴孢他啶
- D: 林可霉素

答案：B

62. (2015 年真题) 用于低分子肝素过量时解救的药品是 () 。

- A: 酚磺乙胺
- B: 鱼精蛋白
- C: 维生素 K1
- D: 氨甲环酸

答案：B

63. 甲氨蝶呤主要用于

- A: 室管膜瘤
- B: 神经母细胞瘤
- C: 儿童急性白血病
- D: 慢性粒细胞性白血病

答案：C

64. 氨基糖苷类抗菌药无效的是 ()

- A: 铜绿假单胞菌
- B: 结核杆菌
- C: 厌氧菌和肠球菌
- D: 需氧革兰阴性菌

答案：C

65. 属于 5-HT₃ 受体阻断剂的止吐药是

- A: 甲氧氯普胺
- B: 托烷司琼
- C: 阿瑞吡坦
- D: 维生素 B₆

答案：B

66. 可阻断虫体对多种营养和葡萄糖的摄取，导致虫体糖原耗竭，致使寄生虫无法生存和繁殖的广谱驱虫药是

- A: 阿苯达唑
- B: 左旋咪唑
- C: 哌嗪
- D: 甲苯咪唑

答案：A

67. 下列关于胺碘酮的叙述错误的是

- A: 可以用于窦房传导阻滞
- B: 适用于合并器质性心脏病的心率失常
- C: 促心率失常反应少
- D: 对室上性和室性心律失常均有效

答案：A

68. (2015 年真题) 属于糖皮质激素禁忌症的是 ()。

- A: 过敏性皮炎
- B: 再生障碍性贫血
- C: 严重高血压

D: 类风湿性关节炎

答案: C

69. 对革兰阳性菌、革兰阴性菌、厌氧菌均有强大抗菌活性的药物是()

A: 克拉维酸

B: 阿莫西林

C: 氨曲南

D: 亚胺培南

答案: D

70. (2018 年真题) 不易发生“双硫仑样”反应的药物是()

A: 头孢曲松

B: 头孢哌酮

C: 头孢替安

D: 头孢他啶

答案: D

71. 没有镇静和“宿醉”现象，不属于巴比妥类和苯二氮

A: 阿普唑仑

B: 地西泮

C: 异戊巴比妥

D: 佐匹克隆

答案: D

72. 关于多柔比星治疗时使用右雷佐生的叙述，不正确的是

A: 与多柔比星同时给药

B: 右雷佐生剂量应为多柔比星剂量的 10 倍

C: 右雷佐生水解后能与多柔比星螯合

D: 使用右雷佐生的目的是保护心肌

答案：A

73. (2018 年真题) 属于 β_2 受体激动剂的平喘药是 ()

A: 沙美特罗

B: 孟鲁司特

C: 噻托溴铵

D: 茶碱

答案：A

74. (2015 年真题) 属于胰岛素增敏剂的是 ()。

A: 阿卡波糖

B: 罗格列酮

C: 二甲双胍

D: 西格列汀

答案：B

75. 下列属于超短效胰岛素的是 ()

A: 门冬胰岛素

B: 甘精胰岛素

C: 低精蛋白锌胰岛素

D: 精蛋白锌胰岛素

答案：A

76. 对于急性白血病在一线耐药时使用，但作为二线用药的药物是

A: 多柔比星

B: 柔红霉素

C: 表柔比星

D: 吡柔比星

答案：A

77. 作用于微管的抗肿瘤药物是

A: 顺铂

B: 紫杉醇

C: 依托泊苷

D: 来曲唑

答案：B

78. 毒性较大，尤其对第Ⅷ对脑神经和肾损害严重的药物是

A: 对氨基水杨酸

B: 利福平

C: 卡那霉素

D: 异烟肼

答案：C

79. β 受体阻滞药降低眼压的作用机制是()

A: 减少房水生成，促进房水引流的排出

B: 增加房水经小梁网的外流，降低眼压

C: 缩小瞳孔，开放前房角

D: 增加房水的葡萄膜巩膜通路的外流和引流

答案：A

80. 主要阻滞电压依赖性的钠通道，属于二苯并氮

A: 苯妥英钠

B: 卡马西平

C: 苯巴比妥

D: 加巴喷丁

答案: B

81. 患儿。女，14 岁。因出现尿频、尿急、尿痛症状 2 天就诊，诊断为急性膀胱炎，患儿既往有癫痫病史，宜选用的治疗药物是（）。

A: 阿奇霉素

B: 青霉素 G

C: 呋喃妥因

D: 环丙沙星

答案: C

82. 下列不属于双膦酸盐类药物的是

A: 依替膦酸二钠

B: 阿法骨化醇

C: 阿仑膦酸钠

D: 帕米膦酸二钠

答案: B

83. 维生素 A 的适应证不包括

A: 干眼病

B: 角膜软化

C: 夜盲症

D: 甲状旁腺功能不全引起的低钙血症

答案: D

84. 患者，女，63 岁。急性心肌梗死行经皮冠状动脉介入（PCI）治疗，术后为预防支架内血栓形成，常与阿司匹林联合使用的药物是

A: 华法林

- B: 奥美拉唑
- C: 氯吡格雷
- D: 双氯芬酸

答案: C

85. 通过监测国际标准化比值（INR）调整给药剂量的药物是（）

- A: 地高辛
- B: 茶碱
- C: 华法林
- D: 丙戊酸钠

答案: C

86. 患者，女，55 岁，临床诊断为 2 型糖尿病。目前药物治疗方案如下：

- A: 可能出现的不良反应有腹痛，腹泻，腹胀
- B: 定期监测血清维生素 B12 水平
- C: 服药期间不要饮酒，以免引起低血糖
- D: 服药通常需 3-4 周的治疗才达降糖疗效

答案: D

87. 可升高高密度脂蛋白胆固醇水平的维生素是

- A: 泛酸钙
- B: 烟酸
- C: 叶酸
- D: 维生素 B

答案: B

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

88. 用于治疗慢性功能性便秘，也可用于高氨血症的治疗的是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/558106077043007022>