专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2023-24年江苏省建邺区《执业药师之西药学专业二》资格考试必背200题题库大全往年题考

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.将乙胺丁醇与链霉素合用治疗结核病的目的是

A：有利于药物进入结核感染病灶

B：延迟肾脏排泄链霉素

C：阻止或延迟结核杆菌对链霉素产生耐药性

D：延长链霉素作用时间

答案：C

2.丙烯胺类抗真菌药()

A：阿莫罗芬

B：特比萘芬

C：氟康唑

D：两性霉素

答案：B

3.通过抑制 α-葡萄糖苷酶，减少多糖水解为葡萄糖()

A：艾塞那肽

B：格列本脲

C：阿卡波糖

D：二甲双胍

答案：C

4.治疗醛固酮升高引起的顽固性水肿的药物是

A: 螺内酯

B: 甘露醇

C: 阿米洛利

D: 氨苯蝶啶

答案：A

5.属于芳基乙酸类的是

A: 塞来昔布

B: 对乙酰氨基酚

C: 阿司匹林

D: 吲哚美辛

答案：D

6.抢救糖尿病酮症酸中毒和高血糖高渗性昏迷患者宜选用

A: 低精蛋白锌胰岛素

B: 普通胰岛素

C: 二甲双胍

D: 格列喹酮

答案：B

7.患者，男，45岁，因“咳嗽、咳痰1周，发热2天”入院，诊断为社区获得性肺炎，两次痰培养为金黄色葡萄球菌(MSRA)，适合选用的是

A: 阿莫西林

B: 苄星青霉素

C: 双氯西林

D: 万古霉素

答案：D

8.神经垂体功能不足引起的中枢性尿崩症具有良好抑制作用的药物是

A: 促肾上腺皮质激素

B: 催乳素

C: 促性腺激素

D: 醋酸去氨加压素

答案：D

9.患者。男，42岁，胃癌，病理为胃窦低分化腺癌，根治术后，肝肾功能正常，化疗方案为紫杉醇，顺铂+氟尿嘧啶。

A: 急性恶心呕吐

B: 爆发性恶心呕吐

C: 预期性恶心呕吐

D: 延迟性恶心呕吐

答案：A

10.铜绿假单胞菌性结膜炎常用()

A: 金霉素眼膏

B: 1%泼尼松滴眼液

C: 夫西地酸滴眼剂

D: 多黏菌素B滴眼液

答案：D

11.患者，女，62岁。有高血压病史14年，伴变异型心绞痛，最近频繁发生阵发性室上性心动过速，宜选用()

A: 维拉帕米

B: 尼莫地平

C：硝苯地平

D：普萘洛尔

答案：A

12.叶酸主要用于治疗

A：妊娠期巨幼红细胞性贫血

B：溶血性贫血

C：再生障碍性贫血

D：缺铁性贫血

答案：A

13.治疗青光眼宜选用

A：毛果芸香碱滴眼液

B：左氧氟沙星滴眼液

C：复方托吡卡胺滴眼液

D：碘苷滴眼液

答案：A

14.大剂量炔诺酮()

A：抑制排卵作用

B：抗着床

C：减少精子数目

D：促进蛋白质合成

答案：B

15.通过抑制Ca

A：普萘洛尔

B：硝酸甘油

C：胍乙啶

D：硝苯地平

答案：D

16.（2017年真题）关于镇咳药作用强度的比较,正确的是（）

A：苯丙哌林＞喷托维林＞可待因

B：喷托维林＞苯丙哌林＞可待因

C：可待因＞苯丙哌林＞喷托维林

D：苯丙哌林＞可待因＞喷托维林

答案：D

17.下列哪项不是维生素K的适应证

A：梗阻性黄疸所致的出血

B：早产儿及新生儿肝脏合成功能不足引起维生素K缺乏

C：用于弥散性血管内凝血症高凝期

D：水杨酸类药物过量引起的出血

答案：C

18.心律失常发生的机制是

A：潜在起搏点搏动频率加快

B：心肌兴奋冲动形成异常或传导异常

C：心肌兴奋过度导致窦房结搏动异常

D：心肌兴奋过度导致异常

答案：B

19.抑制Na

A：呋塞米

B：乙酰唑胺

C: 氨苯蝶啶

D: 氢氯噻嗪

答案：D

20.用于阵发性室上性心动过速的钙通道阻滞药是

A: 苯妥英钠

B: 利多卡因

C: 维拉帕米

D: 胺碘酮

答案：C

21.属于长效 β

A: 布地奈德

B: 沙美特罗

C: 沙丁胺醇

D: 多索茶碱

答案：B

22.能明显抑制骨髓造血功能的药物是

A: 庆大霉素

B: 氯霉素

C: 红霉素

D: 青霉素 G

答案：B

23.关于中枢性镇咳药的使用，叙述错误的是

A: 中枢性镇咳药属于对症治疗药物，用药 7 日如症状未缓解，宜停药就诊

B：高龄患者、肝功能不全患者、肾功能不全患者宜从小剂量开始

C：特别适用于无痰、干咳患者

D：痰多黏稠患者亦可使用该类药物单药治疗

答案：D

24.不属于血管紧张素转化酶抑制剂（ACEI）类药物作用特点的是

A：ACEI可引起反射性心率加快

B：ACEI类禁用于双侧肾动脉狭窄者

C：ACEI可改善左心室功能

D：ACEI对肾脏有保护作用

答案：A

25.关于达比加群酯的描述，错误的是

A：用药期间应监测凝血功能、肝功能

B：长期口服安全性较好

C：为直接凝血酶的抑制剂

D：与阿司匹林联用不会增加出血风险

答案：D

26.有关甲氨蝶呤药物相互作用的说法，错误的是（）

A：与顺铂等肾毒性药物合用，可能减慢甲氨蝶呤的肾排泄

B：阿司匹林会减慢甲氨蝶呤的肾排泄

C：丙磺舒会减慢甲氨蝶呤的肾排泄

D：碳酸氢钠会减慢甲氨蝶呤的肾排泄

答案：D

27.通过抑制GABA的降解或促进合成而达到抗癫痫作用的药物是

A：脂肪酸类

B：二苯并氮革类

C：乙内酰脲类

D：γ-氨基丁酸类似物

答案：A

28.大剂量对纯合子家族性高胆固醇血症有效的他汀类调血脂药是

A：氟伐他汀

B：藻酸双酯钠

C：阿伐他汀

D：普伐他汀

答案：C

29.下列关于紫杉醇的描述，错误的是

A：应预防由紫杉醇所致的超敏反应

B：广谱、天然抗肿瘤药

C：长期应用可产生抗药性，出现多药耐药性现象

D：与多西他赛相比，神经毒性和心脏毒性都较轻

答案：D

30.（2017年真题）升高高密度脂蛋白胆固醇水平的（）

A：烟酸

B：叶酸

C：维生素B2

D：泛酸钙

答案：A

31.氨基糖苷类抗菌药无效的是

A：厌氧菌

B: 结核杆菌

C: 需氧革兰阴性菌

D: 铜绿假单胞菌

答案：A

32.钾离子竞争性酸抑制剂的作用机制是

A: 通过二硫键与质子泵的硫基呈不可逆性的结合

B: 抑制乙酰胆碱M受体

C: 通过竞争胃壁细胞膜腔面的钾离子来发挥作用

D: 竞争性拮抗组胺与胃壁细胞上的H?受体结合

答案：C

33.糖皮质激素的抗炎作用是

A: 抑制巨噬细胞中一氧化氮合成酶

B: 提高机体对细菌内毒素的耐受力

C: 提高中枢神经系统的兴奋性

D: 抑制巨噬细胞对抗原的吞噬处理

答案：A

34.对淋病、梅毒可作为首选的是

A: 氯霉素

B: 土霉素

C: 青霉素

D: 红霉素

答案：C

35.患儿，男，7岁。长期偏食。近1个月面色渐苍白，自诉全身无力。体检：肝肋下4cm，脾肋下1cm。血常规：Hb70g／L，RBC3.0×1012／L，Ret2.0%，WBC、P1t均正常，MCV74fl，MCH26pg，MCHC30%，考虑为缺铁性贫血。

A: 蓝色

B: 黑色

C: 绿色

D: 红色

答案：B

36.适用于各种类型疟疾的症状控制，尤其是对抗氯喹恶性及凶险型疟疾有较好疗效的药物是

A: 奎宁

B: 乙胺嘧啶

C: 蒿甲醚

D: 双氢青蒿素

答案：D

37.患者，女性，62岁，有高血压病史14年，伴变异性心绞痛，最近频繁发生阵发性室上性心动过速，宜选用

A: 硝苯地平

B: 普萘洛尔

C: 维拉帕米

D: 尼莫地平

答案：C

38.已使用ACEI／ARB／ARNI、β受体阻断剂、醛固酮受体阻断剂，β受体阻断剂已达到目标剂量或最大耐受剂量，心率仍≥70次／分钟时，可用

A: 沙库巴曲缬沙坦

B：卡托普利

C：美托洛尔

D：伊伐布雷定

答案：D

39.镇静催眠药佐匹克隆的禁忌证是（）

A：重症肌无力

B：低蛋白血症

C：癫痫

D：糖尿病

答案：A

40.（2016年真题）可用于习惯性流产的药品是

A：依普黄酮

B：他莫昔芬

C：戊酸雌二醇

D：地屈孕酮

答案：D

41.氨基糖苷类抗生素对哪类细菌无效

A：铜绿假单胞菌

B：结核杆菌

C：厌氧菌

D：革兰阴性菌

答案：C

42.甲氧苄啶与磺胺合用是因为

A：抗菌谱相似

B: 双重阻断细菌的叶酸代谢

C: 相互对抗不良反应

D: 减少泌尿道损害

答案：B

43.阿昔洛韦的作用靶点是

A: 脱氧核糖核酸聚合酶

B: HIV-1反转录酶

C: 神经氨酸酶

D: HIV-1和HIV-2蛋白酶

答案：A

44.下列哪种属于长效青霉素

A: 苄星青霉素

B: 苯唑西林

C: 青霉素V

D: 阿莫西林

答案：A

45.不能抑制胃酸分泌，可在两餐间和睡眠前服用，不属于治疗消化道溃疡的首选抗酸药物是

A: 碳酸氢钠

B: 硫糖铝

C: 枸橼酸铋钾

D: 法莫替丁

答案：A

46.属于白三烯受体阻断剂的是

A: 异丙托溴

B: 福莫特罗

C: 孟鲁司特

D: 乙酰胆碱

答案：C

47.口服可用于防治血栓性疾病如心肌梗死和脑梗死的是

A: 香豆素类

B: 维生素B

C: 肝素

D: 维生素K

答案：A

48.患儿，男，5日。昨起拒食、反应差，今日皮肤明显黄染入院。体检：颈周、前胸多个小脓疱，心肺无异常，肝右肋下2．5cm，脾肋下1cm，诊断为新生儿败血症，给予头孢曲松治疗。

A: 新生儿肾功能未发育完全，不宜使用头孢曲松

B: 新生儿对头孢曲松不敏感

C: 新生儿出现明显皮肤黄染时，不宜使用头孢曲松

D: 新生儿肝功能未发育完全，不宜使用头孢曲松

答案：C

49.对衣原体有效的是

A: 克林霉素

B: 替硝唑

C: 红霉素

D: 万古霉素

答案：C

50.属于白三烯受体阻断剂的平喘药物是

A：异丙托溴铵

B：孟鲁司特

C：茶碱

D：沙丁胺醇

答案：B

51.联合应用可使部分患者血压升高的药物是

A：磷霉素钠+万古霉素

B：磷霉素氨丁三醇

C：利奈唑胺+苯丙醇胺

D：利奈唑胺+哌替啶

答案：C

52.下列关于钠的作用特点描述，错误的是

A：不能调节体内水量的恒定

B：调节体内水量的恒定

C：维持血压

D：调节体液渗透压、电解质及酸碱平衡

答案：A

53.用于组织脱水的治疗方案是

A：可予10%～25%葡萄糖注射液滴注，每日100g葡萄糖即可控制病情

B：一般可给予10%～25%葡萄糖注射液静脉滴注，并同时补充体液

C：一般采用50%葡萄糖注射液20～40ml，快速静脉注射

D: 应用高渗透压的25%-50%葡萄糖注射液滴注，常与20%甘露醇注射液联合应用

答案：D

54.患者，男，25岁。咽炎，注射青霉素后1分钟呼吸急促、面部发绀，心率130次/分，血压60/40mmHg。

A: 地塞米松+肾上腺素

B: 曲安西龙+异丙肾上腺素

C: 地塞米松+去甲肾上腺素

D: 地塞米松+多巴胺

答案：A

55.属于P-糖蛋白的底物，提高辛伐他汀发生横纹肌溶解危险性的是

A: 地高辛

B: 烟酸

C: 利福平

D: 红霉素

答案：A

56.下列药物中，不属于蒽环类抗肿瘤抗生素的是

A: 柔红霉素

B: 多柔比星

C: 表柔比星

D: 红霉素

答案：D

57.奎宁日剂量超过1g/d或连续长时间应用，可见耳鸣、头痛、视力与听力减退等，停药后常可恢复，临床称为

A: 锥体外系反应

B: 吉海反应

C: 双硫仑样反应

D: 金鸡纳反应

答案：D

58.下列氨基糖苷类抗菌药物中，引起耳蜗神经损伤发生率最高的是

A: 链霉素

B: 卡那霉素

C: 妥布霉素

D: 新霉素

答案：D

59.阿司匹林的抗血小板作用机制为

A: 抑制血小板中TXA

B: 促进内皮细胞中PGI

C: 激活环氧酶

D: 抑制内皮细胞中TXA

答案：A

60.治疗慢性心力衰竭，ACEI和其联合有协同作用的是()

A: 人促红素

B: β受体阻断药

C: 留钾利尿药

D: 噻嗪类利尿药

答案：B

61.属于广谱抗心律失常药物的是()

A：苯妥英钠

B：利多卡因

C：地高辛

D：胺碘酮

答案：D

62.直接舒张小动脉平滑肌的药物是

A：可乐定

B：哌唑嗪

C：肼屈嗪

D：利血平

答案：C

63.口服不可嚼碎，否则易引起严重口腔溃疡的助消化药物是

A：氢氧化铝

B：西咪替丁

C：乳酸菌素

D：胰酶

答案：D

64.氯霉素的抗菌作用机制是

A：与细菌核糖体50S亚基结合，抑制肽酰基转移酶的活性，从而阻止肽链延伸，使蛋白质合成受阻

B：改变细菌胞浆膜通透性，使重要的营养物质外漏

C：抑制二氢叶酸合成酶，影响叶酸的合成

D：阻止氨基酰-tRNA与细菌核糖体30S亚基结合，影响蛋白质的合成

答案：A

65.（2021年真题）一对年轻夫妇计划出国旅游，出发前，准备选购以下治疗腹泻的药物备用，包括蒙脱石、口服补液盐、双歧杆菌三联活菌、洛哌丁胺，小檗碱。

A：嗜酸乳杆菌

B：双歧杆菌

C：粪肠球菌

D：梭状芽孢杆菌

答案：D

66.（2020年真题）痛风缓解期，抑制内源性尿酸生成的药物是

A：秋水仙碱

B：苯溴马隆

C：碳酸氢钠

D：非布司他

答案：D

67.长期、单一应用 β

A：支气管痉挛

B：暂时性低血糖

C：耐药性

D：头痛

答案：C

68.使用二磷酸果糖时需要监测血磷水平的是()

A：肌酐清除率低于50%的患者

B：肌酐清除率低于30%的患者

C：肌酐清除率低于40%的患者

D：肌酐清除率低于60%的患者

答案：A

69.幼儿甲状腺素不足易患

A：侏儒症

B：呆小病

C：单纯性甲状腺肿

D：黏液性水肿

答案：B

70.主要抑制排卵的短效口服避孕药是()

A：丙酸睾酮

B：苯丙酸诺龙

C：炔诺酮

D：复方炔诺酮

答案：D

71.可能发生不可逆性骨髓功能抑制，应避免重复疗程使用的药物是()

A：四环素

B：多西环素

C：青霉素

D：氯霉素

答案：D

72.葡醛内酯属于

A：胃黏膜保护剂

B：促胃肠动力药

C：肝胆疾病辅助用药

D：抑酸剂

答案：C

73.门冬酰胺酶能抑制蛋白质的合成，使细胞停止于()，从而降低其对甲氨蝶呤的敏感性，限制甲氨蝶呤的骨髓毒性

A：M期

B：G

C：G

D：G

答案：D

74.患者,女52岁,因“闭经1年,潮热、情绪波动严重失眠半年”就诊,临床诊断为“更年期综合征”。拟给予的药物治疗方案为:戊酸雌二醇片,每日1次,每次1mg,醋酸甲羟孕酮片每日1次,每次2mg。

A：必尿系统感染四

B：血栓性静脉炎

C：血脂异常

D：骨质疏松症

答案：B

75.属于DPP-4抑制剂的药物是

A：那格列奈

B：阿格列汀

C：伏格列波糖

D：利拉鲁肽

答案：B

76.肝功能不全的心衰患者可选用

A：普萘洛尔

B: 美西律
C: 地尔硫䓬
D: 地高辛
答案：D

77.属于M胆碱受体阻断剂的平喘药是()
A: 茶碱
B: 孟鲁司特
C: 噻托溴铵
D: 沙美特罗
答案：C

78.选择性雌激素受体调节剂可能增加静脉血栓栓塞事件的危险性，危险性最大的时期是
A: 治疗初始时1个月内
B: 治疗初始时4个月内
C: 治疗开始6个月后
D: 治疗初始时2个月内
答案：B

79.患者，女，49岁，间断上腹部饱胀、恶心1年。患者1年前无明显诱因出现恶心、上腹饱胀感，自行服用胃药（具体不详）治疗后症状好转。2个月前患者上述症状再次发作，查体：上腹部轻微压痛，无反跳痛。胃镜、腹部B超检查未见明显异常。诊断：功能性消化不良。医嘱：枸橼酸莫沙必利片，5mg，口服，3次/日。
A: 功能性消化不良
B: 糖尿病胃轻瘫
C: 化疗所致的恶心、呕吐

D: 胃食管反流病

答案：C

80.关于糖皮质激素对血液成分影响的描述，错误的是

A: 使血小板增多

B: 降低纤维蛋白原浓度

C: 使红细胞和血红蛋白含量增加

D: 使中性白细胞数增多

答案：B

81.广泛用于各种吸虫药的治疗，还能用于绦虫病的药物是

A: 乙胺嘧啶

B: 甲硝唑

C: 吡喹酮

D: 三苯双脒

答案：C

82.淋巴细胞白血病采用

A: 糖皮质激素小剂量代替疗法

B: 糖皮质激素一般剂量长期疗法

C: 糖皮质激素大剂量冲击疗法

D: 抗结核病药与糖皮质激素合用

答案：B

83.长春碱使细胞有丝分裂停止于

A: G

B: G

C: M期

D: S期

答案：C

84.以下不属于干扰核酸生物合成的药物是

A: 表柔比星

B: 卡培他滨

C: 甲氨蝶呤

D: 培美曲塞

答案：A

85.属于Ⅰ类抗心律失常药且能引起金鸡纳反应的是

A: 利多卡因

B: 奎尼丁

C: 胺碘酮

D: 普萘洛尔

答案：B

86.可降低极低密度脂蛋白胆固醇和三酰甘油，主要升高高密度脂蛋白胆固醇的调血脂药是

A: 利血平

B: 依折麦布

C: 瑞舒伐他汀

D: 阿昔莫司

答案：D

87.应用硝普钠时的注意事项及用药监护不包括()

A: 避光使用

B: 监测血压

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/558133041052007022