

2023年海南省国营昆仑农场医院住院医师规范化 培训招生（口腔科）考试历年高频考点试题+答案

（图片大小可自由调整）

卷 I

一. 参考题库 1 (共 25 题)

1. 患者女性，7岁，食冷饮时左后牙感到酸痛半月，无自发痛史，检查发现 $\overline{6}$ 颊 $\overline{7}$ 面深龋，龋蚀范围稍广，腐质软而湿润，易挖除，但敏感。测牙髓活力同正常牙，叩（-）。根据上述临床表现和检查结果，拟诊断为（）

- A、慢性根尖周炎
- B、急性牙髓炎
- C、急性龋
- D、慢性龋
- E、慢性闭锁性牙髓炎

正确答案:C

2. 卡环的组成部分中，起支持作用的部分有（）

- A、卡环臂
- B、卡环体
- C、 $\overline{7}$ 支托
- D、连接体
- E、卡臂尖

正确答案:B, C

3. 减轻固定桥桥体 $\overline{7}$ 力的方法有（）

- A、适当降低牙尖斜度

- B、适当缩短桥体𪚩面舌侧的近远中径
- C、增加桥体龈端与牙槽嵴的接触面积
- D、增加桥体与固位体的舌外展隙
- E、增加桥体颊舌径

正确答案:A, B, D

4. 患者，女，38岁。主诉：右半侧牙遇冷热疼3周。病历记载：1个月前右上后牙在外院已做牙髓治疗，治疗后原症状略缓解，遇热仍疼，且偶有自发疼。检查：右上4近中咬合面银汞充填完好，叩(+)，冷测反应均迟钝，热水可引起痛，持续数分钟。右上5冠完整，仅见颊面釉质有一纵行隐裂纹，涂碘酊染色不明显，叩：(+)，在裂纹处冷热测均较对照牙略敏感，其余未见异常。右上6残根，叩诊(-)，周围牙龈略红，探之易出血。

为解决主诉症状，首先应做()。

- A、右上4再行根管治疗
- B、右上5调𪚩
- C、右上6根管治疗
- D、右上5塑化治疗
- E、右上6拔除

正确答案:A

5. 男孩，7岁。右下后牙自发痛3天。检查：𪚩大面积龋坏，探及髓腔，无感觉。叩诊感不适，

I°松动，颊侧有瘻管。X线示𪚩根分歧大量低密度影，恒牙胚牙囊骨硬板消失。𪚩缺失𪚩萌出2/3，沟深，曾做过窝沟封闭。

𪚩的处理方法()

- A、观察，口服消炎药
- B、根管治疗
- C、氧化锌丁香油糊剂暂封
- D、玻璃离子水门汀充填
- E、拔除

正确答案:E

6. 女性，45岁，已经明确诊断为慢性牙周炎并经基础治疗4周后，𪚩牙周袋探诊深度仍然为6mm，可探入颊侧根分叉区，牙龈无退缩，X线片检查见根分叉处牙槽骨密度略有减低，则该患者最适宜做()

- A、袋内壁刮治术

- B、翻瓣术
- C、隧道成形术
- D、截根术
- E、引导性组织再生术

正确答案:E

7. 根分叉病变发生率最高的牙位是 ()。

- A、下第一磨牙
- B、上颌第一磨牙
- C、上颌前磨牙
- D、下第二磨牙
- E、上颌第二磨牙

正确答案:A

8. 全冠粘固后立即出现过敏性痛的正确的处理方式是 ()

- A、调𦍃
- B、拆除修复体重做
- C、不处理，观察情况后再决定
- D、局部应用消炎镇痛药

正确答案:C

9. 女，40岁，右上颌第一磨牙𦍃面纵向隐裂且累及牙髓，临床牙冠较短，咬合紧，根管治疗已完成。

该病例的最适修复体设计是 ()

- A、锤造全冠
- B、铸造全冠
- C、邻嵌体
- D、瓷全冠
- E、嵌体

正确答案:B

10. 男，40岁，查见右上6𦍃面深龋，颊侧近中探及深达根尖的牙周袋，探之溢脓，叩(-)，松动Ⅰ度，X-ray示牙槽骨高度基本正常，根尖区阴影。

初诊印象考虑原因可能为 ()

- A、牙周脓肿

- B、牙龈脓肿
- C、咬合创伤
- D、慢性根尖周炎
- E、牙髓牙周联合病变

正确答案:E

11. 恒牙建合的关键是 ()
- A、第 1 恒磨牙的咬合关系
 - B、第 2 恒磨牙的咬合关系
 - C、保证第 1 恒磨牙无龋坏
 - D、保证第 2 恒磨牙无龋坏
 - E、及时进行第 1、2 恒磨牙的窝沟封闭

正确答案:A

12. 19 岁女性患者，3 天来右下后牙阵发性疼痛，冷热刺激加重疼痛，夜晚因剧痛难眠而就诊，半年前有过类似疼痛，未作处理。检查：右下后牙颊面龋洞，探及穿髓点，浅探不敏感，深探剧痛，咬合痛。

最可能的诊断是 ()

- A、急性根尖周炎
- B、慢性牙髓炎
- C、慢性牙髓炎急性发作
- D、残髓炎
- E、冠周炎

正确答案:C

13. 女性，16 岁，要求治疗右上前牙。3 个月前，右上中切牙外伤未及时就诊。检查：近中切角缺损，牙冠暗灰色，叩痛 (-)，电测验无活力。X 线片未见根折线。该患牙的诊断应是 ()

- A、外伤冠折
- B、急性牙髓炎
- C、慢性牙髓炎
- D、牙髓坏死
- E、急性根尖周炎

正确答案:D

14. 45缺失，6松动 I 度，3稳固 ()

- A、复合固定桥
- B、单端固定桥
- C、双端固定桥
- D、半固定桥
- E、种植固定桥根据牙列缺损情况选择相应的固定桥类型

正确答案:D

15. 拔牙可能发生 ()


- A、邻牙松动
- B、对颌牙损伤
- C、牙槽骨骨折
- D、牙龈撕裂
- E、牙根折断

正确答案:A, B, C, D, E

16. 12345因颌骨囊肿拔除，基牙稍有松动，可选择 ()

- A、腭杆
- B、腭板
- C、舌托
- D、舌面板
- E、树脂基托

正确答案:E



17. IV度根分叉区病变，最不需作哪项治疗 ()

- A、牙髓切除术
- B、牙周翻瓣手术
- C、洁治术
- D、刮治术
- E、根面平整术

正确答案:A

18. 与固定义齿的咀嚼功能有关的形态是 ()

- A、牙冠形态
- B、牙根形态
- C、桥体𪚩面形态
- D、连接体形态
- E、桥体龈面形态

正确答案:C

19. 男, 21 岁, **11** 因外伤完全脱落而来诊。关于治疗方法的选择错误的是 ()

- A、外伤半小时内立即再植
- B、如果牙齿落地已污染, 应就地用生理盐水冲洗牙齿立即复位
- C、若牙脱位时间超过 2 小时, 只能在体外作根管治疗后再植
- D、已污染的脱位牙经生理盐水冲洗后, 若不立即复位, 则需干燥保存
- E、脱位牙已污染, 经生理盐水冲洗后, 可放在牛奶杯内保存待复位

正确答案:D

20. 患者男性, 41 岁。左上后牙遇冷热痛半年, 但无自发痛, 近 1 月来, 除冷热过敏外隐隐作痛。近 1 周出现自发痛, 阵发加剧, 夜间痛。检查发现左上第二磨牙近中**𪚩**龋深穿髓, 探痛明显, 叩痛(±)。

最佳治疗方法是 ()

- A、活髓切断
- B、直接盖髓
- C、干髓治疗
- D、牙髓摘除术
- E、拔除

正确答案:D

21. **4** 缺失, 正畸后间隙窄, **53** 稳固 ()

- A、复合固定桥
- B、单端固定桥
- C、双端固定桥
- D、半固定桥

E、种植固定桥根据牙列缺损情况选择相应的固定桥类型

正确答案:C

22. 患者，男，32岁，右上后牙持续胀痛不能咬物，无冷热刺激痛病史。检查：右上第二磨牙远中牙龈红肿，探诊出血。第三磨牙伸长无对颌牙。初步诊断为（）

- A、冠周炎
- B、牙间乳头炎
- C、急性牙周脓肿
- D、龈缘炎
- E、𪚩创伤

正确答案:B

23. 以下关于磨耗的描述错误的是（）。

- A、磨耗可分为咀嚼磨耗与非咀嚼磨耗
- B、均匀的磨耗对牙周健康有重要意义
- C、磨耗不会造成食物嵌塞
- D、磨耗能引起颞下颌关节功能紊乱综合征
- E、调𪚩是治疗不均匀磨耗的一种方法

正确答案:C

24. 下列缺失中。哪种宜于设计成混合支持式义齿（余留基牙均健康。第三磨牙均存在）（）

- A. 4567
- B. 7654 | 4567
- C. 87651 | 6
- D. 65 | 7
- E. 6 |

- A、A
- B、B
- C、C
- D、D
- E、E

正确答案:C

25. 女。30岁。因右上后牙食物嵌入痛，遇冷敏感，无自发痛，检查发现 $\overline{77}$ 中龋。需作的窝洞类型是

()

- A、I类
- B、II类
- C、III类
- D、IV类
- E、V类

正确答案:B

二. 参考题库 2(共 25 题)

1. 患者，女，21岁，恒牙 $\overline{77}$ ，磨牙完全II类颌关系，前牙深覆 $\overline{77}$ III°，深覆盖II°。上牙列拥挤I°，

$\overline{77}$ 缺失，上前牙唇倾上颌轻度前突，下颌位置基本正常，牙周情况良好。

拔牙设计 ()

- A、拔除 $\overline{44}$ 和 $\overline{44}$
- B、不拔除
- C、拔除 $\overline{44}$ 和 $\overline{55}$
- D、拔除 $\overline{55}$ 和 $\overline{44}$
- E、拔除 $\overline{44}$

正确答案:E

2. 儿童在几岁时龋病多发于乳磨牙 $\overline{77}$ 面的窝沟 ()

- A、1~2
- B、2~3
- C、3~4
- D、4~5
- E、5~6

正确答案:C

3. 男性。7岁，诉下颌前牙松动。口腔检查见： $\overline{11}$ 松动III°，牙冠有深龋洞。 $\overline{11}$ 已从舌侧萌出。诊断（）

- A、乳牙滞留
- B、乳牙早失
- C、乳牙根尖周炎
- D、乳牙牙周炎
- E、乳牙外伤

正确答案:A

4. 男性，成年人， $\overline{6|67}$ 颊侧龈肿，肿胀突出、半球样，龈充血、表面光亮，自觉搏动痛，扪软而有波动，指压龈向内溢脓，牙松动明显，龈袋超过5mm，无龋，最可能的诊断是（）

- A、龈乳头炎
- B、急性多发性龈脓肿
- C、侵袭性牙周炎
- D、牙周脓肿
- E、慢性牙周炎

正确答案:D

5. 患者，男11岁，左右上下颌第一磨牙呈反 $\overline{9}$ 、 $\overline{3|3}$ 缺失，上颌后缩，下颌前突，前牙反 $\overline{9}$ ，面中

1/3凹陷，下颌可后退至对刃。X线可见， $\overline{3|3}$ 龈下3mm阻生， $\overline{42|24}$ 之间各3mm间隙。

采用方丝弓矫治器，矫治初始弓丝用（）

- A、0.014英寸不锈钢丝
- B、0.016英寸不锈钢丝
- C、0.018英寸不锈钢丝
- D、0.016英寸镍钛丝
- E、镍钛方丝

正确答案:D

6. 患者，女，13岁，前牙反 $\overline{9}$ ，侧面观·面中部凹陷，右侧上下第一磨牙呈I类 $\overline{9}$ 关系，左侧上下

第一磨牙呈III类 $\overline{9}$ 关系 $\overline{2|2}$ 与 $\overline{3+3}$ 之间反 $\overline{9}$ ，上前牙拥挤，四个第三磨牙牙胚不存在，SNA77.0°，SNB80.0°，ANB-3.0°。

对此病人拔牙设计应（）

- A、拔除四个第一前磨牙

B、拔除四个第二前磨牙

C、拔除 $\overline{4|4}$ 和 $\overline{5|5}$

D、拔除 $\overline{5|5}$ 和 $\overline{4|4}$

E、不拔牙

正确答案:E

7. 女性，32岁，近1周来右上后牙持续钝痛、头痛、体温高和全身不适。检查右上牙未见任何牙体疾病，但 $\overline{654|}$ 均有叩痛(+)，温度测验同对照牙，右面颊相应处扪压痛，医师诊断最可能考虑的疾病是()

A、急性牙髓炎

B、慢性牙髓炎

C、急性根尖周炎

D、急性上颌窦炎

E、三叉神经痛

正确答案:D

8. 一患者， $\overline{76}$ 缺失3个月， $\overline{5}$ 残冠，已作根管充填。

如果 $\overline{6}$ 向下伸长，应采取的措施是()

A、增加 $\overline{4}$ 做基牙

B、设计半固定桥

C、减小桥体颊舌径

D、减小桥体厚度

E、调磨 $\overline{6}$

正确答案:E

9. 某患者上下前牙切端垂直向间隙在3~5mm之间，应诊断为()

A、牙列拥挤II度

B、II度深覆 $\overline{牙}$

C、I度深覆盖

D、II度开 $\overline{牙}$

E、III度开_𪗗

正确答案:D

10. 女童，6岁。₆萌出1/3，_E早失，_E银汞充填体完好，做过完善根管治疗。应选择保持器是（）

- A、带环丝圈保持器
- B、全冠丝圈保持器
- C、带环远中导板保持器
- D、全冠远中导板保持器
- E、活动功能式保持器

正确答案:D

11. 男，30岁。₆金属全冠粘固1周后脱落，咬合时常有瞬间性疼痛。口腔检查见患者咬合紧，牙冠短，对_𪗗牙面有银汞合金充填物，脱落的全冠完整。

全冠脱落最可能的原因是（）

- A、牙体预备聚合度过大
- B、修复体不密合
- C、力过大
- D、粘固面积过小
- E、修复体粘结面未清洁干净

正确答案:D

12. 关于口外上颌前方牵引矫治器说法正确的是（）

- A、其口外力可促进上颌发育
- B、对以上颌发育不足为主要特征的安氏III类错_𪗗矫正非常有效
- C、生长发育快速期已过的患者也可应用
- D、最适宜用于生长发育期、安氏III类骨型反_𪗗及上颌发育不足者
- E、其不仅可促进上颌的发育，也可协助固定矫治器前移上牙弓

正确答案:A, B, C, D, E

13. 男，45岁。在某诊所作左下后牙固定修复体3年，近来义齿松动，口臭，左下后牙自发性疼痛，

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/558134055107006136>