

2024 年安徽省凤台县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库带答案下载

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 脑梗死的治疗药物，溶栓治疗

- A: 阿司匹林
- B: 普通肝素
- C: 甘露醇
- D: 阿替普酶

答案：D

2. 尽可能避免使用小数，是指

- A: 修订医嘱及时沟通
- B: 实现个体化治疗
- C: 医嘱清楚准确
- D: 医嘱完整不漏项

答案：C

3. 老年人服用可能出现锥体外系反应的药物是

- A: 苯二氮䓬类药
- B: 哌替啶
- C: 甲氧氯普胺
- D: 双嘧达莫

答案：C

4. 可造成肝脏损害，形成肝硬化或脂肪肝，减弱对药物的代谢速度的是

- A: 茶叶中的鞣酸
- B: 食盐中的氯化钠
- C: 食醋中的醋酸
- D: 酒中的乙醇

答案：D

5. 服用时应多饮水，同时应碱化尿液以防止尿酸结石形成的药物是

- A: 苯溴马隆
- B: 氨茶碱
- C: 氨苄西林
- D: 阿仑膦酸钠

答案：A

6. “每日 3 次”的外文缩写是

- A: tid
- B: hs
- C: NS
- D: po

答案：A

7. 临床给药可根据药物半衰期确定给药间隔时间和给药途径，半衰期 12h 的药物通常选择()

- A: 每日给药 1 次
- B: 静脉滴注给药
- C: 2~3 个半衰期给药 1 次
- D: 每个半衰期给药 1 次

答案：D

8. (2019 年真题) 对乙酰氨基酚的妊娠毒性分级是

A: C 级

B: B 级

C: A 级

D: X 级

答案：B

9. 欲了解更多的药品不良反应信息，可优先查阅的文献是

A: 《中华人民共和国药典》

B: 《中国国家处方集》

C: 《梅氏药物副作用》

D: 《新编药理学》

答案：C

10. 尿隐血检查阳性的病人中，最可能导致尿血红蛋白阳性的药物是

A: 阿司匹林

B: 酒精中毒

C: 巴比妥类

D: 海洛因

答案：A

11. 可用于香豆素类杀鼠药中毒药物是

A: 乙酰胺

B: 碘解磷定

C: 维生素 K1

D: 亚硝酸钠

答案：C

12. (2021 年真题) 静脉滴速过快，易致红人综合征的药物是 ()

- A: 头孢哌酮
- B: 美罗培南
- C: 万古霉素
- D: 克拉霉素

答案：C

13. (2017 年真题) 下列关于烫伤救治措施的说送正确的是 ()

- A: 可用清洁塑料薄膜覆盖创面,以防创面感染
- B: 烫伤患者的镇痛镇静药物首选氯丙嗪
- C: 创面及时外涂甲紫溶液预防感染
- D: I 度烫伤可冷敷后外涂烧伤膏

答案：D

14. 接种乙型肝炎疫苗后，血清免疫学检查可呈阳性反应的指标是：

- A: 乙型肝炎病毒 e 抗原
- B: 乙型肝炎病毒表面抗体
- C: 乙型肝炎病毒表面抗原
- D: 乙型肝炎病毒 e 抗体

答案：B

15. 以下有关肌酸激酶检查值升高的临床意义中，最正确的是

- A: 诊断急慢性白血病
- B: 诊断痛风
- C: 诊断心肌梗死
- D: 诊断恶性贫血

答案：C

16. 能刺激骨骼、肌肉和组织的生长发育的是

- A: 利尿剂
- B: 肽激素类
- C: 蛋白同化制剂
- D: 麻醉药品

答案：B

17. 药名容易混淆的药物识别,安定 / 地西洋

- A: 抗焦虑药
- B: 抗高血压药
- C: 退热药
- D: 抗心绞痛药

答案：A

18. (常用的特殊解毒剂的适应证), 对乙酰氨基酚过量的特殊解毒剂

- A: 二巯丁二钠
- B: 谷胱甘肽
- C: 乙酰半胱氨酸
- D: 纳洛酮

答案：C

19. 某女性, 32 岁, 2 天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛, 伴腰痛。查体: T38℃, 肾区叩击痛, 血分析见 WBC $15 \times 10^9/L$, 中性粒细胞百分比 85%, 尿分析见尿液浑浊, 尿蛋白阳性, 镜检白细胞满视野。

- A: 急性肾小球肾炎
- B: 急性肾盂肾炎

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 慢性肾盂肾炎

D: 急性膀胱炎

答案：B

20. (2017 年真题) 下列关于口服阿仑膦酸钠使用注意事项的说法, 错误的是 ()

A: 随餐服用, 并大量饮水, 可增加吸收、减少胃肠道刺激

B: 应避免同时使用两种双膦酸盐

C: 食管炎为典型不良反应

D: 口服后 30 分钟内应保持立位或坐位

答案：A

21. 治疗皮肤疾病适宜选择

A: 栓剂

B: 注射剂

C: 软膏剂

D: 片剂

答案：C

22. 体操运动员使用后, 可减慢心率、减少心肌耗氧量, 消除比赛前紧张心理, 因此被列入兴奋剂管理的药物是

A: 利血平

B: 阿替洛尔

C: 依那普利

D: 氢氯噻嗪

答案：B

23. 药名词干为 "-cillin" 的药品是

A: #NAME?

B: #NAME?

C: #NAME?

D: #NAME?

答案：D

24. 氨苄西林可能引起

A: 尿血红蛋白

B: 尿酮体

C: 尿沉渣结晶

D: 尿肌酐

答案：C

25. 试验样本数常见病不少于 2000 例的评价阶段是

A: IV 期临床试验

B: I 期临床试验

C: III 期临床试验

D: II 期临床试验

答案：A

26. 便秘患者长期使用可引起结肠黑变病的药物是

A: 多库酯

B: 硫酸镁

C: 聚乙二醇 4000

D: 番泻叶

答案：D

27. 脂溶性维生素 A 宜餐后服用的原理是

- A: 延长在胃肠道滞留时间
- B: 利用油脂增加其溶解
- C: 减少被胃酸破坏
- D: 餐后胃酸分泌增多有利于吸收

答案：B

28. 患者,女,62岁,2型糖尿病伴下肢浮肿、活动后呼吸困难,不宜选用的药物是()

- A: 格列齐特
- B: 吡格列酮
- C: 二甲双胍
- D: 阿卡波糖

答案：B

29. 下列药物中,具有肝药酶诱导作用的是

- A: 利福平
- B: 咪康唑
- C: 异烟肼
- D: 克林霉素

答案：A

30. 正常成人血清尿素氮(BUN)的正常参考区间为():

- A: 3.2~7.1mmol/L
- B: 1.8~6.5mmol/L
- C: 3.8~6.1mmol/L
- D: 2.2~5.1mmol/L

答案：A

31. 慢性汞中毒患者的首发症状是（）

- A: 神经衰弱
- B: 口腔炎
- C: 剥脱性皮炎
- D: 易兴奋症

答案：A

32. （2018 年真题）患者，女，30 岁，妊娠 7 个月，既往有磺胺药过敏史。近日双眼沙眼症状加剧，发痒、分泌物多，有烧灼感。去年曾用酞丁安滴眼液治疗相似症状，疗效较好，今天到药店想再次购买该药。药师给予的用药建议是（）

- A: 硫酸锌滴眼液
- B: 利巴韦林滴眼液
- C: 磺胺醋酰钠滴眼液
- D: 酞丁安滴眼液

答案：A

33. 摄入过多可导致甲状腺功能亢进症的药物是

- A: 碳酸锂
- B: 丙硫氧嘧啶
- C: 甲巯咪唑
- D: 胺碘酮

答案：D

34. 属于 5-HT_{1A} 受体部分激动剂的是

- A: 舍曲林
- B: 阿米替林
- C: 丁螺环酮

D: 艾司唑仑

答案: C

35. 下列具有肝药酶抑制作用的药物中，所诱导的酶系类型最多的是

A: 胺碘酮

B: 异烟肼

C: 利福平

D: 咪康唑

答案: A

36. 合并闭角型青光眼的前列腺增生患者不宜选用的药物是()

A: 多沙唑嗪

B: 非那雄胺

C: 坦索罗辛

D: 托特罗定

答案: D

37. 药师应具备的素质中，贯穿于药学服务全过程的是()。

A: 高尚的职业道德

B: 药历制订、修改

C: 良好的教育背景

D: 交流沟通能力

答案: B

38. 女性红细胞沉降率的正常范围值

A: 0~10mm/h

B: 0~5mm/h

C: 0~15mm/h

D: 0~20mm/h

答案: D

39. 患者用药咨询的内容是

A: 新药信息

B: 自我保健

C: 治疗药物监测

D: 首次剂量、维持剂量以及每日用药次数、间隔与疗效

答案: D

40. 脂溶性最低，作用慢而长的是

A: 巴比妥

B: 戊巴比妥

C: 硫喷妥

D: 苯巴比妥

答案: A

41. 属于促动力药的是 ()

A: 埃索美拉唑

B: 法莫替丁

C: 铝碳酸镁

D: 多潘立酮

答案: D

42. 治疗口腔溃疡时，取少量吹敷于患处，一日用 2~3 次的药物是 ()

A: 西地碘含片

B: 冰硼咽喉散

C: 甲硝唑口腔粘贴片

D: 地塞米松粘贴片

答案: B

43. 拉米夫定的适应证是

A: 乙型病毒性肝炎

B: 带状疱疹

C: 足癣

D: 流感

答案: A

44. 奎尼丁与地高辛合用可导致

A: 奎尼丁中毒

B: 尖端扭转型室性心动过速

C: 明显的心动过缓

D: 地高辛中毒

答案: D

45. 治疗发热成人服对乙酰氨基酚，每隔 4~6 小时重复用药 1 次；1 日用量不得超过

A: 3.0g

B: 2.5g

C: 4.5g

D: 2.0g

答案: D

46. 原发性高血压临床表现中错误的是

A: 可出现靶器官损害的临床表现

B: 绝大多数原发性高血压属于缓进型

C: 诊断标准是血压高于 140/90mmHg

D: 初期即有明显症状

答案：D

47. 患者，女，55 岁，化验结果：TC4.0mmol/L（参考值参 < 5.2mmol/L），TG8.1mmol/L（参考值 0.56~1.70mmol/L），应首选的调脂药物为

A: 氟伐他汀

B: 依折麦布

C: 苯扎贝特

D: 烟酸

答案：C

48. 通过拮抗 α 受体而用于前列腺增生症治疗的药物是

A: 特拉唑嗪

B: 非那雄胺

C: 前列康

D: 黄酮哌酯

答案：A

49. 用药方法

A: 中午忘吃药了怎么办

B: 这次拿的“×××”（商品名）是我以前一直服用的“格列齐特”吗

C: 这药能治我这种病吗

D: 这种药能报销吗

答案：A

50. 单核细胞正常参考区间是

A: 0.03~0.08

B: 0.005~0.05

C: 0~0.01

D: 0.20~0.40

答案：A

51. 患者，男，35岁，髋关节置换术后7天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

A: 病理性骨折

B: 肺动脉栓塞

C: 下肢动脉栓塞

D: 下肢深静脉血栓形成

答案：D

52. (2015年真题) 下列关于甲状腺功能减退患者激素替代治疗的说法，错误的是()。

A: 左甲状腺素应于早餐前半小时空腹服用

B: 服用过量可能出现甲状腺功能亢进症状

C: 妊娠期父母必须联合使用丙硫氧嘧啶

D: 需要终身服药

答案：C

53. (2021年真题) 患者，男，69岁，BMI27.8kg/m²，既往有骨性关节炎病史。近期爬山后，再次出现膝关节疼痛，患者热敷后疼痛未缓解，前来咨询如何选用“止痛药”。

A: 口干

B: 便秘

C: 共济失调

D: 肾损害

答案：D

54. 清晨始升高，午后达高峰，凌晨跌低谷，是指

A: 肝脏合成胆固醇的规律

B: 糖皮质激素的分泌规律

C: 胰岛 B 细胞的分泌规律

D: 胃酸的分泌规律

答案：C

55. 可引起血红蛋白减少的疾病为

A: 肾移植术后发生排斥反应

B: 糖尿病

C: 胃溃疡

D: 过敏性疾病如支气管哮喘、荨麻疹等

答案：C

56. 处方中外文缩写 OS 代表()

A: 左耳

B: 左眼

C: 右耳

D: 双眼

答案：B

57. 下列应用强心苷类药物治疗心力衰竭患者心律失常的描述，哪一项是错误的

A: 可使心房扑动转为心房纤颤

B: 用于治疗心房扑动

C: 用于治疗心房纤颤

D: 用于治疗阵发性室上性心动过速

答案: D

58. 治疗大肠埃希菌所致的尿路感染，不宜选用的抗菌药物是

A: 阿奇霉素

B: 左氧氟沙星

C: 头孢呋辛

D: 阿莫西林

答案: A

59. 非甾体抗炎药的不良反应,引起荨麻疹、瘙痒、剥脱性皮炎等皮肤损害

A: 布洛芬

B: 美洛昔康

C: 保泰松

D: 塞来昔布

答案: B

60. 应在睡前服用，疗效较好的是

A: 硫酸镁

B: 噻氯匹定

C: 维生素 B1

D: 沙丁醇胺

答案: D

61. 误服药物、服药过量以及滥用药物均可引起药物中毒。常见的致中毒药物包括西药、中药和农药。随着化学制药工业的不断发展，如果管理和解救措施跟不上，药物中毒的危害即将越来越严重。

- A: 早期、足量、联合给药
- B: 早期、足量、单次给药
- C: 早期、足量、重复给药
- D: 早期、适量、联合给药

答案：C

62. 下列药物中，适宜在餐前服用的是

- A: 莫沙必利片
- B: 西咪替丁片
- C: 双氯芬酸钠片
- D: 伊马替尼片

答案：A

63. 患者，男，69岁，BMI27.8kg/m²，既往有骨性关节炎病史。近期爬山后，再次出现膝关节疼痛，患者热敷后疼痛未缓解，前来咨询如何选用“止痛药”。

- A: 疼痛加重时，可将止痛药嚼碎服用
- B: 应适当减轻体重
- C: 注意关节保暖
- D: 遵医嘱，不得自行增加剂量

答案：A

64. 患者，男，48岁，近日自感头晕、头痛、眼花、耳鸣、心悸、失眠、乏力等症状，就诊后测定血压160/100mmHg。

- A: 二重感染

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 心律失常

C: 水电解质失衡

D: 刺激性干咳

答案：D

65. 剂量过大，疗程过长，滴注速度过快，用药途径错误，重复用药等归属

A: 药理作用

B: 药动学相互作用

C: 药物的使用

D: 药物制剂因素

答案：C

66. 对肠道寄生虫具有神经肌肉阻滞作用，蛔虫产生痉挛性麻痹作用的是

A: 枸橼酸哌嗪

B: 甲苯咪唑

C: 噻嘧啶

D: 阿苯达唑

答案：C

67. (2018 年真题) 患者,男,65 岁,临床诊断:2 型糖尿病、周围神经病变、冠心病。

A: 选用美托洛尔缓释片不合理

B: 单硝酸异山梨酯缓释片用量不合理

C: 选用阿卡波糖片不合理

D: 瑞格列奈片用量不合理

答案：B

68. 被认为是动脉粥样硬化的主要致病因子的是

- A: 极高密度脂蛋白胆固醇
- B: 三酰甘油酯
- C: 总胆固醇
- D: 低密度脂蛋白胆固醇

答案：D

69. 女性，32岁，3年来月经量多，乏力、心悸。检查面色较苍白。血红蛋白 80g/L，呈小细胞低色素性贫血，白细胞 $7 \times 10^9/L$

- A: 钙剂可促进铁剂吸收
- B: 碳酸氢钠抑制铁剂吸收
- C: 正常人维持体内铁平衡需要每天从食物摄铁 2~2.5mg
- D: 尽量空腹服用亚铁盐，以促进吸收

答案：B

70. 对混合型血脂异常，必须联用他汀类和贝特类，最佳的给药方案是

- A: 早晨用贝特类，晚上用他汀类
- B: 早晨用他汀类，晚上用贝特类
- C: 晚上联合服用他汀类和贝特类
- D: 早晚联合服用他汀类和贝特类

答案：A

71. (2017年真题) 药师在审核处方时，无需要求确认或重新开处方的情形是 ()

- A: 将酚麻美敏胶囊和板蓝根颗粒开在同一张处方上
- B: 诊断为麻疹，使用阿莫西林抗感染治疗
- C: 头孢曲松钠选用复方氯化钠注射液作溶媒

D: 给糖尿病患者同时开具消渴丸和格列本脲

答案：A

72. 静脉滴注碳酸氢钠注射液用于

A: 有机氟中毒

B: 阿片中毒

C: 阿米替林中毒

D: 巴比妥类中毒

答案：D

73. (引起药源性肾病的药物) 大剂量或连续使用顺铂可导致

A: 肾小管阻塞

B: 肾间质纤维化

C: 直接肾毒性

D: 不可逆性肾小管坏死

答案：D

74. 抑制细菌叶酸合成的药物是

A: 利福喷汀

B: 磺胺嘧啶

C: 头孢哌酮

D: 头孢米诺

答案：B

75. 关于口腔溃疡药物治疗的说法, 错误的是 ()

A: 西地碘含片, 一次 6mg 一日 4 次含服

B: 氯己定如含漱液, 每次 15-20ml, 一日 2~3 次含漱

C: 复方甘菊利多卡因凝胶局部涂敷, 一日 3 次, 稍加按摩。

D: 补充复合维生素 B 和维生素 C 有利于促进溃疡面愈合

答案：A

76. 患者，男，48 岁，患有青光眼 3 年。今日因支气管哮喘急性发作，给予舒张支气管、抗炎等治疗，应告知该患者用药后需漱口的药物是
()

- A: 多索茶碱注射液
- B: 沙丁胺醇气雾剂
- C: 布地奈德混悬液
- D: 孟鲁斯特纳咀嚼片

答案：C

77. 中度支气管哮喘疾病的临床表现为

- A: 不能讲话，嗜睡、意识模糊，胸腹矛盾运动等，喘鸣音减低或消失
- B: 稍事活动感气短，可有焦虑，呼吸频率增加，可有三凹征，闻及响亮、弥漫的哮鸣音，心率增快，可出现奇脉
- C: 休息时感气短，端坐呼吸，只能发单字表达，常有焦虑和烦躁，大汗淋漓，呼吸频率 >30 次 / 分，可有三凹征，闻及响亮、弥漫的哮鸣音，心率增快常 >120 次 / 分，奇脉， PaO_2
- D: 步行或上楼时气短，可有焦虑，呼吸频率轻度增加，闻及散在哮鸣音，肺通气功能和血气检查正常

答案：B

78. 慢性沙眼患者禁用的药品是

- A: 利福平滴眼剂
- B: 硫酸锌滴眼剂
- C: 酞丁安滴眼剂
- D: 醋酸可的松滴眼剂

答案：D

79. (2019 年真题) 患者，男，78 岁，因心房颤动服用华法林治疗 2 年余。后因真菌感染使用氟康唑，用药后 INR 升高并出现咳血症状。出现该症状的主要原因是

- A: 氟康唑抑制华法林的肾脏排泄，导致华法林血药浓度升高
- B: 氟康唑可增加华法林的吸收，导致华法林血药浓度升高
- C: 氟康唑具有较强的血浆蛋白结合力，导致血中游离的华法林浓度升高
- D: 氟康唑可抑制 CYP2C9，导致华法林血药浓度升高

答案：D

80. (2016 年真题) 应在餐前服用的药物是 ()。

- A: 胶体果胶铋胶囊
- B: 呋塞米片
- C: 氨茶碱片
- D: 吡罗昔康片

答案：A

81. 属于胃黏膜保护剂的是

- A: 替普瑞酮
- B: 哌仑西平
- C: 三硅酸镁
- D: 奥美拉唑

答案：A

82. 孕妇服用过量可诱发新生儿产生坏血病的药品是

- A: 维生素 A 片

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 维生素 AD 复方制剂

C: 维生素 C 片

D: 复合维生素 B 片

答案：C

83. 轻症、慢性疾病治疗时，因用药持久，适宜选用

A: 栓剂

B: 注射剂

C: 软膏剂

D: 片剂

答案：D

84. 用于治疗溃疡性结肠炎，应多饮水，保持高尿流量，以防结晶尿的发生，必要时服用碳酸氢钠碱化尿液的药物是

A: 格列吡嗪

B: 阿卡波糖

C: 二甲双胍

D: 西格列汀

答案：A

85. (2019 年真题) 餐后服用可以增加吸收的药物是

A: 维生素 B2 片

B: 左甲状腺素钠片

C: 头孢拉定胶囊

D: 磷酸铝凝胶

答案：A

86. 一般由葡萄糖与脂肪提供 NPC 的比例是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: NPC5: 5

B: 100kcal:1gN

C: NPC7:3

D: 150kcal:1gN

答案: C

87. 隔日一次的外文缩写

A: tid

B: qn

C: qod

D: q4h

答案: C

88. 可待因属于兴奋剂中的

A: β 受体阻断剂

B: 麻醉药品

C: 利尿剂

D: 精神刺激剂

答案: B

89. 患者，男，45岁，临床诊断肝内胆管梗阻。下列指标最可能出现的是

A: 肌酸激酶降低

B: γ -谷氨酰转移酶升高

C: 血肌酐降低

D: 白蛋白升高

答案: B

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/565042233123012033>