

2024 福建省《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题王牌题库（培优 B 卷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 利尿降压药的常见不良反应是

- A: 首剂现象
- B: 水、电解质紊乱
- C: 咳嗽
- D: 体位性低血压

答案：B

2. 公众用药咨询的内容是

- A: 抗菌药物的合理使用
- B: 减肥、补钙、补充营养素
- C: 栓剂、气雾剂等外用剂型的正确使用方法
- D: 不宜选用氯化钠注射液溶解的药品

答案：B

3. 粪外观所对应的疾病,阻塞性黄疸

- A: 柏油便, 黑色有光泽
- B: 米泔水样
- C: 白陶土便
- D: 暗红果酱色

答案：C

4. 绝经激素治疗(MHT)应禁用的人群是

- A: 合并高胆固醇血症的患者
- B: 甲状腺切除术后的患者
- C: 合并轻度高血压的患者
- D: 6 个月内有静脉血栓栓塞性疾病史的患者

答案：D

5. (2016 年真题) 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药品对胎儿的危害，将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别。

- A: C 级
- B: D 级
- C: A 级
- D: B 级

答案：D

6. 振奋精神增加供氧能力的兴奋剂是

- A: 阿托品
- B: 苯丙胺
- C: 甲睾酮
- D: 呋塞米

答案：B

7. 用于紧急避孕的药物是

- A: 左炔诺孕酮
- B: X 睾酮
- C: 黄体酮
- D: 罗格列酮

答案：A

8. 须在凉暗处保存的常用药品是

- A: 硫酸阿托品
- B: 复方甘草合剂
- C: 双歧三联活菌制剂
- D: 多巴胺

答案：B

9. 一般来讲，细菌药敏试验的报告不包括

- A: 药敏试验（细菌名称、药物通用名、试验方法以及敏感结果判定）
- B: 临床治疗方案
- C: 涂片、培养鉴定
- D: 临床信息（送检科室、临床诊断、标本类型等）

答案：B

10. 患者，女，51 岁，体检时发现血压 160 / 105mmHg，糖耐量试验餐后 2 小时血糖为 9.56mmol / L（正常参考范围 <7.8mmol / L），三酰甘油 1.52mmol / L（正常参考范围 0.56~1.70mmol / L），总胆固醇 6.26mmol / L（正常参考范围 <5.2mmol / L），低密度脂蛋白胆固醇 4.85mmol / L（正常参考范围 2.1~3.1mmol / L），高密度脂蛋白胆固醇 1.20mmol / L（正常参考范围 1.20~1.65mmol / L），血肌酐 50 μmol / L（正常参考范围 45~84 μmol / L），蛋白尿（++）。临床诊断为高血压病、高脂血症、糖耐量异常。

- A: 阿托伐他汀
- B: 依折麦布
- C: 非诺贝特
- D: 普罗布考

答案：A

11. 具有耳毒性、肾毒性的抗结核药是

- A: 乙胺丁醇
- B: 链霉素
- C: 利福平
- D: 异烟肼

答案：B

12. 使肿瘤所在局部药物浓度达到相当高的水平而全身药物浓度很低。

- A: 膀胱灌注
- B: 动脉注射
- C: 腔内注射
- D: 腹腔注射

答案：D

13. 以"保证贮存和发出的药品质量合格"为职责的技能是

- A: 自主学习能力
- B: 药品管理技能
- C: 调剂技能
- D: 沟通技能

答案：B

14. 给予(透析患者)维生素 B、维生素 C 的依据是

- A: 腹膜透析容易丢失水溶性维生素
- B: 透析患者会出现骨和关节疼痛或头痛
- C: 肾脏功能发生衰竭时缺乏活性形式的维生素 D
- D: 有助于机体合成红细胞

答案：A

15. 以下用于治疗寻常型痤疮的药物中，属于非处方药的是

- A: 维胺酯
- B: 异维 A 酸
- C: 过氧苯甲酰
- D: 阿达帕林

答案：C

16. 《2013 版中国居民膳食营养素参考摄入量》建议，成人推荐维生素 D 摄入量为

- A: 8001200IU (20~30 μg) / d
- B: 2000~4000IU (50~100 μg) / d
- C: 600IU (15 μg) / d
- D: 400IU (10 μg) / d

答案：D

17. 抗类风湿关节炎药物中，服用 4~8 周后起效的是

- A: 来氟米特
- B: 柳氮磺吡啶
- C: 青霉胺
- D: 氯喹

答案：B

18. (2016 年真题) 患者，男，60 岁，呈典型的“面具脸”，“慌张步态”及“小字症”表现，确诊为帕金森病，患者同时患有闭角型青光眼，不宜选用的治疗帕金森病的药物是 ()。

- A: 多奈哌齐
- B: 普拉克索

C: 司来吉兰

D: 左旋多巴

答案: D

19. 饮酒过多也可能致命，导致儿童丧生的纯乙醇致死量是（）

A: 20ml

B: 25ml

C: 15ml

D: 10ml

答案: B

20. 下列处方中常见的外文缩写，其含义是"每晚用药"的是

A: qn

B: qd

C: qs

D: qh

答案: A

21. 患者，男 64 岁，身高 174cm，体重 92KG，既往有高血压、高脂血症及心肌梗死病史，近日因反复胸闷就诊，特拉唑嗪片、氨氯地平片、阿司匹林肠溶片、曲美他嗪片、单硝酸异山梨酯注射液进行治疗

A: 特拉唑嗪片、氨氯地平片、阿司匹林肠溶片

B: 特拉唑嗪片、辛伐他丁、阿司匹林肠溶片

C: 特拉唑嗪片、氨氯地平片、单硝酸异山梨酯注射液

D: 特拉唑嗪片、氨氯地平片、辛伐他丁

答案: C

22. 具有解热镇痛抗炎作用，镇痛作用较强、对胃肠道刺激性小的是

- A: 贝诺酯
- B: 布洛芬
- C: 阿司匹林
- D: 吲哚美辛

答案：B

23. 十分常见，多从婴儿时期起发病，可持续终生

- A: 冷性荨麻疹
- B: 幼小荨麻疹
- C: 人工荨麻疹
- D: 热性荨麻疹

答案：A

24. (用药导致的血常规异常) 硝酸甘油

- A: 血红蛋白量增多
- B: 血小板减少
- C: 嗜酸性粒细胞减少
- D: 中性粒细胞减少

答案：A

25. 可引起头晕、失眠、抑郁、幻觉、心动过缓、低血压，严重者可诱发支气管哮喘的兴奋剂是

- A: 人生长激素
- B: B 受体阻断剂
- C: 蛋白同化激素
- D: 精神刺激剂

答案：B

26. 中成药血脂康中含有的化学药物成分是

- A: 洛伐他汀
- B: 辛伐他汀
- C: 依折麦布
- D: 阿托伐他汀钙

答案：A

27. 吸附力强、可阻止毒物吸收，但是对氰化物无效的洗胃液是

- A: 1%硫酸镁溶液
- B: 牛奶-水混合液
- C: 鸡蛋白
- D: 药用炭混悬液

答案：D

28. 可提示完全梗阻性黄疸的是

- A: $34.2 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$
- B: $>342 \mu\text{mol/L}$
- C: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$
- D: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 34.2 \mu\text{mol/L}$

答案：B

29. 可引起“双硫仑样反应”，给药期间、给药结束 1 周内应禁止饮酒的是

- A: 莫西沙星
- B: 阿奇霉素
- C: 阿米卡星
- D: 头孢哌酮

答案：D

30. 最有可能确认患者用药伤害事件的方法是

- A: 岗位工作问责
- B: 直接观察
- C: 计算机检测方法
- D: 病历审查

答案: D

31. 贫血患者常出现()

- A: 血红蛋白减少
- B: 血小板计数增多
- C: 中性粒细胞增多
- D: 嗜酸性粒细胞增多

答案: A

32. 患者男性，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

- A: 肝素
- B: 华法林
- C: 利伐沙班
- D: 氯吡格雷

答案: D

33. 对于绝经综合征患者，可根据患者的病情或用药需求，采用不同的药物制剂或给药方式进行绝经激素治疗（MHT）

- A: 雌二醇一屈螺酮片
- B: 雌二醇 / 雌二醇-地屈孕酮片
- C: 17 β 一雌二醇

D: 戊酸雌二醇 / 雌二醇-醋酸环丙孕酮片

答案：C

34. 处方中“餐前给药”的外文缩写是

A: qn

B: pc

C: Ac

D: po

答案：C

35. 三叉神经痛，应选的药物是

A: 羟考酮缓释片

B: 卡马西平片

C: 芬太尼透皮贴剂

D: 对乙酰氨基酚片

答案：B

36. 减少因人员不足、忙乱无序而带来的调配差错，是针对

A: 配备足够的人力

B: 环境整齐、安静

C: 规范操作、坚持核对

D: 及时沟通

答案：A

37. 可用于治疗沙眼的处方药是

A: 红霉素眼膏

B: 磺胺醋酰钠

C: 硫酸锌

D: 酞丁安滴眼剂

答案：B

38. 吩噻嗪类抗精神病药中毒出现

A: 明显的锥体外系症状

B: 心血管毒性

C: 谵妄、躁狂、幻觉

D: 肌肉震颤、抽搐

答案：A

39. 患者，女，27 岁，2 年前开始出现多汗、多食，近期因消瘦、心悸就诊。查体：甲状腺肿大，根据血 T₃、T₄ 及 TSH 检查结果，诊断为甲亢。目前该患者正处于哺乳期。

A: 粒细胞减少

B: 肝功能损害

C: 头痛

D: 皮疹

答案：A

40. 药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素、药物因素。

A: 月经期服用常规剂量的避孕药和地西泮，药理效应增强

B: 慢乙酰化者服异烟肼半衰期延长至 2~4.5 小时

C: 肝硬化患者应用利多卡因，可引起严重的中枢神经系统疾病

D: 假胆碱酯酶遗传性缺陷者应用琥珀胆碱出现呼吸暂停

答案：C

41. 下尿路感染的最突出表现是（）

- A: 肾区叩击痛
- B: 膀胱刺激征
- C: 发热
- D: 伴明显腰痛

答案：B

42. 钙制剂+维生素 D+双膦酸盐用于治疗

- A: 老年性骨质疏松症
- B: 抗癫痫药所致的骨质疏松症
- C: 原发性骨质疏松症
- D: 妇女绝经后骨质疏松症

答案：A

43. 解救经口急性铅中毒的洗胃液是

- A: 1%氯化钠
- B: 1%硫酸镁
- C: 3%过氧化氢
- D: 1%硫酸铜

答案：B

44. 抗蠕虫药不宜长时间应用，如果长时间应用将

- A: 影响糖代谢
- B: 影响糖吸收
- C: 影响脂肪代谢
- D: 影响蛋白代谢

答案：A

45. 治疗胃病的药物

- A: 甘草合剂
- B: 胃黏膜保护剂
- C: 硝酸甘油
- D: 去氨加压素

答案：B

46. 患者,男,64 岁,为缓解剧烈癌痛,同时使用 5 片芬太尼透皮贴剂后,出现呼吸抑制,可选用的解救药物是()

- A: 纳洛酮
- B: 二巯丙醇
- C: 氟马西尼
- D: 亚甲蓝

答案：A

47. 由国家药典委员会组织编写的是

- A: 《中国国家处方集》
- B: 《国家基本药物处方集》
- C: 《中国药典临床用药须知》
- D: 《医师案头参考》

答案：C

48. 患者，男性，36 岁，主因“反复上腹部疼痛 3 年，加重伴黑便 2 天”以“胃溃疡”收住入院。患者于入院 3 年前，餐后偶感上腹部隐痛不适，曾在当地医院做胃镜检查示“胃溃疡”。经住院给予对症治疗（具体药物及剂量不详）后症状有所好转。入院前 2 天开始，上述症状发作较为频繁，以胃灼痛为主，多以辛辣刺激及不良饮食为诱因，伴反酸及暖气，并伴有黑便，呈糊状，共排 3 次，每次约 250g 左右，同时伴有恶心。患者自发病以来，无头晕及头痛，有恶心但无呕吐，无胸闷及心慌，无咳嗽及咳痰，无腹泻，体重未见明显增减。查体：T36.2℃、P84 次/分、R20 次/分、BP110/70mmHg，腹平软，未见腹壁静脉显露及胃肠型和蠕动波，中上腹压痛但无反跳痛，肝、脾未扪及，肝、肾区无叩痛，移动性浊音阴性，肠鸣音 3~5 次/分。辅助检查：①便常规：红细胞满视野，隐血阳性；②胃镜检查：胃壁左侧有 1.5cm×2cm 椭圆形溃疡；③尿素酶试验（+）。诊断结论：胃溃疡合并上消化道出血，幽门螺杆菌感染。

A: 优先选择法莫替丁 20mgbid，疗程 8 周

B: 优先选择法莫替丁 20mgqn，疗程 8 周

C: 优先选择艾司奥美拉唑 20mgqd，疗程 6 周

D: 优先选择艾司奥美拉唑 20mgqd，疗程 4 周

答案：D

49. 有强烈的血管收缩作用，输液过程中不慎渗出血管，可致组织坏死的药物是

A: 去乙酰毛花苷

B: 维拉帕米

C: 米力农

D: 多巴胺

答案：D

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

50. 收缩血管平滑肌，引起高血压的药物是

- A: 重组人促红细胞生成素
- B: 伪麻黄碱
- C: 咖啡因
- D: 糖皮质激素

答案：B

51. 容易水解的药物是

- A: 牛痘菌苗
- B: 胃蛋白酶
- C: 阿朴吗啡、水杨酸钠
- D: 青霉素类、头孢菌素类

答案：D

52. 某男性，53 岁，参加婚礼后 5 小时突发左脚第一跖趾关节剧痛，3 小时后局部出现红、肿、热、痛和活动困难。实验室检查示血尿酸为 $500 \mu\text{mol/L}$ ；足部 X 线示非特征性软组织肿胀。

- A: 丙磺舒
- B: 苯溴马隆
- C: 秋水仙碱
- D: 别嘌醇

答案：C

53. 患者，女，56 岁。患直肠癌，其粪外观可呈现

- A: 细条便
- B: 鲜血便
- C: 白陶土样便
- D: 乳凝块便

答案：A

54. 孕妇用药应该格外谨慎，在不同孕期药物对胚胎和胎儿的影响不同，一般情况下，用药后不会出现畸形胎儿的时间是在受精后

- A: 18 天之内

B: 3 个月之后

C: 28 天之内

D: 21 天之内

答案：A

55. 临床用药实践表明，人类正常饮食中的一些品种将影响某些药物的药理作用。酒是人类饮食中对药物疗效影响最大的品种。酒的主要成分为乙醇，饮用后人体先是兴奋，随之其对中枢神经产生抑制作用，并扩张血管，刺激或抑制肝药酶代谢系统；另外，有些药也可延迟酒的代谢和分解。总体上，药与酒的相互作用结果有两个：一是降低药效；二是增加不良反应发生率。

A: 血压升高

B: 嗜睡

C: 出现尿蛋白

D: 痛风急性发作

答案：D

56. （2017 年真题）患者，女，54 岁。诊断为类风湿关节炎 2 年，目前服用甲氨蝶呤（15mgqw）和塞来昔布（200mgqd）。患者因担心药品不良反应用药规律时断时续近日出现腕关节肿胀和疼痛加重晨僵明显加用泼尼松 10mgqd。

A: 早期治疗、遵医嘱规律用药

B: 一旦症状改善，应即刻停药

C: 多晒太阳适量补充钙剂、维生素 D 预防骨质疏松

D: 定期就诊评估病情，调整治疗方案

答案：B

57. 减轻前列腺张力和膀胱出口梗阻

- A: 索利那新
- B: 度他雄胺
- C: 哌唑嗪
- D: 特拉唑嗪

答案：D

58. 具有强大的抗凝血因子 Xa 功能及微弱的抗凝血酶作用，可用于预防深静脉血栓形成的药物是

- A: 那屈肝素钙
- B: 阿加曲班
- C: 氯吡格雷
- D: 阿替普酶

答案：A

59. 氰化氢中毒呈现

- A: 出血、凝血时间延长
- B: 恶心、呕吐、口内有金属味
- C: 抽搐、进行性加重
- D: 呼出气体中可有苦杏仁气味

答案：D

60. 对患者进行用药指导时，应强调不同剂型药物的正确服用方式，否则可导致药效降低或引起不良反应。下列用药指导错误的是

- A: 咽炎患者服用含片，待含片全部融化后，短时间内不宜饮水
- B: 高血压患者服用硝苯地平控释片，待血压控制稳定后，可适当减少给药剂量，将药品均匀掰开分次服用
- C: 胃溃疡患者服用硫糖铝片，最好充分咀嚼后，用少量温水送服
- D: 透皮贴剂不宜贴敷在破损、溃烂、渗出部位，定期更换部位贴用

答案：B

61. 无水乙醇 5ml 加入 10%葡萄糖注射液 100ml 中静滴，用于解救

- A: 氰化氢中毒
- B: 氟乙酰胺中毒
- C: 瘦肉精中毒
- D: 有机磷杀虫药中毒

答案：B

62. 药师在调剂工作中，首先要审核处方的

- A: 用药适宜性
- B: 完整性
- C: 规范性
- D: 合法性

答案：D

63. 若空腹服药，则胃排空快，药物在短时间内进入十二指肠与小肠；餐后服用可延缓胃排空，使药物在胃中较充分地吸收，且能够减少或避免药物对胃粘膜的刺激。因此，一般药品适宜餐后服用。

- A: 餐中服用
- B: 清晨服用
- C: 餐后服用
- D: 餐前服用

答案：D

64. 晚期肝硬化时，哌替啶和普萘洛尔生物利用度增加 2 倍，是指

- A: 药物分布
- B: 药物代谢

C: 药物排泄

D: 药物吸收

答案：D

65. 过敏性鼻炎首选的药物是

A: 麻黄碱

B: 氯雷他定

C: 阿托品

D: 糖皮质激素

答案：B

66. $90\text{g/L} \leq \text{Hb 量} < \text{正常参考范围下限}$ 可诊断为

A: 基本正常

B: 轻度贫血

C: 重度贫血

D: 中度贫血

答案：B

67. 可减弱华法林抗凝作用的药物为

A: 布洛芬

B: 头孢哌酮

C: 阿司匹林

D: 苯巴比妥

答案：D

68. 为保证用药安全，一些药物应用前需要实施皮肤敏感试验。一些权威性较高的二次文献中记载的需进行皮肤敏感试验的药品是

A: 鱼肝油酸钠注射剂

- B: 青霉素钠注射剂
- C: 玻璃酸酶注射剂
- D: 链霉素注射剂

答案：C

69. 阿片类中毒出现呼吸抑制时给予

- A: 有机硫类
- B: 间羟胺
- C: 地西洋
- D: 阿托品

答案：D

70. 《2013 版中国居民膳食营养素参考摄入量》建议，65 岁及以上老年人推荐维生素 D 摄入量为

- A: 2000~4000IU (50~100 μ g) / d
- B: 600IU (15 μ g) / d
- C: 800~1200IU (20~30 μ g) / d
- D: 400IU (10 μ g) / d

答案：B

71. 解救经口急性铅中毒的洗胃液是

- A: 1%硫酸铜
- B: 1%硫酸镁
- C: 3%过氧化氢
- D: 1%氯化钠

答案：B

72. 关于 II 期临床试验的正确说法是

- A: 试验样本数多发病不少于 300 例，其中主要病种不少于 50 例
- B: 试验样本数多发病不少于 500 例，其中主要病种不少于 100 例
- C: 试验样本数多发病不少于 300 例，其中主要病种不少于 200 例
- D: 试验样本数多发病不少于 300 例，其中主要病种不少于 100 例

答案：D

73. 患者用药咨询的内容是

- A: 栓剂、滴眼剂和气雾剂等外用剂型的正确使用方法
- B: 一种药品有多种适应证或用药剂量范围较大
- C: 抗菌药物的合理使用
- D: 减肥、补钙、补充营养素

答案：A

74. 血管紧张素转化酶抑制剂

- A: 雷米普利
- B: 阿米洛利
- C: 阿利吉仑
- D: 依普利酮

答案：A

75. 每日 4 次的缩写为

- A: q4h
- B: iv
- C: qid
- D: pc

答案：C

76. (2017 年真题) 患者女，6 岁，因发热体温 38.6℃、头痛、鼻塞、流涕咳嗽、无痰就诊。实验室检查：白细胞、中性粒细胞计正常。临床诊断为普通感冒。

- A: 葡萄糖酸锌口服液
- B: 维生素 C 片
- C: 头孢克洛干混悬剂
- D: 感冒清热冲剂

答案：C

77. 中度贫血，Hb 为 ()

- A: 小于 60g/L
- B: 60~120g/L
- C: 90~120g/L
- D: 60~90g/L

答案：D

78. IV 期临床试验是在广泛使用条件下，考察药品的疗效和不良反应，试验样本数常见病不少于

- A: 4000 例
- B: 1000 例
- C: 3000 例
- D: 2000 例

答案：D

79. 患者，女，55 岁，因"反复发作胸骨后疼痛 2 年，伴反酸，胃灼热，间断积食"而就诊。食管测压提示食管下括约肌(LES)压力<6mmHg，结合胃镜检查结果，临床诊断为胃食管反流病，医师处方：奥美拉唑肠溶片 20mgbid 强化抑酸治疗。

- A: 控制体重
- B: 餐中多饮水
- C: 避免高脂饮食
- D: 戒烟酒

答案：B

80. 治疗急性腹泻可选用 ()

- A: 阿苯达唑
- B: 双八面体蒙脱石散
- C: 聚乙醇 4000
- D: 莫沙必利

答案：B

81. 下列哪项不属于激素避孕的作用机制

- A: 抑制排卵
- B: 子宫兴奋和宫颈软化
- C: 改变宫颈黏液性状
- D: 改变子宫内膜形态与功能

答案：B

82. 高血压患者的降压目标一般患者高血压 ()

- A: <130 / 80mmHg
- B: <120 / 80mmHg
- C: <150 / 90mmHg
- D: <140 / 90mmHg

答案：D

83. 睡前服用，可使抑制肝脏合成胆固醇效果更好的药品是

- A: 复方铝酸铋片
- B: 二甲双胍片
- C: 甲氧氯普胺片
- D: 瑞舒伐他汀片

答案：D

84. 滥用抗菌药物、糖皮质激素、人血白蛋白、二磷酸果糖及肿瘤辅助治疗药物

- A: 过度治疗用药
- B: 超适应证用药
- C: 有禁忌证用药
- D: 无适应证用药

答案：A

85. 以下治疗哮喘疾患的中成药中，不含有麻黄碱成分的是

- A: 通宣理肺丸
- B: 防风通圣丸
- C: 蛇胆川贝液
- D: 止咳定喘膏

答案：C

86. 提高药效、减少人体吸收的是

- A: 阿苯达唑
- B: 利尿药
- C: 氨基糖苷类
- D: 抗忧郁药

答案：A

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/565132202114012033>