第一章

一、选择题

A 型题

1 •下列哪种不属于细胞适应性改变 E

A .萎缩 B •肥大 C •增生 D •化生 E.变性

2 关于肥大，错误的说法是 B

A .高血压病的左心室 B .脑积水

C •激素的作用前列腺增大 D •健美运动员的骨骼肌

E •一侧肾切除后对侧肾的增大

3 •授乳期的乳腺增大属于 B

A •肥大 B •增生 C •再生 D •化生 E •机化

4 .增生是指 D

A •器官和组织体积缩小 B •器官和组织体积增大

C •一种分化组织转化为另一种相似性质的分化组织

D •由于实质细胞增多而造成器官、组织体积增大

E •器官和组织先天发育异常

5 •关于萎缩的描述，正确的是 A

A •萎缩器官体积缩小或细胞数量减少

B •萎缩的间质增生

C •萎缩器官功能正常

D •萎缩器官实质细胞数目正常

E •萎缩由局部缺血引起

6 •下述哪种情况属于生理性萎缩 D

A •垂体坏死引起的乳腺退缩 B 高血压病引起的肾硬化

C •小儿麻痹引起的下肢萎缩 D •青春期胸腺萎缩

E •动脉粥样硬化引起的脑萎缩

7 .下述哪种情况不属于萎缩的器官 B

A •高血压病的肾 B •肾切除术后，保留的对侧肾

C •慢性肾小球肾炎的肾 D •肾盂积水的肾

E •动脉粥样硬化的肾

8 •萎缩的心肌细胞内常可出现 B

A •疟色素 B •脂褐素 C •黑色素 D •胆红素 E

含铁血黄素

9 •一种分化成熟组织取代另外一种分化成熟组织，称为 D

A •萎缩 B •肥大 C •增生 D •化生 E •变性

10 •结缔组织玻璃样变的错误描述是 C

A • 常见于瘢痕组织

B • 常见于纤维化肾小球

C • 成纤维细胞增多

D • 胶原纤维融合为梁状、带状或片状

E • 常见于粥瘤

11 •血管壁玻璃样变多见于 C

A • 大动脉 B •中型动脉 C.细动脉 D .大静脉 E .小静脉

12 •肉眼观察标本，病理性钙化呈

A • 黑色炭末样 B •蓝色颗粒状 C

C • 灰白色颗粒状 D •棕黄色颗粒状 E •褐色颗粒状

13 •不属于坏死标志的是

A • 核碎裂 B.组织结构崩解 D

C • 核固缩 D.核内出现包涵体 E •核溶解

14 .心肌梗死属于 A

A • 凝固性坏死 B 液化性坏死 C 气性坏疽 D .干性坏疽 E .湿性坏疽

15 .有关干酪样坏死的描述，错误的是 B

A .呈淡黄色，均匀细腻 B .状似纤维蛋白

C .可发生钙化 D .可发生液化 E .常由结核杆菌引起

16 .下列哪种情况属于液化性坏死 B

A •心肌梗死 B •脑梗死 C .肠梗死 D .淋巴结干酪样坏死 E . 足坏疽

17 .下述哪项不符合湿性坏疽的描述 E

A .合并腐败菌感染 B .具有恶臭味

C .常有全身中毒症状 D .坏疽组织呈污秽黑褐色

E •坏死与健康组织之间界限清楚

18 .湿性坏疽常发生在 D

A •脑、脾、肝 B.脑、肠、子宫

C •肺、肠、肝 D •肺、肠、子宫 E 肺、肾、脑

19. 心肌梗死病灶由纤维组织替代属于 C

A •溶解吸收 B •分离排出 C •机化 D .钙化 E •包裹

20 •坏死与坏疽的主要区别是 C

A •动脉阻塞的程度 B •静脉回流的好坏 C •有无腐败菌感染 D •发生部位 E •病 变深度

21 ，病毒性肝炎时，肝细胞嗜酸性小体 E

A •凝固性坏死 B •干酪样坏死 C •液化性坏死 D •湿性坏疽 E •细胞凋亡

22 •肉芽组织的主要成分是 C

A .中性粒细胞 B .淋巴细胞

C •毛细血管和成纤维细胞 D •巨噬细胞

E •异物巨细胞

23 .肝细胞气球样变属于 A

A •细胞水肿 B •脂肪变性

C .玻璃样变性 D .纤维蛋白样坏死 E 淀粉样变性胞

24 .属不可逆性的病变是 C

A .水样变性 B.脂肪变性

C •核碎裂 D •线粒体肿胀

E •内质网扩张

25 .结核病时发生 B

A •凝固性坏死 B.干酪样坏死

G 液化性坏死 D .湿性坏疽

E 脂肪坏死

26 .液化性坏死常见于 A

A •脑和胰腺 B .肝 C.脾 D •肾 E 小肠

27 •由周围健康细胞分裂增生来完成修补的过程，称为 B

A .化生 B 再生 C .增生 D .机化 E .修复

28 .参与瘢痕修复过程最重要的细胞是 E

A .上皮细胞 B.渗出的白细胞

C .单核巨噬细胞的 D •干性坏疽 E 成纤维细胞

第二章

1 .心力衰竭细胞最常见于 B

A .右心衰竭时肺泡腔内 B .左心衰竭时肺泡腔内 C 间质性肺炎的肺泡腔内

D .肝淤血时肝脏内 E 脾淤血时脾脏内

2 .槟榔肝内可见 E

A .肝小叶周边部肝细胞萎缩

B .出血性梗死

C .肝小叶结构破坏

D .门静脉分支扩张淤血

E 肝血窦扩张淤血，肝细胞脂肪变性

3 .微循环血管壁通透性增咼引起的出血是 A

A .漏出性出血 B .破裂性出血 C .渗出性出血 D .内出血 E 外出血

4 .右心衰喝引起淤血的器官主要是 B

A .肺、肝及胃肠道 B 肝、脾及胃肠道 C 肺、脑及胃肠道 D .肾、肺及脑

E .脾、肺及脑

5 .引起肺褐色硬化疾病是 D

A .肺动脉栓塞 B .肺动脉瓣狭窄 C 三尖瓣狭窄 D .二尖瓣狭窄 E 硅沉着病

6 .风湿性心内膜炎瓣膜闭锁缘血栓的主要成分是 A

A .血小板和纤维蛋白 B 红细胞和纤维蛋白 C 纤维细胞和毛细血管 D .血小 板和白细胞 E .血小板和内皮细胞

7 .大手术后卧床患者好发血栓的部位是 A

A .下肢静脉 B .颈静脉

C .冠状动脉 D .门静脉

E .肾动脉

8　　.股静脉内血栓脱落易引起的并发症是　　C

A .下肢坏疽 B .门静脉栓塞

C •肺动脉栓塞 D •肾动脉栓塞 E •脑动脉栓塞

9　　.最常见的栓子来源是 A

A •血栓 B .脂肪

c 空气 D .羊水

E .寄生虫

10 •赘生物是指 E

A •心内膜增生物 B •心瓣膜上的新生物 C •心瓣膜上的附着物 D •心瓣膜结节 性纤维组织增生 E.心瓣膜上的附壁血栓

11　　•肺动脉栓塞不会引起 E

A .碎死 B .肺动脉高压

C •肺梗死 D •右心室扩张 E •间质性肺炎

12　　•潜水员过快地从海底升到水面容易发生　　D

A，肺不张 B •肺气肿 C •空气栓塞 D •氮气栓塞 E， 二氧化碳栓塞

13　　•长骨骨折时可引起的栓塞是 A

A .脂肪栓塞 B .血栓栓塞 C .异物栓塞 D .细菌团栓塞 E .空气栓塞

14　　.易发生贫血性梗死的脏器是

A .脾，心，肾 B .心，脑，肠 C .脾，心，肺 D .肾，肠，脑 E .肾，心， 肺

15　　.肾梗死区的坏死多为 C

A .液化性坏死 B .干酪样坏死 C 凝固性坏死 D .脂肪坏死 E 坏疽

16.门静脉血液回流受阻时，可引起下列哪个脏器淤血　　E

A .脑 B .肝 C .肾 D.肺 E .脾

17　　.急性左心衰竭时常引起 E

A .皮肤黏液性水肿 B 眼睑水肿 C .下肢水肿 D .下肢橡皮肿 E .肺水肿

18　　.在血栓形成中起重要作用的是　　E

A .中性粒细胞 B .红细胞 C .单核细胞 D .淋巴细胞 E .血小板

19　　.肺动脉血栓栓塞的栓子主要来自　　A

A .下肢静脉 B .门静脉

C .上腔静脉 D .头颈静脉 E .胸壁静脉

20.　　左心的附壁血栓脱落后常引起B

A .肺动脉栓塞 B .脑动脉栓塞 C .股静脉栓塞 D .门静脉栓塞 E .肝静脉栓 塞

21　　.下列哪种梗死可发生软化并形成囊腔　　D

A .肺梗死 B .肠梗死

C .脾梗死 D .脑梗死

E .肾梗死

22　　.出血性梗死最常发生在哪一个器官？　　B

A .肾 B .肺

C .脑 D .脾

E .心

23　　.肠扭转可引起肠壁发生 D

A .贫血性梗死 B .干性坏疽 C .气性坏疽 D .出血性梗死 E .液化性坏死

24　.下列哪项不是血栓形成的条件　　E

A .心血管内膜损伤 B 血流缓慢 C .血流形成漩涡 D .血液凝固性增加

E •纤维蛋白溶解酶增加

25 •羊水栓塞的主要病理诊断根据是 A

A .肺小血管和毛细血管内有羊水成分

B .微循环内透明血栓

C .肺广泛出血

D .肺泡腔内有角化上皮、胎粪小体

E 肺内透明膜形成

26 .下列哪个器官的梗死灶为地图形 E

A .小肠 B .脾 C .肾 D .肺 E .心 第二章

1 .关于炎症概念的叙述更准确的是 E

A .致炎因子引起的血管反应

B .组织对损伤的防御反应

C .活体组织对损伤的反应

D .血管对致炎因子所产生的反应

E 具有血管系统的活体组织对损伤的防御反应

2 .最常见的致炎因素是 C

A .化学性因素一‘ B .物理性因素 C .生物性因素 D .免疫性因素 E .营养性 因素

3 .炎症局部组织的基本病变是 A . 红、肿、热、痛和功能障碍 增生 D .变质、渗出和增生 E

D B.组织充血及渗出物形成 组织细胞的变性、坏死 C.组织内炎细胞浸润及

4 .最具防御意义的炎症反应是 D

组织增生 B .动脉充血 C 发热反应 D .吞噬作用 E .液体渗出

5 .以下不具防御作用的反应是

A .纤维蛋白渗出 B .白细胞游出 C .炎性增生 D .红细胞漏出 E .血浆渗出

6 .炎症介质的主要作用是 B

A .实质细胞变性、坏死 B 血管扩张、通透性升高 C .细胞酶活性障碍 D .阳离子浓度降低 E 组织分解代谢增强

7 .急性炎症时最早出现的血管反应是 E

A .细动脉扩张充血 B 细动脉和毛细血管扩张 C .毛细血管扩张 D .细动脉、 细静脉和毛细血管扩张 E .细动脉收缩

8 炎症时组织间隙内积聚的液体称为 A

A .渗出液 B .水肿液 C .分泌液 D .漏出液 E .浆液

9 .白细胞通过血管壁进人到组织间隙的现象称为 A

A .白细胞游出 B.炎性渗出

C .白细胞的趋化现象 D .炎细胞浸润

E .白细胞阿米巴样运动

10 .炎症灶内血液成分渗出应除外 A

A .浆细胞 B .浆液

C .单核细胞 D .淋巴细胞

E 纤维蛋白

11 .炎症液体渗出的主要原因是 D

A .血管内流体静压升高 B 血管内胶体渗透压下降 C .组织净水压升高 D .血 管壁通透性

升高 E.组织胶体渗透压升高

12 •急性炎症最先渗出的白细胞是 B

A .巨噬细胞 B.中性粒细胞

C •淋巴细胞 D •嗜酸粒细胞

E •浆细胞

13 .下列哪项不是中性粒细胞的特性 C

A •在炎症区游走 B •吞噬细菌、组织碎片及抗原抗体复合物 C •转变为浆细胞产生抗体

D .释放致热源

E •释放蛋白溶解酶

14 •炎症灶中巨噬细胞的主要作用 B

A •形成浆细胞 B .吞噬较大的病原体及组织碎片

C •释放血管活性胺 D .释放氧自由基 E，吞噬抗原抗体复合物

15 •慢性炎症病灶内浸润的炎细胞主要是 A

A •单核和淋巴细胞 B.中性粒细胞和浆细胞 C •嗜酸性和嗜碱性粒细胞 D.淋巴和 嗜碱性粒细胞 E.中性粒细胞和嗜酸性粒细胞

16 •变质性炎症其实质细胞的主要变化是 C

A •萎缩和变性 B . 增生和再生 C •变性和坏死 D . 萎缩和坏死 E •变性和增生

17 •假膜性炎症指的是 B

A •浆膜的纤维素性炎 B 黏膜的纤维素性炎 C •浆膜的浆液性炎 D .黏膜的浆 液性炎 E .皮肤的纤维素性炎

18, 假膜性炎的主要渗出物是B

A •浆液 B .纤维素 C 淋巴细胞 D .单核细胞 E，浆细胞

19 •不发生纤维素性渗出的病变为 D

A •大叶性肺炎 B .急性细菌性痢疾

C，风湿性心包炎 D .病毒性脑炎 E，尿素性胸膜炎

20 •假膜性炎发展常引起 E

A •坏死、穿孔 B . 溶解液化形成脓肿

G 炎性肉芽肿 D 机化 E •假膜脱落形成溃疡

21 •溶血性链球菌感染常引起 B

A •脓性卡他性炎 B.蜂窝织炎

C •纤维蛋白性炎 D. 出血性炎 E •脓肿

22 •金黄色葡萄球菌感染常引起 E

A •脓性卡他性炎 B.蜂窝织炎

C •纤维蛋白性炎 D. 出血性炎 E •脓肿

23 •急性炎症时组织肿胀的主要原因是 D

A .动脉痉挛 B.静脉阻塞

C •组织增生 D. 富于蛋白的液体进入组织内

E .肉芽组织形成

24 •炎症局部疼痛的主要原因是 D

A •细胞增生压迫神经末稍 B.静脉阻塞

C，局部充血 D.渗出物压迫及炎症介质作用　　E •组织变性坏死

25　•下列哪项不符合一般急性炎症的特点　　C

A •病程数天至 1 个月 B •血管扩张充血，组织水肿明显　　C 组织增生反应显著

D •中性粒细胞浸润为主 E•变质、渗出较明显

26　•下列哪项不是慢性炎症的特点　　D

A •组织细胞增生明显　　B •病程数月至数年

C.淋巴细胞浸润为主　　D.组织有明显充血水肿　　E.有时形成炎性肉芽肿

第四章

1.肿瘤性增生与机体反应性增生的主要区别为　　A

A •单克隆性增生 B•与周围组织界线不清 C•形成肿块D •细胞生长旺盛

E •不伴有炎症

2　.良、恶性肿瘤的根本区别在于　　D

A .肿瘤的生长部位 B 有无坏死、出血 C 肿瘤的生长方式D .有无转移

E •有无溃疡形成

3　•关于恶性肿瘤细胞，下列哪项说法不对？　　E

A .自主性增生B .分化不成熟

C •具有侵袭破坏能力及转移特性　　D •是由正常细胞转化来的 E•无基因水平的异常

4 •肿瘤的异型性是指 D

A •肿瘤实质与间质之间的差异　　B •癌与肉瘤之间的差异 C•良、恶性肿瘤之间的差异D •肿瘤与起源组织之间的差异　　E •癌与癌前病变之间的差异

5 •肿瘤组织分化程度越低，则　　A

A •异型性越大B •恶性程度越低

C •预后越好D •对放疗越不敏感 E，与起源组织越相似

6 •恶性肿瘤最主要的特征是 C

A •核分裂象常见B •侵袭性生长

C •转移D •常见瘤巨细胞

E .常继发变性、坏死

7 •下列哪项是确定恶性肿瘤的重要依据？　　E

A .肿瘤间质血管丰富 B 瘤细胞大、核大 C 多核D .可见核仁

E •可见病理性核分裂象

8. 肉瘤是指 A

A •间叶组织来源的恶性肿瘤　　B.横纹肌来源的恶性肿瘤 C•平滑肌来源的恶性肿瘤

D •神经组织来源的恶性肿瘤　　E •间叶组织来源的良性肿瘤

9,　　上皮组织来源的恶性肿瘤称为 C

A •恶性上皮瘤 B •类癌 C.癌 D •癌症 E •肉瘤

10 •纤维组织来源的恶性肿瘤应命名为 B

A .恶性纤维瘤 B .纤维肉瘤 C .纤维瘤

D .纤维母细胞瘤 E 纤维组织细胞瘤

11 .下列哪一种不是间叶组织来源的肿瘤？ C

A •血管瘤 B •平滑肌瘤 C •乳头状瘤

D •脂肪瘤 E •纤维瘤

12 .癌与肉瘤的根本区别是 C

A •发病年龄 B •转移途径 C •组织来源 D •生长方式 E •对机体的危害

13 •下列良性肿瘤，哪一种呈侵袭性生长？ E

A •甲状腺腺瘤 B •脂肪瘤 C •平滑肌瘤 D •表皮乳头状瘤 E •血管瘤

14 .原位癌是指 E

A .未发生转移的癌 B 侵袭深度ⅴ5mm 的癌 C .原发部位的癌 D .早期癌

E .未突破基底膜的癌

15 •下列哪种肿瘤细胞呈编织状排列？ B

A •软骨瘤 B •纤维瘤 C •乳头状瘤 D •血管瘤

E •脂肪瘤 C

16 •肿瘤血道转移最常累及的器官是

A •脾和肝 B ， 肝和肾 C 肺和肝 D.肺和脑

E •脑和脾

17 •肿瘤性增生与炎性增生的重要区别是 C

A •细胞增生活跃 B •可见核分裂象 C •自主性增生 D •生长速度快

E •形成肿块

18 •淋巴结转移癌的诊断依据是 C

A •淋巴结的正常结构被破坏 B •淋巴结肿大、变硬 C 淋巴结内形成癌巢 D •淋巴结内出现异型细胞 E 淋巴结切面有坏死

19 •原位癌最常发现的部位是 A

A •食管 B •胃 C 小肠 D •升结肠 E •横结肠

20 •非典型增生是指 E

A •肿瘤的异质性 B •肿瘤的异型性 C •上皮化生 D •失控性增生 E •上皮异 型增生

21 •高分化鳞癌的典型特征是 D

A .有病理性核分裂象 B 癌实质与间质分界清楚 C 有癌巢形成 D .癌巢中出 现角化珠 E •癌巢周边有网状纤维围绕 C

22 .目前诊断肿瘤常用而可靠的方法是

A . X线检查且磁共振检查 C 活体组织检查 D . CF检检

E . B超检查

23 •肿瘤的异质性是指 B

A .不同类型肿瘤之间的差异

B. 不同亚克隆生物学行为的差异

C •不同类型肿瘤细胞形态上的差异

D •肿瘤组织与起源正常组织的差异

E •良性与恶性肿瘤之间的差异

第五章

1.关于风湿病得叙述，下列哪项不正确？ E

A. 病变累及全身结缔组织

B. 发病与变态反应性有关

C •以心脏病变较常见而且严重

D •风湿性心内膜炎引起的慢性心瓣膜病严重影响心脏功能

E .风湿性关节炎常可导致关节畸形

2 .风湿病的基本病变不包括 A

A •钙化 B 纤维素样坏死

C .风湿小体 D 纤维瘢痕形成 E 黏液样变性

3 .风湿病具有病理诊断价值的病变是 C

A .赘生物 B .胶原纤维纤维素样坏死 C 阿少夫小体 D .瓣膜变形

E 胶原纤维豁液样变性

4 ，风湿细胞不具备以下哪项特征？ D

A ，体积大，胞浆丰富 B 胞浆略嗜碱性

C .核呈毛虫状或泉眼状 D .胞浆内可见吞噬的红细胞 E 可为单核或双核

5 .风湿细胞来自 A

A .巨噬细胞 B .平滑肌细胞

C .成纤维细胞 D .心肌细胞

E 淋巴细胞

6 .风湿性心内膜炎病变最常累及 A

A .二尖瓣 B .主动脉瓣

C .三尖瓣 D .肺动脉瓣

E 二尖瓣与主动脉瓣同时受累

7 .风湿性心内膜炎时疣状赘生物最常见的部位是 A

A .二尖瓣的闭锁缘 B 二尖瓣的游离缘 c 三尖瓣的闭锁缘 D.三尖瓣的游离缘

E 腔索

8 .风湿性心肌炎时风湿小体最多见于 C

A .心内膜下方心肌 B .心外膜下方心肌 C .心肌间质血管旁 D .心瓣膜赘生物 内 E .脏层心外膜血管旁

9 ，风湿性心包炎时绒毛心形成与下列哪项因素有关？ D

A .大量浆液渗出且纤维素样坏死

C .大量中性粒细胞渗出 D .大量纤维素渗出 E .大量纤维增生

10 .以下哪项不引起左心室肥大？ B

A .主动脉瓣狭窄 B .二尖瓣狭窄

C .主动脉瓣关闭不全 D .二尖瓣关闭不全 E .二尖瓣狭窄合并关闭不全

11 .与动脉粥样硬化关系最密切的脂蛋白是 B

A . HDL B . LDL C . VLDL E . TG

12 .下列哪项不属于动脉粥样硬化的危险因素？ E

A .吸烟 B .高脂血症 C ，高血压 D .遗传因素 E .风湿性动脉炎

13 .动脉粥样硬化病变不累及 C

A .大脑中动脉 B .冠状动脉 C .肺动脉 D. 下肢动脉 E .肾动脉

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/565334324222011341