

2024 广西壮族自治区玉州区《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库大全含答案【能力提升】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 患者，男，46 岁，因心绞痛伴房颤，给予维拉帕米治疗。维拉帕米的禁忌症是()

- A: 冠心病
- B: 痛风
- C: 心力衰竭
- D: 双侧肾动脉狭窄

答案：C

2. 最常见的急性肾盂肾炎致病菌是

- A: 大肠埃希菌
- B: 葡萄球菌
- C: 粪肠球菌
- D: 变形杆菌

答案：A

3. 苯丙胺中毒出现

- A: 谵妄、躁狂、幻觉
- B: 明显的锥体外系症状
- C: 心血管毒性
- D: 肌肉震颤、抽搐

答案：A

4. 普萘洛尔的别名是

- A: 消心痛
- B: 心得安
- C: 安痛定
- D: 心痛定

答案：B

5. 关于口腔溃疡药物治疗的说法,错误的是 ()

- A: 补充复合维生素 B 和维生素 C 有利于促进溃疡面愈合
- B: 氯己定如含漱液,每次 15-20ml,一日 2~3 次含漱
- C: 西地碘含片,一次 6mg 一日 4 次含服
- D: 复方甘菊利多卡因凝胶局部涂敷,一日 3 次,稍加按摩。

答案：C

6. 患者女,25 岁,两天前淋雨后开始发热,体温 39.0℃,咳嗽,咳铁锈色黏痰,化验结果提示白细胞计数及中性粒细胞比例升高,诊断为肺炎,经验性抗感染治疗时适宜选用的药物 ()

- A: 头孢他啶
- B: 阿奇霉素
- C: 头孢唑林
- D: 阿米卡星

答案：C

7. (2018 年真题) 患者,男,57 岁,化验结果:TC4.6mmol/L (参考值<5.2mmol/L),TG11.0mmol/L (参考值 0.56——1.70mmol/L) 尿酸 508umol/L (参考值<420umol/L),应首选的调脂药物为 ()

- A: 非诺贝特

- B: 依折麦布
- C: 考来烯胺
- D: 烟酸

答案：A

8. 写明稀释比例和使用时间，是指

- A: 医嘱完整不漏项
- B: 实现个体化治疗
- C: 修订医嘱及时沟通
- D: 医嘱清楚准确

答案：A

9. 长期应用需要监测患者的凝血功能和出血风险，必要时应联合维生素 K、维生素 B 治疗的药物是

- A: 头孢哌酮-舒巴坦注射剂
- B: 肝素钠注射剂
- C: 口服避孕药
- D: 阿司匹林肠溶片

答案：A

10. 胰岛素的给药时间适宜餐前 5~10 分钟给药的胰岛素制剂种类是

- A: 门冬胰岛素
- B: 普通胰岛素
- C: 赖脯胰岛素
- D: 精蛋白锌胰岛素

答案：A

11. 患者，男，38 岁，身高 175cm，体重 70kg。3 日前自觉全身肌肉酸痛、头疼，轻微咳嗽，自服抗感冒药物效果不佳，近 1 日觉畏寒，发热，体温 37.7℃，遂来本院就诊。检查结果：患者神清，查咽喉部红肿，扁桃腺（-），双肺呼吸音清，心脏听诊无异常，腹检无异常。血象 WBC 正常，其他正常。诊断为：上呼吸道感染（感冒）。

- A: 醋酸锌
- B: 布洛芬
- C: 阿昔洛韦
- D: 葡萄糖辛含片

答案：B

12. 对氟乙酰胺中毒进行解毒的药物是（）。

- A: 阿托品
- B: 乙酰胺
- C: 毒扁豆碱
- D: 卡马西平

答案：B

13. 以下所列病症中，依据"血淀粉酶超过正常值"可以诊断的是

- A: 高血压
- B: 急性胰腺炎
- C: 肾病综合征
- D: 高脂血症

答案：B

14. 可减轻鼻窦、鼻腔黏膜血管充血，解除鼻塞症状，有助于保持咽鼓管和窦口通畅的鼻黏膜血管收缩药是

- A: 阿司匹林

- B: 伪麻黄碱
- C: 颠茄浸膏片
- D: 菠萝蛋白酶

答案：B

15. 有关尿酸及尿淀粉酶的叙述正确的是

- A: 急性胰腺炎发作期可引起尿淀粉酶增高
- B: 尿酸增高即代表有病理性病变
- C: 尿酸为体内嘧啶类代谢分解的产物
- D: 人体尿酸主要来自于食物的分解代谢

答案：A

16. 抗肿瘤药物中，属于拓扑异构酶抑制剂的是

- A: 放线菌素
- B: 甲氨蝶呤
- C: 顺铂
- D: 依托泊苷

答案：D

17. 成本-效益分析

- A: 治疗结果采用临床指标表示，如治愈率
- B: 药物利用指数(DUI)
- C: 成本和治疗结果均用货币表示
- D: 是成本-效果分析的一种特例

答案：C

18. 下列药物中适宜在餐前服用的是()

- A: 莫沙必利片

B: 双氯芬酸钠片

C: 头孢呋辛酯片

D: 伊马替尼片

答案：A

19. 患儿，女，4岁半。身高 110cm，体重 15kg。一天前发热（39.1℃），咽喉痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗，发病 20h 左右出现腹泻，约 2~5h，一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐 1 次。体格检查：T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分。咽位充血，出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9/L$ （参考值 $4.0 \sim 10 \times 10^9/L$ ），粪便镜检可见红、白细胞。

A: 每次腹泻后均要少量多次喂水，直至腹泻停止？

B: 应给予少量、多次、清淡饮食？

C: 若症状不能改善，可及时加用诺氟沙星？

D: 若患儿腹泻加重，可口服自制补液盐进行补液？

答案：C

20. 主要经肾脏排泄、一般不会在老年人体内蓄积的药物是

A: 万古霉素

B: 别嘌醇

C: 青霉素

D: 地高辛

答案：C

21. 必须立即用清水冲洗至少 5 分钟是清除（）

A: 毛发被毒物污染

B: 眼内进入固体腐蚀性颗粒

C: 眼内污染毒物

D: 皮肤污染酚类毒物

答案: C

22. 慢性痛风和痛风性肾病为抑制尿酸生成可选用

A: 秋水仙碱

B: 别嘌醇

C: 苯溴马隆

D: 泼尼松龙

答案: B

23. (2021 年真题) 在一定范围内, 其水平与动脉粥样硬化和冠心病的发生、发展呈负相关的指标是 ()

A: TG

B: LDL-C

C: HbA1c

D: HDL-C

答案: D

24. 长期使用后突然停药, 可能引发心跳过速、心肌梗死的兴奋剂是

A: 可卡因

B: 普萘洛尔

C: 人生长激素

D: 麻黄碱

答案: B

25. 影响核酸合成的药物是

A: 顺铂

- B: 放线菌
- C: 培美曲塞
- D: 依托泊苷

答案：C

26. 患者，女，52 岁，近年来发现手关节肿痛，且呈对称性，并有畸形，晨起时有僵硬现象持续 1 小时，疼痛难忍。经实验室检测示血沉 28mm / 1h，指尖关节的 X 线片显示受累关节有骨侵蚀特征。

- A: 柳氮磺吡啶
- B: 环孢素
- C: 来氟米特
- D: 甲氨蝶呤

答案：D

27. 服药期间宜多喝水的药物

- A: 左旋多巴
- B: 苯溴马隆
- C: 琥珀酸亚铁
- D: 苯妥英钠

答案：B

28. 选择合适药物的前提是

- A: 药物治疗的安全性
- B: 药物治疗的方便性
- C: 药物治疗的规范性
- D: 药物治疗的有效性

答案：A

29. 老年性骨质疏松的"三联药物"治疗

- A: 单独用双膦酸盐
- B: 用甲状旁腺激素
- C: 长期口服维生素 D
- D: 钙制剂+维生素 D+双膦酸盐

答案：D

30. 主要用于降低三酰甘油的药物是

- A: 贝丁酸类
- B: 考来烯胺
- C: 他汀类
- D: 普罗布考

答案：A

31. 关于血清天门冬氨酸氨基转移酶的叙述正确的是

- A: 天门冬氨酸氨基转移酶（AST）与谷丙转氨酶（GPT）是同一概念
- B: 在慢性肝炎尤其是肝硬化时，AST 升高的幅度不如 ALT
- C: 天门冬氨酸氨基转移酶主要存在于心肌、肝肾、骨骼肌、胰腺等组织细胞中，同时也存在于正常人的血浆、胆汁、脑脊液及唾液中
- D: 天门冬氨酸氨基转移酶的测定值只反映肝脏的功能

答案：C

32. 在病情危重抢救时最常用的是

- A: 静脉注射
- B: 肌肉注射
- C: 口服给药
- D: 直肠给药

答案：A

33. 可引起再生障碍性贫血

- A: 苯妥英钠
- B: 氯霉素
- C: 维生素 A
- D: 抗组胺药

答案：B

34. 根据血红蛋白含量评估缺铁性贫血程度轻度贫血为

- A: 120~160g / L
- B: 60~90g / L
- C: 90~120g / L
- D: 30~60g / L

答案：C

35. 餐后血糖升高为主，伴餐前血糖轻度升高的 2 型糖尿病患者首选

- A: 比格列酮
- B: 阿卡波糖
- C: 格列喹酮
- D: 二甲双胍

答案：A

36. 易引湿的药物是()。

- A: 青霉素
- B: 硫酸镁
- C: 硝酸甘油
- D: 胃蛋白酶

答案：D

37. 使用前应用青霉素进行皮试的药物是

- A: 阿莫西林胶囊
- B: 左氧氟沙星片
- C: 注射用头孢曲松钠
- D: 阿奇霉素片

答案：A

38. 一般不会改变血红蛋白正常值的药物是

- A: 维生素 B
- B: 伯氨喹
- C: 维生素 K
- D: 硝酸甘油

答案：A

39. 成人血小板计数正常参考区间是

- A: $(200 \sim 300) \times 10$
- B: $(100 \sim 300) \times 10$
- C: $(4.0 \sim 10.0) \times 10$
- D: $(11.0 \sim 12.0) \times 10$

答案：B

40. 患者 12 岁，近 1 周夜间持续咳嗽宜首选

- A: 盐酸吗啡？
- B: 苯丙哌林？
- C: 羧甲司坦？
- D: 右美沙芬？

答案：D

41. 可导致丙氨酸氨基转移酶升高的帕金森病治疗药为（）

- A: 苄丝肼-左旋多巴
- B: 苯海索
- C: 恩托卡朋
- D: 金刚烷胺

答案：C

42. 适宜餐中服用的是

- A: 吲哚美辛
- B: 氟伐他汀
- C: 奥利司他
- D: 多潘立酮

答案：C

43. 抗高血压药物属于利尿剂的是（）

- A: 氨氯地平
- B: 依那普利
- C: 氢氯噻嗪
- D: 缬沙坦

答案：C

44. 胃黏膜保护药硫糖铝应该

- A: 在早、晚餐前 1.5 小时服用
- B: 在餐前 15 分钟服用
- C: 在餐前 1 小时服用
- D: 在餐后 1~2 小时服用

答案：C

45. 静脉给药用于重度及危重度哮喘治疗的药品是

- A: 孟鲁司特
- B: 异丙托溴铵
- C: 噻托溴铵
- D: 氨茶碱

答案: D

46. 抑制前列腺内双氢睾酮水平，达到降低雄激素水平，提高最高尿流率的是（）

- A: 哌唑嗪
- B: 索利那新
- C: 特拉唑嗪
- D: 度他雄胺

答案: D

47. 《中国药典》规定"凉暗处"除避光外，温度不应超过（）

- A: 10℃
- B: 4℃
- C: 20℃
- D: 15℃

答案: C

48. 新生儿白细胞计数的正常范围值

- A: $(15.0 \sim 20.0) \times 10^9/L$
- B: $(11.0 \sim 12.0) \times 10^9/L$
- C: $(3.5 \sim 10.0) \times 10^9/L$
- D: $(10.0 \sim 20.0) \times 10^9/L$

答案：A

49. 如万络（罗非昔布）撤市时发现大剂量服用万络者患心肌梗死和心脏猝死的危险增加了 3 倍

- A: 药品上市后风险评估
- B: 发现与规避假、劣药流入市场
- C: 发现药品质量问题
- D: 药品上市前风险评估

答案：A

50. 高血压伴痛风患者慎用的药物是（）

- A: 普萘洛尔
- B: 硝苯地平
- C: 卡托普利
- D: 氢氯噻嗪

答案：D

51. 患者，女，55 岁，关节痛半年，临床诊断为类风湿关节炎，既往有十二指肠溃疡病史，应首选的 NSAID 类药物是

- A: 吲哚美辛
- B: 布洛芬
- C: 双氯芬酸
- D: 塞来昔布

答案：D

52. 使肿瘤所在局部药物浓度达到相当高的水平而全身药物浓度很低。

- A: 腔内注射
- B: 动脉注射

C: 腹腔注射

D: 膀胱灌注

答案: D

53. 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药物对胎儿的危害将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别，并要求制药企业在药品说明书上标明等级。A~X 级致畸系数递增。有些药物有两个不同的危险度等级，一个是常用剂量的等级，另一个是超常剂量等级。

A: 卡马西平

B: 氯化钾

C: 奥美拉唑

D: 红霉素

答案: D

54. 非甾体抗炎药的不良反应,引起荨麻疹、瘙痒、剥脱性皮炎等皮肤损害

A: 布洛芬

B: 美洛昔康

C: 塞来昔布

D: 保泰松

答案: B

55. 患者，女，27 岁，今日早起出现打喷嚏、鼻塞、流清水样鼻涕、咳嗽、少量咳痰症状，体温 37.6℃，疑似普通感冒，前来药店购买药物。药师给予其购药指导，下述错误的是

A: 在症状出现后 24 小时内开始每天服用至少 75mg 醋酸锌或葡萄糖酸锌等含锌制剂

B: 应戴口罩，避免出入人多的公共场合，注意隔离

C: 尽早服用阿莫西林胶囊

D: 适当补充水分、保持室内空气流通，避免继发细菌感染

答案：C

56. 患者，男，48 岁。十二指肠溃疡病史 2 年，近感头痛、眩晕而就诊。查体：血压 160/100mmHg。经一段时间观察及定期检查后，医师诊断为高血压病。

A: 氢氯噻嗪

B: 利血平

C: 胍屈嗪

D: 可乐定

答案：B

57. 患者，女，30 岁，妊娠 7 个月，既往有磺胺药过敏史。近日双眼沙眼症状加剧，发痒、分泌物多，有烧灼感。去年曾用酞丁安滴眼液治疗相似症状，疗效较好，今天到药店想再次购买该药。药师给予的用药建议是（）

A: 酞丁安滴眼液

B: 硫酸锌滴眼液

C: 磺胺醋酰钠滴眼液

D: 利巴韦林滴眼液

答案：B

58. 以下所列项目中，处理误服毒物不久、神志尚清醒的中毒患者的首要措施是

A: 静脉补液

B: 导泻与洗肠

C: 催吐、洗胃

D: 给氧气吸入

答案: C

59. 用于治疗痴呆的胆碱酯酶抑制剂不包括

A: 卡巴拉汀

B: 加兰他敏

C: 美金刚

D: 多奈哌齐

答案: C

60. 以维生素 C 注射液作溶剂溶解后注射的是

A: 亚硝酸钠

B: 盐酸烯丙吗啡

C: 双解磷

D: 谷胱甘肽

答案: D

61. 较易导致肾损伤的药物是

A: 环孢素

B: 比沙可啶

C: 布洛芬

D: 酮康环孢素唑

答案: C

62. 口服避孕药可能导致

A: 血白细胞减少

B: 粪便细胞显微镜检查检出真菌

C: 血清总胆固醇升高

D: 血清血红蛋白升高

答案：C

63. (2016 年真题) 对于有睡眠障碍的抑郁症患者，适宜选用的抗抑郁药是 ()。

A: 雷美尔通

B: 米氮平

C: 佐匹克隆

D: 地西泮

答案：B

64. 饮酒过多也可能致命；导致儿童丧生的纯乙醇的量是

A: 15ml

B: 20ml

C: 25ml

D: 10ml

答案：C

65. 长期应用氨基糖苷类抗生素，应定期检查器官功能，以防出现

A: 味觉障碍

B: 视力障碍

C: 听力障碍

D: 智力障碍

答案：C

66. (用药导致的血常规异常) 抗真菌药

A: 嗜酸性粒细胞减少

B: 血红蛋白量增多

C: 中性粒细胞减少

D: 血小板减少

答案: C

67. 由国家药典委员会组织编写的是

A: 《中国国家处方集》

B: 《中国药典临床用药须知》

C: 《国家基本药物处方集》

D: 《医师案头参考》

答案: B

68. 甲状腺功能亢进患者服用丙硫胺嘧啶，可引起的典型药源性疾病是
()

A: 慢性肾衰竭

B: 溶血性贫血

C: 消化性溃疡

D: 粒细胞减少症

答案: D

69. 有卒中病史的急性冠状动脉综合征患者禁用

A: 替罗非班

B: 普拉格雷

C: 阿司匹林

D: 替格瑞洛

答案: B

70. 临床实践验证，一些毒物有相应的特效拮抗剂。因此，在进行排出毒物的同时，应积极使用特效的拮抗剂。

- A: 二巯丙醇
- B: 二巯丁二钠
- C: 依地酸钙钠
- D: 青霉胺

答案：A

71. 下列药物中属于溶栓药物的是（）

- A: 华法林
- B: 阿替普酶
- C: 利伐沙班
- D: 血凝酶

答案：B

72. （2019 年真题）通常开封启用 4 周后，不宜再继续使用的剂型是

- A: 滴眼剂
- B: 直肠栓剂
- C: 软膏剂
- D: 含漱剂

答案：A

73. 躯干部出现鞭打状色素沉着

- A: 白消胺
- B: 柔红霉素
- C: 博来霉素
- D: 氟尿嘧啶

答案：C

74. 最容易受光线影响而变质的药品是

- A: 胰岛素制剂
- B: 抗生素胶囊剂
- C: 氨基酸注射剂
- D: 注射用抗生素

答案：C

75. 尽量不用带数字的术语来表示

- A: 保护患者的隐私
- B: 解释的技巧
- C: 特别关注特殊人群
- D: 及时回答不拖延

答案：B

76. 患者，女，55 岁，患骨质疏松症伴食管裂孔疝，该患者避免使用的治疗药是

- A: 阿仑膦酸钠
- B: 鲑鱼降钙素
- C: 雷洛昔芬
- D: 特立帕肽

答案：A

77. 吩噻嗪类抗精神病药中毒癫痫发作时给予（）

- A: 苯妥英钠
- B: 有机硫类
- C: 去甲肾上腺素
- D: 阿托品

答案：A

78. 毒物种类很多，中毒方式各异，虽然有的毒物中毒尚无特效解毒药，但救治原则基本相同。

- A: 卡马西平
- B: 硝西泮
- C: 阿米替林
- D: 苯巴比妥

答案：B

79. 因可提高血液携氧量，被长跑运动员用于提高成绩，因而被列为兴奋剂管理的药物是()

- A: 可卡因
- B: 甲睾酮
- C: 人促红素
- D: 哌替啶

答案：C

80. 对于绝经综合征患者，可根据患者的病情或用药需求，采用不同的药物制剂或给药方式进行绝经激素治疗（MHT）

- A: 17 β 一雌二醇
- B: 戊酸雌二醇 / 雌二醇-醋酸环丙孕酮片
- C: 雌二醇一屈螺酮片
- D: 雌二醇 / 雌二醇-地屈孕酮片

答案：B

81. 肾脏有效循环血量与肾小球滤过率较成人低 30%~40%可影响

- A: 药物吸收
- B: 药物代谢
- C: 药物中毒

D: 药物排泄

答案：D

82. 患者，男，50 岁，血压 170/90mmHg，伴有双侧肾动脉狭窄，单药治疗控制血压效果不佳，宜选用的联合用药方案是

- A: 利尿剂+ARB
- B: α 受体阻滞剂+ACEI
- C: 利尿剂+CCB
- D: β 受体阻滞剂+ARB

答案：C

83. 患者，女，65 岁，今日因天气骤变出现急性支气管炎症状，出现喘息困难，无其他基础疾病，可给予的治疗药物是

- A: 马来酸氯苯那敏片 4~8mg tid
- B: 沙丁胺醇气雾剂 1~2 喷 q6h
- C: N-乙酰半胱氨酸片 600mg bid
- D: 喷托维林 25mg tid

答案：B

84. 以下有关肌酸激酶检查值升高的临床意义中，最正确的是

- A: 诊断恶性贫血
- B: 诊断痛风
- C: 诊断心肌梗死
- D: 诊断急慢性白血病

答案：C

85. 患者，女，32 岁，2 天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛。查体：T38℃，肾区叩击痛。血常规见 WBC $15 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 85%。尿常规见尿液浑浊，尿蛋白阳性，镜检白细胞满视野。

- A: 庆大霉素
- B: 左氧氟沙星
- C: 克林霉素
- D: 罗红霉素

答案：B

86. 处方前记项下包括的项目（）

- A: 主要实验室数据
- B: 对药物治疗的建设性意见与结果评价
- C: 医师签名、药品金额
- D: 临床诊断、费别

答案：D

87. 患者，男，27 岁，电话咨询药师朋友，告知目前正在欧洲旅游，从昨夜开始出现腹泻，呈水样便，起夜 4 次，希望药师给出建议。有关药师给予该患者的建议，错误的是

- A: 避免高脂肪、高糖饮食
- B: 口服双八面体蒙脱石散，与抗菌药物同服
- C: 口服补液盐 ORSIII 50ml/kg，4~6h 内服完
- D: 口服左氧氟沙星胶囊 0.2gtid

答案：B

88. 宜溶解于温开水中后服用

- A: 粉剂

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 糖浆剂

C: 泡腾片

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/566010211055011030>