专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024年甘肃省《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷200题题库（考点梳理）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.关于蛇咬伤中毒后的一般处理措施，叙述错误的是

A: 用绳索将伤口的近心端5cm处捆住，以防止毒液在体内扩散

B: 每隔15～20min放松带子1～2min.以防止肢体缺血坏死

C: 在伤口上做多个“十”字小切口以便排毒

D: 用1：1000高锰酸钾溶液反复冲洗伤口

答案：D

2.禁用于严重痛风患者的调脂药物为

A: 非诺贝特

B: 阿托伐他汀

C: 烟酸类

D: 考来烯胺

答案：C

3.吩噻嗪类抗精神病药中毒出现

A: 肌肉震颤、抽搐

B: 心血管毒性

C: 明显的锥体外系症状

D: 谵妄、躁狂、幻觉

答案：C

4.人体的生物钟规律即指在人体内调控某些生化、生理和行为现象有节奏地出现的生理机制，很多药物的作用和毒性、不良反应与人体的生物节律(生物钟)有着极其密切的关系，同一种药物在同等剂量可因给药时间不同而产生不同的作用和疗效。

A: 抗过敏药

B: 抗抑郁药

C: 调节血脂药

D: 平喘药

答案：B

5.抗抑郁药司来吉兰用于伴前列腺增生症患者，应评判为

A: 联合用药不适宜

B: 过度治疗用药

C: 有禁忌证用药

D: 无正当理由超适应证用药

答案：C

6.（2017年真题）可能影响儿童骨骼发育的药物是（）

A: 诺氟沙星

B: 复方磺胺甲噁唑

C: 阿莫西林

D: 头孢克洛

答案：A

7.可了解工作效果，并可进一步完善之后工作的咨询服务方法步骤是

A: 随访工作效果，并建立档案

B: 对查阅的资料进行评价、分析和整理

C: 形成答案并以口头形式提供给询问者

D: 对问题进行确定并归类

答案：A

8.可用于静脉给药的胰岛素/胰岛素类似物是

A: 甘精胰岛素

B: 低精蛋白锌胰岛素

C: 预混胰岛素

D: 普通胰岛素

答案：D

9.属于雌激素受体拮抗剂的抗肿瘤药是

A: 炔雌醇

B: 丙酸睾酮

C: 阿那曲唑

D: 他莫昔芬

答案：D

10.老年（≥65岁）帕金森患者，或伴认知障碍，首选

A: 普拉克索?

B: 金刚烷胺?

C: 苯海索?

D: 复方左旋多巴?

答案：D

11.患者男25岁有癫痫病史2年一直服用丙戊酸钠和左乙拉西坦,癫痫控制良好近期因社区获得性肺炎入院。下列药物中,最可能影响患者基础疾病控制的是（）

A: 阿莫西林

B：头孢曲松

C：阿奇霉素

D：莫西沙星

答案：D

12.一般较轻，结膜可充血和水肿，瘙痒而伴有流泪，一般无分泌物或稍有黏液性分泌物的是

A：流行性出血性结膜炎

B：过敏性结膜炎

C：急性卡他性结膜炎

D：流行性结膜炎

答案：B

13.及时发现并确定“亮菌甲素事件”显示药物警戒的作用是

A：发现药品质量问题

B：发现与规避假、劣药品流入市场

C：药品上市后风险评估

D：药品上市前风险评估

答案：B

14.不宜直接给患者服用，应溶解在水中服用，以免呛入气管

A：粉剂

B：胶囊剂

C：糖浆剂

D：泡腾片

答案：A

15.利尿药吲达帕胺引起的主要不良反应是

A：高钾血症

B：低钾血症

C：水肿

D：多毛症

答案：B

16.不良反应是口干、尿潴留

A：特拉唑嗪

B：索利那新

C：哌唑嗪

D：度他雄胺

答案：B

17.利巴韦林的通用名是

A：病毒唑

B：克毒星

C：阿霉素

D：无环鸟苷片

答案：A

18.以健康受试者进行初步的临床药理学及人体安全性评价是指

A：临床预试验

B：Ⅲ期临床试验

C：Ⅰ期临床试验

D：Ⅱ期临床试验

答案：C

19.由美国卫生系统药师学会出版的三级文献是

A：《美国医院处方集服务处：药物信息》
B：《新编药物学》
C：《美国药典药物信息》
D：《马丁代尔药物大典》
答案：A

20.关于帕金森病患者的用药指导，错误的是
A：金刚烷胺剂量为50～100mg，2～3次/日，末次应在下午4时前服用
B：老年患者尽量选用苯海索，除非震颤严重影响生活质量
C：苯海索不宜与单胺氧化酶抑制剂同时服用
D：对于认知功能减退或因特殊工作之需，力求显著改善运动症状，可选用复方左旋多巴作为治疗首选药
答案：B

21.属于药师参与临床药物治疗、提供药学服务的重要方式和途径的是
A：参与健康教育
B：治疗药物监测
C：药物信息服务
D：处方调剂
答案：B

22.患者，48岁，胸痛部位在心前区，为压迫性疼痛，发作数秒钟，含服硝酸甘油1～2秒疼痛即消失。
A：曲美他嗪
B：哌唑嗪
C：普伐他汀
D：左旋氨氯地平

答案：D

23.饮酒可使其吸收明显减少的药物是

A: 卡马西平

B: 利血平

C: 维生素B

D: 苯妥英钠

答案：C

24.自我药疗时，初治滴虫性阴道炎，每日口服甲硝唑800mg连续用药时间为

A: 3天

B: 1天

C: 5天

D: 7天

答案：D

25.患者，女，24岁，已婚，因痤疮购药咨询，应告知患者对育龄妇女有严重的致畸作用，药师不应推荐的治疗药物是

A: 红霉素乳膏

B: 阿达帕林凝胶

C: 异维A酸片

D: 过氧化苯甲酰凝胶

答案：C

26.以下临床联合用药中，药物相互作用主要影响药效学的是

A: 昆布片同服异烟肼导致药效降低

B: 四环素同服硫酸亚铁降低疗效

C: 维生素C与多潘立酮同服吸收减少

D: 氢氯噻嗪减弱甲苯磺丁脲的降糖作用

答案：D

27.（2017年真题）患者，男，59岁，哮喘病史8年，近日因急性脑梗死就诊住院治疗2周后出院。对于该患者脑血管病的二级预防,宜选用的抗血小板药物是（）

A: 对乙酰氨基酚

B: 氯吡格雷

C: 阿司匹林

D: 华法林

答案：B

28.以下关于抑郁症的介绍错误的是

A: 该病具有高发病、高复发、高致残的特点

B: 抑郁症的好发年龄在20～50岁

C: 抑郁症的病因明确

D: 及时恰当的治疗能提高抑郁症的临床治愈率

答案：C

29.二巯丙醇用于解救

A: 吗啡中毒

B: 有机磷中毒

C: 水银中毒

D: 氰化物中毒

答案：C

30.记录患者用药问题、药学干预内容、药学监护计划的技能是

A: 药品警戒技能
B: 自主学习能力
C: 药历书写技能
D: 沟通技能
答案：C

31.患者，女，55岁，诊断为混合型血脂异常，需联合应用他汀类和贝特类，最佳的给药方法是
A: 早晨服用他汀类，晚上服用贝特类
B: 早晨服用贝特类，晚上服用他汀类
C: 早晚联合服用他汀和贝特类
D: 晚上联合服用他汀类和贝特类
答案：B

32.交代患者用药期间应禁止摄入酒精，以免加深中枢神经抑制的是
A: 米索前列醇
B: 胰岛素注射剂
C: 氟西汀
D: 枸橼酸铋钾
答案：C

33.易风化的药物是()。
A: 硫酸镁
B: 青霉素
C: 硝酸甘油
D: 胃蛋白酶
答案：A

34.（2021年真题）头孢曲松钠与乳酸钠林格注射液直接混合,可导致（）

A：溶液变色

B：产生胶状不溶物

C：产生气体

D：微浑浊或沉淀

答案：D

35.可能导致因心力衰竭和呼吸衰竭而死亡的是

A：蛋白同化制剂

B：肽激素类

C：精神刺激剂

D：易制毒药品

答案：D

36.在审核处方用药适宜性时，应特别注意是否有潜在临床意义的相互作用和配伍禁忌。下列联用药物中有潜在不良相互作用的是

A：阿莫西林和克拉维酸钾

B：苄丝肼和左旋多巴

C：甲氧氯普胺和氯丙嗪

D：头孢哌酮和舒巴坦

答案：C

37.剂量过大，疗程过长，滴注速度过快，用药途径错误，重复用药等归属

A：药物制剂因素

B：药动学相互作用

C：药理作用

D: 药物的使用

答案：D

38.下列哪项不是尿路感染的易感因素

A: 不洁性活动

B: 过度憋尿

C: 尿路梗阻

D: 细菌感染

答案：D

39.泌尿系统感染可能出现的尿常规检查异常是

A: 尿沉渣白细胞增多

B: 尿沉渣尿酸盐结晶

C: 尿沉渣结晶异常

D: 尿沉渣管型异常

答案：A

40.能再激活乙型肝炎，禁用于活动性乙肝患者的靶向药是

A: 利妥昔单抗

B: 曲妥珠单抗

C: 帕博利珠单抗

D: 贝伐珠单抗

答案：A

41.血清丙氨酸氨基转移酶正常参考区间是

A: 男性<40U/L

B: 男性 11～50U/L

C: 成人<40U/L

D: 成人<50U/L

答案：C

42.患者男性，35岁，髋关节置换术后7天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

A: 氯吡格雷

B: 肝素

C: 华法林

D: 利伐沙班

答案：A

43.患者，男，60岁，因“坏死性胰腺炎”行剖腹探查术后2年，进食油炸食品后出现轻度腹泻。宜选用的药物是

A: 干酵母片

B: 奥美拉唑肠溶胶囊

C: 蒙脱石散

D: 复方阿嗪米特肠溶片

答案：D

44.某患者，女，45岁，身高160cm，体重75kg，临床诊断为2型糖尿病。实验室检查：空腹血糖8.7mmol/L，餐后2小时血糖13.1mmol/L，糖化血红蛋白7.1%。经饮食控制、规律锻炼，血糖控制仍未达到理想水平。

A: 胰岛素+二甲双胍

B: 胰岛素

C: 二甲双胍

D: 格列齐特

答案：C

45.患者于1周前无诱因出现咳嗽，咳嗽为阵发性，痰少，呈白色黏液性，不易咳出，同时出现发热，体温多在夜间升高，38℃左右，无畏冷、寒战、胸痛、咳血等，于卫生院治疗后，未见好转，并有气喘、气促，活动后呼吸困难等症状。入院治疗诊断为：肺炎。

A: 阿奇霉素

B: 克拉霉素

C: 米诺环素

D: 链霉素

答案：D

46.患者,男,65岁,诊断为持续性心房纤颤,医生处方胺碘酮和华法林治疗。患者既往有高血压、糖尿病、冠心病和高脂血症,目前正在服用贝那普利、美托洛尔、二甲双胍、阿卡波糖、辛伐他汀等药物治疗。根据患者用药情况,药师提出的合理化药物治疗建议,不包括()

A: 胺碘酮能增加华法林的抗凝活性,在逐渐降低胺碘酮剂量的时候,注意随时根据INR值调整华法林的剂量

B: 因为胺碘酮和贝那普利存在临床意义的相互作用,建议换成氨氯地平等CCB降压药

C: 胺碘酮可以显著抑制CYP2D6,减慢美托洛尔的代谢,应该根据患者心率和血压调整美托洛尔剂量

D: 患者在复律成功后,尽可能以最小的胺碘酮剂量维持治疗

答案：B

47.患者，女，58岁，既往无心脏病、高血压、糖尿病病史及手术史。体检：身高160cm，体重78kg。实验室检查：空腹血糖8.7mmol/L，白细胞8.0X109/L（参考值4.010.0X109/L），红细胞4.0X1012/L（参考值3.55.0X1012/L），总胆固醇6.0mmol/L（参考值<5.2mmol/L）。经饮食控制，规律锻炼，血糖控制仍未达到理想水平。

A: 二甲双胍

B: 胰岛素

C: 阿卡波糖

D: 格列齐特

答案：A

48.患者，女，27岁，2年前开始出现多汗、多食，近期因消瘦、心悸就诊。查体：甲状腺肿大，根据血T3、T4及TSH检查结果，诊断为甲亢。目前该患者正处于哺乳期。

A: 海带

B: 虾皮

C: 紫菜

D: 不含碘的食用盐

答案：D

49.抑制细菌叶酸合成的药物是

A: 头孢哌酮

B: 头孢米诺

C: 磺胺嘧啶

D: 利福喷汀

答案：C

50.阿司匹林可导致药源性肾病的机制是

A：结晶沉积

B：肾小球滤过率下降

C：前列腺素合成障碍

D: 不可逆性肾小管坏死

答案：C

51.对从事药学服务的药师而言，必须具备的专业知识能力要求是

A: 扎实的外语专业知识

B: 扎实的管理专业知识

C: 扎实的人文知识

D: 扎实的药学专业知识

答案：D

52.（2017年真题）治疗水疱型脚癣宜选用（）

A: 复方苯甲酸酊

B: 氢化可的松软膏

C: 阿昔洛韦软膏

D: 维A酸乳膏

答案：A

53.可与眼球表面和坏死组织及分泌物中的蛋白质形成极薄的蛋白膜起保护作用，高浓度时则有杀菌和凝固作用的是

A: 可的松滴眼液

B: 磺胺醋酰钠滴眼液

C: 硫酸锌滴眼液

D: 酞丁安滴眼液

答案：C

54.临床实践验证，一些毒物有相应的特效拮抗剂。因此，在进行排除毒物的同时，应积极使用特效拮抗剂。

A: 3%过氧化氢

B：1%硫酸镁

C：1%氯化钠

D：1%硫酸铜

答案：B

55.患者，女，45岁，既往有心律失常(Q-T间期延长)、低钾血症病史。近日因发热、咳嗽、咳痰就诊，诊断为社区获得性肺炎。该患者不宜选用的药物是

A：莫西沙星

B：阿莫西林

C：氨溴索

D：头孢呋辛酯

答案：A

56.下列确诊医院获得性肺炎的最重要的依据是

A：发热>38℃

B：WBC>10×109/L或<4×109/L

C：脓性气道分泌物

D：肺部X线检查有新发或进展性浸润阴影

答案：D

57.在治疗痔疮的药物中，作为硬化剂或萎缩剂的是

A：苯酚甘油-水溶液

B：地奥司明

C：九华膏

D：草木犀流浸液片

答案：A

58.用于治疗痴呆的胆碱酯酶抑制剂不包括

A：卡巴拉汀

B：美金刚

C：多奈哌齐

D：加兰他敏

答案：B

59.（2018年真题）下列药物中,可以增加缺血性脑卒中发作风险的药物是（）

A：口服避孕药

B：银杏叶片

C：叶酸

D：阿司匹林

答案：A

60.抗血小板药

A：肝素

B：氯吡格雷

C：利伐沙班

D：华法林

答案：B

61.荨麻疹患者常出现()

A：血小板计数增多

B：中性粒细胞增多

C：血红蛋白减少

D：嗜酸性粒细胞增多

答案：D

62.可在一定程度上准确反映肾小球滤过功能损害程度的是

A：肌酐

B：胆固醇

C：尿素氮

D：淀粉酶

答案：A

63.对于效果不易察觉或起效慢的药物，应特别提示、告知坚持服药

A：简化治疗方案

B：使患者了解药物的重要性

C：针对患者生理及心理特点选药

D：使用分时药盒和用药记录

答案：B

64.卡马西平使环孢菌素疗效降低属于()。

A：与血浆蛋白结合

B：排泄

C：作用于同一受体的拮抗作用

D：酶诱导作用

答案：D

65.可使高血压患者血压升高的药物是()

A：银翘解毒片

B：复方酚咖伪麻胶囊

C：抗感宁胶囊

D：速感宁胶囊

答案：B

66.可引起溶血性贫血的药物是

A：氯丙嗪

B：阿糖胞苷

C：地塞米松

D：氯霉素

答案：A

67.关于烫伤患者的用药指导和患者教育，错误的是

A：烫伤后迅速用冷水或冰水湿敷患处

B：可使用红汞或甲紫药水涂抹患处

C：切忌用塑料布密封患处

D：有脑外伤的患者可使用地西泮镇静

答案：B

68.肾功能不全患者宜选用的药物是

A：经肝肾双途径消除的药物

B：经肝肠循环消除的药物

C：肾毒性小、经肝代谢的药物

D：肝毒性小、经肾代谢的药物

答案：C

69.（2018年真题）患者，男58岁，高血压病史5年，吸烟史40年，日均40支，6小时前出现左侧肢体无力，并逐渐加重，不能站立，家属发现其说话迟钝含混，右侧嘴唇变浅，意识清楚，到某院急诊BP190/120mmHg，血常规基本正常，行头部MRI检查后，诊断为急性脑梗死。

A：阿司匹林肠溶片100mgqdpo

B：华法林片3mgqdpo

C：阿司匹林肠溶片300mgqdpo

D：氯吡格雷片75mgqdpo

答案：A

70.患者,女,38岁,已婚,妊娠2个月,近日自觉心慌、多汗,查FT3,FT4偏高TSH0.01mU/L,临床诊断为甲状腺功能亢进症适宜的治疗方案为()

A：维持妊娠,行甲状腺切除手术

B：终止妊娠,选用丙硫氧嘧啶治疗

C：维持妊娠,选用甲巯咪唑治疗

D：维持妊娠,选用丙硫氧嘧啶治疗

答案：D

71.妊娠期应用可引起胎儿性发育异常的药物是

A：沙利度胺

B：阿司匹林

C：叶酸拮抗剂

D：雌孕激素、雄激素

答案：D

72.在有关与药物使用的内容中，属于医师用药咨询的主要内容是

A：首次剂量、维持剂量以及每日用药次数、间隔与疗效

B：用药后预计起效时间、维持时间及疗效

C：合理用药信息

D：注射剂配制溶媒、浓度

答案：C

73.阿糖腺苷属于

A：抗病毒药

B：抗肿瘤药
C：抗真菌药
D：抗过敏药
答案：A

74.药师对药品不良事件、新药上市后被召回或撤市的案例应及时掌握，不能松懈
A：钆贝葡胺
B：塞来昔布
C：替加色罗
D：培高利特
答案：C

75.（2016年真题）患者，男，45岁，因男性乙型肝炎给予干扰素治疗，治疗1个月后，患者出现脱发，停用干扰素后，脱发症状好转，再次给予干扰素治疗，患者再次出现脱发。该ADR的因果关系评价结果是（）。
A：可能无关
B：肯定
C：很可能
D：可能
答案：B

76.对合理的处方，处置的方式是
A：拒绝调配
B：经改正并签字确认后，方可调配
C：应拒绝调配，并按有关规定报告
D：准予调配

答案：D

77.处方中外文缩写“OU”代表

A：左眼

B：右耳

C：双眼

D：左耳

答案：C

78.硫酸镁用于救治中毒导泻，适宜

A：肌内注射

B：吸入给药

C：口服给药

D：直肠给药

答案：C

79.单纯餐后血糖高，而空腹和餐前血糖不高的2型糖尿病患者首选

A：比格列酮

B：格列喹酮

C：二甲双胍

D：阿卡波糖

答案：D

80.患者，女，66岁，身高156cm，体重61kg。空腹血糖7.8mmol／L，餐后血糖11.2mmol／L，糖化血红蛋白8.7％。

A：增加一种口服降糖药

B：换用其他作用机制的口服降糖药

C：启用胰岛素治疗

D: 增加现用口服降糖药的剂量

答案：C

81.患者因扁桃体炎给予头孢拉定治疗，服用4小时候，面部出现皮疹，无其他不适，停药后皮疹消失，排除其他疾病可能，该病例用药与不良反应因果关系评价结果是：

A: 可能

B: 可能无关

C: 很可能

D: 肯定

答案：C

82.患儿，女，4岁半，身高110cm，体重15kg。1天前开始发热，体温39.1℃，咽部稍痛，无咳嗽、无吐泻。家长在家选用退热药对症治疗。发热20h左右出现腹泻，每间隔2～3小时排1次大便，量少，黄色黏液便，呕吐1次。体格检查：T38.8℃，P118次/分，咽部微充血，出现轻微脱水症状；双肺呼吸音清，腹平软，肝、脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC18.5×109/L，粪便镜检可见红、白细胞。

A: 若患儿腹泻加重，可口服自制补液盐进行补液

B: 若症状不能改善，可及时加用诺氟沙星

C: 每次腹泻后均需少量多次喂水，直至腹泻停止

D: 应给予少量、多次、清淡饮食

答案：B

83.对于甲减患者黏液性水肿昏迷的治疗，首选药物是

A: L-T3

B: T3

C: T4

D: L-T4

答案：B

84.骨髓造血功能较为活跃，某些药物可引起贫血、粒细胞减少、过敏性紫癜等

A: 血液系统

B: 运动系统

C: 内分泌系统

D: 水盐代谢

答案：A

85.对乙酰氨基酚的妊娠毒性分级是（）

A: B级

B: X级

C: A级

D: C级

答案：A

86.检查注射剂的澄明度与口服溶液剂的色泽和澄清度属于

A: 听觉试验

B: 嗅觉试验

C: 触觉试验

D: 视觉试验

答案：D

87.合并闭角型青光眼的前列腺增生症患者不宜选用的药物是

A: 多沙唑嗪

B：坦索罗辛

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/566032044100011030