

主管护师-护理学（中级）专业实践能力综合模考卷 5

单选题（共 100 题，共 100 分）

(1.) 水痘患儿禁忌的药物是

- A. 激素
- B. 抗生素
- C. 退热药
- D. 抗病毒药
- E. 维生素（江南博哥）

正确答案： A

参考解析：患水痘时应用激素会导致皮疹泛化，加重病情，故禁用激素。如因原发病使用激素期间感染水痘时，应按医嘱减量并逐渐停用。

(2.) 低渗性脱水伴休克，补液时应首选

- A. 3%氯化钠溶液
- B. 10%葡萄糖盐水
- C. 4: 3: 2 液
- D. 2: 3: 1 液
- E. 2:1 等张液

正确答案： E

参考解析：2:1 等张液由 2 份生理盐水和 1 份等渗碱性液体组成，常用于扩充血容量。

(3.) 光照疗法的作用是

- A. 加速血液循环
- B. 减少感染机会
- C. 使体温保持稳定
- D. 降低胆红素浓度
- E. 提高血氧浓度

正确答案： D

参考解析：光照疗法中的蓝色荧光可使血清和照射部位皮肤间接胆红素转化为光-氧胆红素，并经胆汁及尿排出体外，降低血清间接胆红素的含量。

(4.) 小儿口服补液盐(ORS) 护理要点中不正确的是

- A. 适于中、重度腹泻
- B. 服用期间照常饮水
- C. 眼睑水肿时不用
- D. 不适用于新生儿
- E. 腹胀明显者不用

正确答案： A

参考解析：口服补液盐适于轻、中度脱水患儿；如为中、重度脱水应采取静脉输液。

(5.)心力衰竭患儿应用洋地黄类药物时的护理措施不正确的是

- A. 用药后测脉搏
- B. 静脉给药时间不少于 5 分钟
- C. 观察药物疗效
- D. 勿与钙剂同服
- E. 观察药物毒副作用

正确答案： A

参考解析：心力衰竭患儿应用洋地黄制剂时，应在用药前数脉搏，而非用药后。

(6.)护理新生儿颅内出血患儿不正确的是

- A. 绝对静卧
- B. 头偏向一侧
- C. 喂乳时抱起
- D. 遵医嘱给予止血药
- E. 积极建立呼吸

正确答案： C

参考解析：护理颅内出血新生儿时，切记不要抱起孩子喂奶，以避免体位改变而加重颅内出血。

(7.)女，42 岁。风心病二尖瓣狭窄伴心房颤动已 10 年，因 1 天前发生右半身麻木，活动不灵急诊入院，医生认为是栓塞，其栓塞部位可能是

- A. 肺动脉
- B. 股动脉
- C. 胫后动脉
- D. 脑动脉
- E. 肠系膜上动脉

正确答案： D

参考解析：风心病伴心房颤动的病人易发生栓塞的并发症，根据病人的表现：肢体麻木、活动障碍，可初步判断为脑栓塞。

(8.)孕妇，30 岁。G1P0，常规产前检查时，护士教其监测胎动，并告知正确的胎动次数为

- A. 每小时 2~3 次
- B. 每小时 3~5 次
- C. 每小时 6~8 次
- D. 每 12 小时 3~5 次
- E. 每 12 小时少于 10 次

正确答案： B

参考解析：胎动是胎儿在子宫内冲击子宫壁的活动，孕妇于妊娠 18~20 周时开始自觉胎动，胎动每小时 3~5 次。

(9.) 小儿，女，母乳喂养，其最适宜的断奶时间是

- A. 4~6 个月
- B. 8~10 个月
- C. 10~12 个月
- D. 14~16 个月
- E. 16~18 个月

正确答案： C

参考解析：母乳喂养儿最理想断奶时间是 10~12 个月，如因各种原因推延断奶时间，最迟不应超过 18 个月。

(10.) 循环系统疾病引起的呼吸困难，其护理措施不正确的是

- A. 保持情绪稳定，降低交感神经兴奋性
- B. 心电监护
- C. 保持仰卧可减轻呼吸困难
- D. 加强生活护理，减少体力活动
- E. 保持呼吸道通畅

正确答案： C

参考解析：循环系统疾病引起的呼吸困难，一般可通过半卧位或端坐卧位减轻。因此种卧位可减少回心血量，减轻心脏负担；同时可使膈肌下降，有利于呼吸。

(11.) 护士指导法洛四联症患者保证液体入量的目的是防止

- A. 肾衰竭
- B. 肺水肿
- C. 血栓栓塞
- D. 脱水
- E. 便秘

正确答案： C

参考解析：法洛四联症患者因长期缺氧，会导致代偿性红细胞、血红蛋白和血液黏稠度增高，故本病一定要保证液体的摄入，以避免发生并发症，即血液栓塞。

(12.) 授乳后，母亲协助婴儿的最佳体位是

- A. 左侧卧位
- B. 右侧卧位
- C. 半卧位
- D. 平卧位
- E. 俯卧位

正确答案： B

参考解析：喂后将婴儿抱直，头部靠在母亲肩上，轻拍背部，使空气排出，然后保持右侧卧位，以防呕吐。

(13.)有关痛经正确的描述不包括

- A. 原发性痛经生殖器官无器质性病变
- B. 继发性痛经生殖器官有器质性病变
- C. 多发于无排卵性功能失调性子宫出血
- D. 痛经常于行经前数小时开始，持续经期的第1、2天
- E. 痛经与前列腺素分泌有关

正确答案： C

参考解析：无排卵性子宫内膜因无孕激素刺激，前列腺素浓度很低，一般不发生痛经。

(14.)有关脑室引流护理不正确的是

- A. 拔管前应夹闭引流管，观察有无颅内压增高现象
- B. 妥善固定并保持通畅
- C. 每日引流不超过600ml
- D. 观察并记录脑脊液性状和量
- E. 严格执行无菌操作

正确答案： C

参考解析：脑室引流每日引流不超过500ml。

(15.)猩红热典型皮疹的特征除外

- A. 发病第2天出疹
- B. 疹间有正常皮肤
- C. 皮肤瘙痒
- D. 疹退后可有片状脱屑
- E. 皮肤弥漫充血

正确答案： B

参考解析：猩红热典型的皮疹特征是皮肤弥漫充血，疹与疹之间无正常皮肤。如疹与疹之间有正常皮肤则属麻疹皮疹特征。

(16.)男性，57岁，肾移植术后24小时，尿量23ml/小时，应该首先考虑

- A. 尿路梗阻
- B. 血容量不足
- C. 尿瘘
- D. 肾血管栓塞
- E. 急性排斥反应

正确答案： B

参考解析：肾移植术后应该监测血压、尿量，如果病人尿量 $<30\text{ml/小时}$ ，应该首先考虑血容量不足，应结合病人血压、脉搏来进行判断。

(17.)男，62岁。冠心病心绞痛5年，下面不是预防发作的药物是

- A. 普萘洛尔
- B. 硝酸异山梨醇酯

- C. 硝苯地平
- D. 肠溶阿司匹林
- E. 氨苯蝶啶

正确答案： E

参考解析：氨苯蝶啶是保钾利尿药，对预防心绞痛发作无效。

(18.) 肾盂肾炎感染途径最常见的是

- A. 血行感染
- B. 直接感染
- C. 局部感染
- D. 上行感染
- E. 下行感染

正确答案： D

参考解析：正常情况下尿道口周围有细菌寄居，当机体抵抗力下降或某些情况下以及入侵细菌的毒力大，黏附于尿道并上行传播的能力强时，细菌可侵入尿道并沿尿路上行到膀胱、输尿管，甚至肾而发生尿路感染，这种上行感染的方式是最常见的感染途径。

(19.) 较大肾肿瘤切除术后，下列护理措施错误的是

- A. 观察生命体征
- B. 遵医嘱应用抗生素，预防感染
- C. 观察引流液颜色、性状、量
- D. 早期下地活动
- E. 准确记录 24 小时出入量

正确答案： D

参考解析：肾部分切除术后为预防出血，不鼓励病人早期下地活动。

(20.) 胎盘剥离的征象除外

- A. 外露的脐带不再回缩
- B. 阴道出血
- C. 子宫底下降
- D. 子宫体变硬呈球形
- E. 脐带自动下降

正确答案： C

参考解析：胎盘剥离征象：子宫体变硬呈球形，子宫底升高达脐上；阴道突然流出大量血液；剥离的胎盘降至子宫下段，阴道口外露的一段脐带自行延长；用手掌尺侧在产妇耻骨联合上方轻压子宫下段，子宫体上升而外露的脐带不再回缩。

(21.) 女性，43 岁，遭遇车祸，1 小时前躯干被侧翻的车压伤。主诉胸痛、胸闷、气促，烦躁不安，此时护理体检特别应注意的是

- A. 有无反常呼吸运动

- B. 进行胸部挤压试验
- C. 气管有无移位
- D. 呼吸音是否减弱
- E. 血压、脉搏、呼吸变化

正确答案： B

参考解析：对于此类病人应该特别注意有无骨折。

(22.) 护士对甲状腺功能亢进病人进行健康教育，不应包括哪项内容

- A. 服用他巴唑不要随意间断
- B. 注意保护眼睛，避免过度用眼
- C. 每天应食用含碘多的食品
- D. 食用高蛋白、高维生素饮食
- E. 注意监测体重及晨起脉搏

正确答案： C

参考解析：缺碘性甲状腺肿可食用含碘丰富的食物，而甲状腺功能亢进症患者本身是甲状腺素分泌过多，应避免再食用含碘丰富的食物。

(23.) 下列肠梗阻类型中可先行非手术处理，无效后采取手术治疗的是

- A. 急性肠扭转
- B. 麻痹性肠梗阻
- C. 粘连性肠梗阻
- D. 绞窄性肠梗阻
- E. 肠套叠

正确答案： E

参考解析：肠套叠早期可以先行空气灌肠或钡剂灌肠，无效后手术处理。

(24.) 临床用于判断小儿体格发育的常用指标是

- A. 体重、身高、头围、胸围
- B. 语言表达
- C. 环境适应能力
- D. 智力发育水平
- E. 动作能力

正确答案： A

参考解析：体重、身高、头围、胸围、腹围等是判断小儿体格发育的常用指标。

(25.) 功能性子宫出血不正确的说法是

- A. 无器质性病变
- B. 无排卵性功能失调性子宫出血多发生于生育年龄妇女
- C. 有排卵性功能失调性子宫出血子宫内膜呈现分泌期改变
- D. 有排卵性功能失调性子宫出血多发于生育年龄妇女
- E. 无排卵性功能失调性子宫出血子宫内膜呈现增生期改变

正确答案： B

参考解析：无排卵性功能失调性子宫出血多发生于青春期与绝经过渡期妇女。

(26.)头盆不称引起子宫破裂是因为

- A. 子宫本身病变
- B. 手术损伤
- C. 宫缩过强
- D. 先露下降受阻
- E. 胎儿过大

正确答案： D

参考解析：骨盆狭窄、头盆不称、胎位异常、胎儿异常，均可使胎先露部下降受阻，子宫上段为克服产道阻力而强烈收缩，使子宫下段拉长变薄超过最大限度，可引起子宫破裂。

(27.)孕妇，24岁，停经52天，尿HCG(+)，诊为早孕，其末次月经1999年5月13日，护士推算预产期约在

- A. 2000年3月20日
- B. 2000年2月28日
- C. 2000年2月20日
- D. 2000年1月20日
- E. 2000年1月5日

正确答案： C

参考解析：了解末次月经(LMP)的日期以推算预产期(EDC)。计算方法为：末次月经第1天起，月份减3或加9，日期加7。如为阴历，月份仍减3或加9，但日期加15。

(28.)男，25岁。喷洒农药时出现恶心、呕吐、胸闷，大小便失禁，瞳孔缩小，流涎，面部肌肉抽搐。缓解面部肌肉抽搐的治疗措施是

- A. 阿托品
- B. 迅速离开喷洒农药现场
- C. 吸氧
- D. 补钙
- E. 解磷定

正确答案： E

参考解析：有机磷农药中毒出现面部肌肉震颤属烟碱样症状，能解除烟碱样症状的药物目前常用的是解磷定和氯磷定。

(29.)对于婴幼儿患者，护士采取最佳的心理沟通方式是

- A. 转移注意力
- B. 多做游戏
- C. 搂抱与抚摸
- D. 适时鼓励

E. 榜样教学

正确答案： C

参考解析：搂抱与抚摸是最适宜的婴儿心理沟通方式。

(30.) 建议孕妇自测胎动应在妊娠

- A. 16 周
- B. 22 周
- C. 28 周
- D. 32 周
- E. 34 周

正确答案： C

参考解析：孕妇于妊娠 18~20 周时开始自觉胎动，但很弱。至孕 28 周胎动逐渐加强，次数也增多，直至足月又稍减少。

(31.) 不能用于组成直流电复律的装置是

- A. 电源
- B. 电量选择装置
- C. 脉冲发生器
- D. 电极
- E. 同步触发装置

正确答案： C

参考解析：脉冲发生器是心脏起搏器的装置。

(32.) 新生儿颅内出血的护理措施正确的除外

- A. 头肩抬高 $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$
- B. 避免头皮输液
- C. 保持安静
- D. 避免刺激
- E. 每日洗澡 1 次

正确答案： E

参考解析：新生儿颅内出血的护理要点尤其强调安静，避免各种刺激，如每日洗澡可加重出血。

(33.) 下列哪项体位可用于减轻急性肺水肿病人的症状

- A. 膝胸位
- B. 左侧卧位
- C. 半坐位或坐位
- D. 右侧卧位
- E. 去枕仰卧位

正确答案： C

参考解析：急性肺水肿病人取坐位或半坐卧位可减少回心血量，减轻心脏负荷，有助于症状减轻。

(34.)男, 60岁。近5个月间歇性血尿, 行膀胱镜检查后, 应注意的护理重点是

- A. 监测病人生命体征
- B. 让病人多饮水
- C. 给予利尿药
- D. 给予抗生素
- E. 酌情给予止血药

正确答案: B

参考解析: 护理重点是预防感染, 而饮水简单易行。

(35.)关于T形管引流的护理说法正确的是

- A. 每周更换无菌引流袋1~2次
- B. 避免扭曲、折叠
- C. 胆总管下段阻塞时引流量增多
- D. 术后1周可拔管
- E. T形管造影显示通畅即可拔管

正确答案: C

参考解析: T形管引流病人下床活动时引流瓶应低于腰部, T形管阻塞时不可加压冲洗, 正常胆汁色泽为深绿、较稠厚, T形管造影显示通畅要引留几天再拔管。

(36.)男性, 61岁, 因结肠癌行化疗, 输液过程中发现药液漏入皮下, 护士应立即采取的措施是

- A. 立刻停止输液, 局部封闭
- B. 立刻停止输液, 用原有针头行多向强力回抽
- C. 立刻停止输液, 用原有针头注入解毒剂
- D. 立刻停止输液, 用硫酸镁湿敷
- E. 停止输液, 放低患肢

正确答案: C

参考解析: 化疗药物外渗, 应该立即停止输液, 保留针头回抽药液, 然后注入解毒药。

(37.)初期复苏的主要目的是使病人

- A. 防治脑水肿
- B. 确保循环功能稳定
- C. 恢复呼吸功能
- D. 减轻酸中毒
- E. 防治肾衰竭

正确答案: C

参考解析: 初期复苏的第一和第二步骤是让呼吸道通畅和人工呼吸。

(38.)为了及早发现慢性心房颤动病人电复律术后的严重并发症, 最主要的观察项目是

- A. 饮食情况
- B. 血压改变
- C. 意识状态的改变
- D. 尿量变化
- E. 心理反应

正确答案： C

参考解析：通过对意识状态的观察，可发现严重并发症，如心室颤动、脑梗死等。

(39.)急性心肌梗死患者的护理措施中，最重要的一项是

- A. 记24小时出入量
- B. 盐水灌肠，促进排便
- C. 立即鼻导管吸氧
- D. 进行心理疏导
- E. 心电监护

正确答案： E

参考解析：急性期进行心电图、血压、呼吸监护，密切观察生命体征变化和心功能变化，防止并发症的发生。

(40.)排卵前宫颈黏液会

- A. 分泌量减少
- B. 氯化钠含量低
- C. 延展性差，拉丝易断裂
- D. 呈稀薄、透明似蛋清状
- E. 黏液涂片检查可见卵圆体

正确答案： D

参考解析：排卵前随雌激素水平不断增高，宫颈黏液分泌量逐渐增多，变稀薄透明，有利于精子通行。取黏液涂于玻片，干燥后可见羊齿植物叶状结晶。

(41.)预后较差的过敏性紫癜临床表现类型是

- A. 单纯型
- B. 肾型
- C. 腹型
- D. 关节型
- E. 混合型

正确答案： B

参考解析：过敏性紫癜一般预后良好，肾型病人预后主要与肾脏病变有关，多数病例仅有轻度肾损害，能逐渐恢复，少数可转为慢性肾炎或肾病综合征，预后较差。

(42.)外阴尖锐湿疣不正确的处理方式是

- A. 病灶小可用三氯醋酸涂局部

- B. 手术治疗
- C. 可用冷冻
- D. 刺割疣体
- E. CO₂激光治疗

正确答案： D

参考解析：外阴尖锐湿疣治疗原则以局部用药为主，常用药物为三氯醋酸、5% 氟尿嘧啶等，也可用冷冻治疗、CO₂激光治疗，大的尖锐湿疣可行手术切除。

(43.) 含铁最少的食物是

- A. 动物肝脏
- B. 猪肉
- C. 香菇
- D. 牛奶
- E. 海带

正确答案： D

参考解析：含铁较丰富的食物有肉类、肝、蛋黄、豆类、海带、香菇等，而乳类含铁最低。

(44.) 下列能利于炎性渗液局限在盆腔，减少毒素吸收的护理措施是

- A. 准确记录 24 小时出入量
- B. 胃肠减压
- C. 维持水、电解质及酸碱平衡
- D. 半卧位
- E. 妥善固定各种引流管，保持通畅

正确答案： D

参考解析：盆腔腹膜吸收能力弱，半卧位可以使炎性渗出液局限在盆腔，减少毒素吸收。

(45.) 输卵管绝育手术临床最常选择的结扎部位是输卵管

- A. 伞端
- B. 峡部
- C. 壶腹部
- D. 宫角部
- E. 间质部

正确答案： B

参考解析：输卵管绝育手术，最常选择的结扎部位是输卵管的峡部。

(46.) 不是甲状腺危象临床表现的是

- A. 厌食、呕吐、大汗
- B. 焦虑、烦躁甚至昏迷
- C. 心动过速
- D. 心率加快 140~240 次/分

E. 体温正常

正确答案： E

参考解析：甲状腺功能亢进危象病人会有高热症状。

(47.)肝癌术后护理不正确的是

- A. 密切观察生命体征及重要脏器功能变化
- B. 做好引流管的护理
- C. 不鼓励早期下床活动
- D. 饮食以低蛋白质为主
- E. 术后 24 小时平卧位

正确答案： D

参考解析：肝癌术后病人应以高蛋白质饮食为主。

(48.)左侧心力衰竭患者早期出现的典型表现是

- A. 呼吸困难
- B. 颈静脉怒张
- C. 乏力、头晕
- D. 双下肢水肿
- E. 发绀、心悸

正确答案： A

参考解析：劳力性呼吸困难是左侧心力衰竭最早出现的症状。

(49.)正常产褥期为

- A. 3 周
- B. 5 周
- C. 6 周
- D. 7 周
- E. 10 周

正确答案： C

参考解析：从胎盘娩出至产妇除乳腺外全身各器官恢复至非孕期状态的一段时期称为产褥期，一般为 6 周。

(50.)初孕妇，29 岁，妊娠 37+3 周，破水 4 小时来急诊室。检查：血压 14/10kPa(110/75mmHg)，头高浮，胎心 100 次/分。对该患者最佳的处理是

- A. 立即行 B 超检查
- B. 孕妇可自行活动
- C. 吸氧，左侧卧位，急诊室观察
- D. 用平车推送病人到病房住院观察
- E. 行阴道检查

正确答案： D

参考解析：胎膜破裂后，胎先露部未衔接者绝对卧床休息，住院待产，侧卧位，抬高臀部，以防脐带脱垂。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/566054120023011105>