

2024 年广西壮族自治区富川瑶族自治县《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题（培优 B 卷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 关于利伐沙班注意事项的描述，不正确的是()

- A: 用药期间需定期测定血红蛋白
- B: 如伤口已止血，首次用药应于术后立即给药
- C: 对于不同的手术选择的疗程不同
- D: 用药过量可导致出血并发症

答案：B

2. 细胞内液的主要阳离子是

- A: 镁
- B: 钠
- C: 钾
- D: 钙

答案：C

3. 属于水杨酸类解热镇痛药的是

- A: 阿糖腺苷
- B: 布洛芬
- C: 阿司匹林
- D: 对氨基水杨酸钠

答案：C

4. 适用于心功能比较稳定的 II ~ III 级心力衰竭患者的是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 米力农
- C: 氯沙坦
- D: 卡维地洛

答案: D

5. 使血小板内环磷酸腺苷 (cAMP) 增多的抗血小板药物是

- A: 替罗非班
- B: 双嘧达莫
- C: 阿司匹林
- D: 替格瑞洛

答案: B

6. 以下抗寄生虫药的使用方法错误的是

- A: 氯硝柳胺驱牛带绦虫和猪带绦虫应空腹吞服
- B: 蛲虫病易自身重复感染，故在阿苯达唑治疗 2 周后应重复治疗一次
- C: 左旋咪唑驱蛔虫空腹或睡前顿服
- D: 阿苯达唑治疗蛲虫病一次即为一疗程，药片需用水吞服

答案: A

7. 与长春新碱合用可增强神经毒性

- A: 铂类
- B: 异烟肼
- C: 非格司亭
- D: 替尼泊苷

答案: D

8. (2016 年真题) 哮喘急性发作首选的治疗药物是

- A: 白三烯受体阻断剂
- B: 短效 β_2 受体激动剂
- C: 磷酸二酯酶抑制剂
- D: 吸入性糖皮质激素

答案: B

9. 链激酶应用过量可选用的拮抗药是()

- A: 氨基己酸
- B: 鱼精蛋白
- C: 维生素 K
- D: 葡萄糖酸钙

答案: A

10. 属于 DPP-4 抑制剂的药物是

- A: 阿格列汀
- B: 伏格列波糖
- C: 利拉鲁肽
- D: 那格列奈

答案: A

11. 利多卡因

- A: 可治疗阵发性室上性心动过速
- B: 为窄谱抗心律失常药，仅用于室性心律失常
- C: 可用于房颤的复律治疗和复律后的维持
- D: 可治疗房性期前收缩

答案: B

12. 地高辛与其合用，可使血清地高辛浓度增加 70%~100% 的药物是

- A: 阿托品
- B: 胺碘酮
- C: 阿利吉仑
- D: 沙库巴曲缬沙坦

答案：B

13. 对急性心肌梗死引起的室性心律失常有效，对室上性心律失常基本无效的药物是()

- A: 地高辛
- B: 利多卡因
- C: 苯妥英钠
- D: 胺碘酮

答案：B

14. 应用强心苷期间或停用后 7 日内不宜使用的药物是

- A: 枸橼酸钾
- B: 氯化钾
- C: 氯化钙
- D: 氯化钠

答案：C

15. 关于 NSAIDS 类药物所致不良反应的说法，正确的是()

- A: 非选择性 NSAIDS 类药物导致的心血管风险高于选择性 COX-2 抑制剂
- B: 选择性 COX-2 抑制剂导致胃及十二指肠溃疡和出血的风险高于非选择性 NSAIDS 类药物
- C: 非选择性 NSAIDS 类药物可导致胃及十二指肠溃疡和出血等风险

D: NSAIDs 类药物所致的胃肠道不良反应中，以萎缩性胃炎最为常见

答案：C

16. 奥美拉唑主要用于治疗

A: 消化不良

B: 慢性便秘

C: 恶心、呕吐

D: 胃溃疡

答案：D

17. (2018 年真题) 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 (MRSA) 高检出率的医疗机构, 进行人工瓣膜置换术时, 为预防 MRSA 感染, 可选用 ()

A: 氨曲南

B: 青霉素 G

C: 万古霉素

D: 头孢唑林

答案：C

18. 患者，男，45 岁。以"间断巩膜黄染伴腹胀 2 年，加重 1 周"之主诉入院。患者 2 年前无明显诱因出现巩膜黄染，伴有腹胀，在当地医院诊断为酒精性肝硬化。1 周前患者上述症状加重，胃镜检查：胃溃疡(A

A: 治疗肝硬化

B: 缓解腹胀

C: 治疗胃溃疡

D: 预防消化道出血

答案：C

19. 易通过血脑屏障的抗真菌药物是

- A: 氟康唑
- B: 酮康唑
- C: 咪康唑
- D: 克霉唑

答案：A

20. 高血压伴甲状腺功能亢进者宜选用

- A: 硝苯地平
- B: 尼莫地平
- C: 利血平
- D: 普萘洛尔

答案：D

21. 用于肾病的氨基酸制剂的是

- A: 复方氨基酸注射液（6AA）
- B: 复方氨基酸注射液（18AA）
- C: 复方氨基酸注射液（9AA）
- D: 赖氨酸注射液

答案：C

22. 患者，女，41 岁，因进食不洁食物后发生腹泻，伴有恶心、呕吐及下腹痛，大便每日 6~8 次，为糊状或稀水状，伴有黏液。血常规检查提示：白细胞计数、中性粒细胞百分比明显升高。粪常规：白细胞 8~10/HP，红细胞 3~5/HP。诊断：急性腹泻。医嘱：复方地芬诺酯片，2 片，口服，3 次/日；诺氟沙星胶囊，300mg，口服，2 次/日。

- A: 平衡消化道正常菌群，提高免疫功能
- B: 吸附消化道内气体和各种病原体、毒素
- C: 修复消化道黏膜

D: 作用于肠壁的阿片受体，抑制肠蠕动

答案：D

23. 可使人体对维生素 B2 的需求增加的是

A: 丙磺舒

B: 雌激素

C: 糖皮质激素

D: 异烟肼

答案：A

24. 伏格列波糖的降糖作用机制是

A: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

B: 直接补充胰岛素

C: 竞争性抑制 α 葡萄糖苷酶

D: 提高靶组织对胰岛素的敏感性

答案：C

25. 对 M3 受体选择性高，可避免心脏及中枢神经系统的严重不良反应，用于治疗膀胱过度活动症用药的是

A: 托特罗定

B: 索利那新

C: 黄酮哌酯

D: 奥昔布宁

答案：B

26. 疗效高，生效快，主要用于

A: 氯喹

B: 乙胺嘧啶

C: 伯氨喹

D: 甲氟喹

答案: A

27. 干扰核酸生物合成的药物是()

A: 多柔比星

B: 高三尖杉酯碱

C: 顺铂

D: 氟尿嘧啶

答案: D

28. (2018 年真题) 急性化脓性中耳炎的局部治疗方案, 正确的是 ()

A: 鼓膜穿孔前可使用 2% 酚甘油滴耳, 鼓膜穿孔后先以无耳毒性的抗生素滴耳液抗感染, 再用 3% 过氧化氢溶液清洗外耳道, 以防止进一步感染

B: 鼓膜穿孔前可使用 3% 过氧化氢溶液清洗外耳道, 鼓膜穿孔后可用 2% 酚甘油滴耳, 再用无耳毒性的抗生素滴耳液治疗

C: 鼓膜穿孔前可使用 2% 酚甘油滴耳, 鼓膜穿孔后可先用 3% 过氧化氢溶液清洗外耳道脓液, 再用无耳毒性的抗生素滴耳液治疗

D: 鼓膜穿孔前可先用 3% 过氧化氢溶液彻底清洗外耳道脓液, 再用无耳毒性的抗生素滴耳液, 鼓膜穿孔后可使用 2% 的酚甘油滴耳继续治疗

答案: C

29. 唑类抗真菌药()

A: 阿莫罗芬

B: 氟康唑

C: 特比萘芬

D: 两性霉素

答案：B

30. 紫杉醇抗肿瘤的作用机制是()

- A: 干扰微管蛋白的合成
- B: 直接抑制拓扑异构酶, 并与拓扑异构酶形成复合物
- C: 与 DNA 发生共价结合, 使其失去活性或使 DNA 分子发生断裂
- D: 抑制二氢叶酸还原酶, 使二氢叶酸不能被还原成四氢叶酸

答案：A

31. 硫脲类最重要的不良反应是

- A: 粒细胞下降
- B: 甲状腺素
- C: 丙硫氧嘧啶
- D: 血管神经性水肿

答案：A

32. 与 PABA 竞争细菌二氢叶酸合成酶而发挥作用的是

- A: 氨基糖苷类
- B: 青霉素类
- C: 喹诺酮类
- D: 磺胺类

答案：D

33. 关于地西泮的作用特点，叙述错误的是

- A: 可增强其他中枢抑制药的作用
- B: 小于镇静剂量时即有抗焦虑作用
- C: 剂量加大可引起麻醉
- D: 有良好的抗癫痫作用

答案：C

34. 地高辛最适合用于

- A: 急性心力衰竭
- B: 心律失常
- C: 急、慢性心衰并房颤
- D: 肺源性心脏病

答案：C

35. 鲑降钙素对骨质疏松症进行治疗期间，为防继发性甲状旁腺功能亢进需要补充

- A: 维生素 D
- B: 铁剂
- C: 双膦酸盐类骨吸收抑制剂
- D: 钙剂

答案：D

36. 肾毒性大的是

- A: 阿莫西林
- B: 头孢噻肟
- C: 头孢哌酮
- D: 庆大霉素

答案：D

37. （2016 年真题）没有镇静和“宿醉”现象，不属于巴比妥类和苯二氮类的镇静催眠药是

- A: 地西泮
- B: 佐匹克隆

C: 异戊巴比妥

D: 阿普唑仑

答案: B

38. 治疗流行性脑脊髓膜炎的首选药物是

A: 青霉素

B: 氯霉素

C: 红霉素

D: 磺胺嘧啶

答案: D

39. 放线菌素 D 的主要作用环节在

A: G

B: G

C: S 期

D: M 期

答案: B

40. (2017 年真题) 5 岁以下儿童首选的散瞳剂是 ()

A: 2%后马托品眼膏剂

B: 1%硫酸阿托品眼膏剂

C: 四环素可的松眼膏剂

D: 10%去氧肾上腺素滴眼剂

答案: B

41. 可用于治疗铜绿假单胞菌感染的药物是 ()

A: 头孢呋辛

B: 头孢他啶

C: 头孢唑林

D: 头孢米诺

答案：B

42. 患者，男，45 岁。近来饭后出现上腹疼痛，胃镜检查后诊断为幽门螺杆菌感染所致的“胃溃疡”，与抗生素合用根除幽门螺杆菌治疗的是

A: 东莨菪碱

B: 泮托拉唑

C: 雷尼替丁

D: 昂丹司琼

答案：B

43. 某患者，63 岁，诊断为“慢性支气管炎急性发作”，痰培养为“铜绿假单胞菌”，下列哪种药物对铜绿假单胞菌无效()

A: 头孢哌酮

B: 哌拉西林

C: 头孢克洛

D: 头孢他啶

答案：C

44. 为预防甲氨蝶呤所致的肾毒性，在化疗期间，除大量水化和利尿外，还应同时给予的尿路保护剂是

A: 氯喹酮

B: 坦洛新

C: 呋塞米

D: 美司钠

答案：D

45. 属于 PDE5 抑制剂的禁忌人群的是

- A: 中度的充血性心力衰竭
- B: 2 周前发生过心肌梗死或脑卒中
- C: 高血压未得到控制者
- D: 轻度、稳定型心绞痛

答案：C

46. 假膜性肠炎或食物中毒应首选的微生态制剂是()

- A: 双歧三联活菌
- B: 枯草杆菌
- C: 粪肠球菌
- D: 酪酸菌

答案：D

47. 可掩盖顺铂所致的耳鸣、眩晕等症状的药物是

- A: 呋塞米
- B: 丙磺舒
- C: 苯海拉明
- D: 甲氨蝶呤

答案：C

48. 须用专属性极强的解毒剂右雷佐生保护心肌的药物是

- A: 曲妥珠单抗
- B: 吉非替尼
- C: 多柔比星
- D: 环磷酰胺

答案：C

49. 可能引起持续性干咳的抗高血压药是

- A: 氨氯地平
- B: 阿利克仑（阿利吉仑）
- C: 硝普钠
- D: 阿托普利

答案：D

50. 治疗流行性细菌性脑膜炎最合适的联合用药是()

- A: 青霉素+克林霉素
- B: 青霉素+磺胺嘧啶
- C: 青霉素+链霉素
- D: 青霉素+四环素

答案：B

51. 弱效(使 LDL-ch 水平降低<30%)的他汀类调血脂药是()

- A: 大剂量阿托伐他汀
- B: 小剂量阿托伐他汀
- C: 依折麦布
- D: 小剂量氟伐他汀

答案：D

52. 西米替丁的作用原理是

- A: 阻断 H₂ 受体
- B: 阻断 β 受体
- C: 阻断 β 受体
- D: 阻断 H₁ 受体

答案：A

53. 患者男性，56 岁。有糖尿病史 15 年，近日并发肺炎，呼吸 35 次/分，心率 105 次/分，血压 160/90mmHg，呼出气体有丙酮味，意识模糊，尿酮呈强阳性，血糖 500mg/dl，诊断为糖尿病酮症酸中毒。

- A: 舌下含服
- B: 静脉
- C: 皮下
- D: 口服

答案：B

54. 青霉素用于()

- A: 鼠疫、土拉菌病
- B: 布鲁菌病
- C: 钩端螺旋体病
- D: 伤寒、副伤寒

答案：C

55. 妨碍铁剂在肠道吸收的物质是()

- A: 食物中的高磷、鞣酸等
- B: 枸橼酸钠
- C: 食物中的半胱氨酸
- D: 维生素 C

答案：A

56. 促进微管的装配，抑制其解聚，从而使纺锤体失去正常功能，细胞有丝分裂停止的药物是

- A: 吲哚美辛
- B: 长春碱类

C: 紫杉醇

D: 他莫昔芬

答案: C

57. 关于硫黄软膏治疗疥疮的用法，错误的是

A: 对顽固患者必需 3 个疗程方能根治

B: 儿童可使用 5% 的软膏

C: 用药期间应勤用热水洗澡

D: 密切接触者应同时接受治疗

答案: C

58. 小剂量时有抑制血栓形成作用的是

A: 阿司匹林

B: 塞来昔布

C: 对乙酰氨基酚

D: 吲哚美辛

答案: A

59. (2016 年真题) 属于神经激肽-1 受体阻断剂的止吐药是

A: 维生素 B6

B: 托烷司琼

C: 阿瑞吡坦

D: 甲氧氯普胺

答案: C

60. 止吐方案: 每日化疗前，联合应用 5-HT₃ 受体阻断剂和口服地塞米松 12mg，化疗后从第 2 日到第 3 日口服地塞米松或应用 5-HT₃

A: 重度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐

- B: 微弱致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐
- C: 中度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐
- D: 低度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐

答案：C

61. 可用于慢性活动性肝炎的治疗()

- A: 精氨酸
- B: 赖氨酸
- C: 复方氨基酸注射液(3AA)
- D: 复方氨基酸注射液(18AA)

答案：C

62. 毒性较大，尤其对第Ⅷ对脑神经和肾损害严重的药物是

- A: 卡那霉素
- B: 异烟肼
- C: 对氨基水杨酸
- D: 利福平

答案：A

63. 呋塞米与抗组胺药合用时

- A: 耳毒性增加
- B: 低氯性碱中毒机会增加
- C: 利尿作用减弱
- D: 引起电解质紊乱的概率增加

答案：A

64. (2019 年真题) 为预防大剂量环磷酰胺引起的膀胱毒性，在充分水化、利尿的同时，还应给予的药物是()

- A: 氯化钾
- B: 螺内酯
- C: 二甲双胍
- D: 美司钠

答案：D

65.（2015 年真题）李女士来到药房咨询，主诉最近服用下列药品后体重有所增加，请药师确认可能增加体重的药品是（）。

- A: 二甲双胍
- B: 辛伐他汀
- C: 米氮平
- D: 阿司匹林

答案：C

66.（2016 年真题）属于延长动作电位时程的抗心律失常药是

- A: 利多卡因
- B: 硝酸甘油
- C: 索他洛尔
- D: 美托洛尔

答案：C

67. 属于甲状腺激素类药的是

- A: 甲巯咪唑
- B: 生长抑素
- C: 左甲状腺素
- D: 醋酸去氨加压素

答案：C

68. 西咪替丁治疗十二指肠溃疡的机制为

- A: 阻断胃腺壁细胞上的组胺 H2 受体，抑制胃酸分泌
- B: 形成保护膜覆盖溃疡面
- C: 中和过多的胃酸
- D: 阻断胃腺壁细胞上的组胺 H1 受体，抑制胃酸分泌

答案：A

69. 黄体酮属于

- A: 皮质激素
- B: 孕激素
- C: 雌激素
- D: 雄性激素

答案：B

70. 大量用药可致球后视神经炎的药物是

- A: 吡嗪酰胺
- B: 红霉素
- C: 异烟肼
- D: 乙胺丁醇

答案：D

71. 应用最广泛的口服抗凝血药是

- A: 维生素 K
- B: 肝素
- C: 华法林
- D: 达比加群酯

答案：C

72. 属于雌激素类，用于补充雌激素不足的药品是()

- A: 依普黄酮
- B: 地屈孕酮
- C: 他莫昔芬
- D: 戊酸雌二醇

答案：D

73. (2015 年真题) 属于芳香氨酶抑制剂的抗肿瘤药是 ()。

- A: 丙酸睾酮
- B: 炔雌醇
- C: 阿那曲唑
- D: 他莫昔芬

答案：C

74. 对革兰阳性菌作用弱，而对革兰阴性菌作用强的药物是

- A: 第三代头孢菌素
- B: 第四代头孢菌素
- C: 第一代头孢菌素
- D: 第二代头孢菌素

答案：A

75. 对淋病、梅毒可作为首选的是

- A: 土霉素
- B: 红霉素
- C: 氯霉素
- D: 青霉素

答案：D

76. 应用华法林时，为掌握好剂量，应测定

- A: 凝血酶原时间
- B: 出血时间
- C: 凝血时间
- D: 部分凝血活酶时间

答案：A

77. 属于雄激素类的是()

- A: 睾酮
- B: 甲羟孕酮
- C: 他莫昔芬
- D: 己烯雌酚

答案：A

78. (2016 年真题) 脂溶性较高，起效快，属于巴比妥类的镇静催眠药是

- A: 佐匹克隆
- B: 异戊巴比妥
- C: 阿普唑仑
- D: 地西泮

答案：B

79. 磺胺类药物应用于新生儿会导致

- A: 血小板减少
- B: 黄疸
- C: 腹部不适
- D: 静脉炎

答案：B

80. (2019 年真题) 关于右美沙芬药理作用及临床评价的说法，正确的是 ()

- A: 通过阻断肺-胸膜的牵张感受器产生的肺迷走神经反射而起到镇咳作用
- B: 镇咳作用弱于可待因
- C: 口服吸收缓慢，主要经肝脏代谢，作用时间长
- D: 主要用于干咳，但左旋右美沙芬有镇痛作用

答案: D

81. 属于钠通道阻滞剂的抗心律失常药的是 ()。

- A: 利多卡因
- B: 硝酸甘油
- C: 索他洛尔
- D: 美托洛尔

答案: A

82. 某些慢性疾病使用地塞米松长期治疗，为减少外源性激素对下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴的抑制，推荐给药时间是

- A: 中午 12 时左右
- B: 下午 4 时左右
- C: 空腹
- D: 上午 8 时左右

答案: D

83. 奈韦拉平的作用靶点是

- A: HIV-1 和 HIV-2 蛋白酶
- B: 脱氧核糖核酸聚合酶

C: 神经氨酸酶

D: HIV-1 反转录酶

答案: D

84. 可抑制花生四烯酸转化为白三烯()

A: 异维 A 酸

B: 过氧苯甲酰

C: 维 A 酸

D: 阿达帕林

答案: D

85. 有指南推荐，为减少手术中和手术后出血风险，择期手术前需提前停用阿司匹林

A: 4~6 日

B: 1~3 日

C: 11~15 日

D: 7~10 日

答案: D

86. 与长春新碱合用可增强第Ⅷ对脑神经障碍

A: 替尼泊苷

B: 铂类

C: 异烟肼

D: 非格司亭

答案: B

87. 下列唯一被批准用于临床的选择性胆固醇吸收抑制剂是

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 盐酸

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/566145100101011030>