

医学检验科住院医师：消化内科考试资料

1、单选 男，56岁。突发性右侧肢体无力半天，伴头痛、呕吐，解黑粪2次。有高血压和糖尿病史5年。黑粪原因很可能是（）

- A. 食管癌
- B. 胃癌
- C. 胃溃疡
- D. 急性胃黏膜病变
- (江南博哥) E. 胃底静脉曲张破裂出血

**正确答案：**D

2、单选 上消化道出血最常见的原因是（）

- A. 消化性溃疡
- B. 食管静脉曲张
- C. 急性糜烂出血性胃炎
- D. 胃癌
- E. 食管癌

**正确答案：**A

3、判断题 A型胃炎（慢性胃体胃炎）与自身免疫有关。

**正确答案：**对

4、单选 溃疡性结肠炎的病变分布特征是（）

- A. 连续性
- B. 跳跃性
- C. 节段性
- D. 局限性
- E. 全层性

**正确答案：**A

5、判断题 幽门螺杆菌感染的途径是：口一口、粪一口途径及医源性传播，如胃镜检查/活检等。

**正确答案：**对

6、多选 大肠癌的癌前疾病包括（）

- A. 大肠息肉
- B. 大肠憩室
- C. 溃疡性结肠炎
- D. 肠结核
- E. 血吸虫肠病

**正确答案：**A, C

7、单选 约有10%~30%的原发性肝癌患者可出现低血糖症，其原因是（）

- A. 并发糖尿病
- B. 进食过少

- C. 肝脏合成糖原障碍
- D. 癌细胞异位分泌胰岛素或胰岛素样物质
- E. 以上均不是

**正确答案：D**

8、单选 男，20岁，晨起突然呕吐咖啡色液体2h，既往健康。查体：血压90/60mmHg。神志清，腹平软，无压痛，肝脾肋下未及。血液检查下列哪项指标最可能会升高（）

- A. 白细胞
- B. 红细胞
- C. 尿素氮
- D. 肌昔
- E. 球蛋白

**正确答案：C**

9、单选 男，58岁，进行性贫血、消瘦、乏力半年，有时右腹隐痛，无腹泻。查体：右中腹部可扪及肿块。此例患者首选的治疗方法是（）

- A. 介入治疗
- B. 放射治疗
- C. 内镜治疗
- D. 手术治疗
- E. 化学药物治疗

**正确答案：D**

10、单选 原发性肝癌（）

- A. 肝脾肿大
- B. 肝大，脾缩小
- C. 肝缩小，脾大
- D. 肝脾缩小
- E. 肝脾正常

**正确答案：A**

11、单选 下列选项不是肝性脑病诱发因素的是（）

- A. 麻醉剂应用
- B. 低盐饮食
- C. 放腹水
- D. 利尿剂应用
- E. 消化道出血

**正确答案：B**

12、单选 下列关于肝硬化的说法，错误的是（）

- A. 肝炎后肝硬化多数为大结节性肝硬化
- B. 酒精本身对肝有直接损害作用

- C. 血吸虫肝硬化应称为血吸虫病性肝纤维化
- D. 高浓度胆酸及胆红素对肝细胞有损害作用
- E. 慢性充血性心力衰竭导致淤血性肝硬化

**正确答案：**B

13、单选 女，40岁，乙肝肝硬化5年，3d前突然出现呕血，鲜红色，量约1000ml。伴头晕、心慌、出冷汗等。经输血、补液和止血治疗后病情好转。1d前起出现睡眠障碍，伴幻听和言语不清。化验检查示：血氨 $130\mu\text{g/dl}$ ，血糖 $5.6\text{mmol/L}$ ，尿素氮 $7.2\text{mmol/L}$ 。如果再出血，首选治疗药物是（）

- A. 奥美拉唑
- B. 凝血酶
- C. 巴曲酶（立止血）
- D. 垂体后叶素
- E. 氨甲环酸

**正确答案：**D

14、多选 下消化道出血的治疗下列哪些是正确的（）

- A. 奥美拉唑静脉滴注
- B. 生长抑素静脉滴注
- C. 凝血酶灌肠
- D. 动脉栓塞
- E. 三腔二囊管压迫

**正确答案：**B, C, D

15、单选 下列有关穿透性消化溃疡的叙述，错误的是（）

- A. 常伴有上腹剧烈疼痛
- B. 十二指肠球部后壁多见
- C. 胃后壁溃疡易穿透到腹后壁
- D. 常伴有局限性腹膜炎
- E. 一般无胃或十二指肠内容物流入腹膜腔

**正确答案：**C

16、单选 男性，25岁，上腹剧痛6h，伴呕吐、低热，发病前有酗酒史。体查：腹平软，脐周压痛，化验血清淀粉酶 $500\text{mmol/L}$ （Somogyi法）。最重要的处理是（）

- A. 禁食和胃肠减压
- B. 进食少量水或稀饭
- C. 给服吗丁啉
- D. 给予654-2
- E. 给予氨苄青霉素

**正确答案：**A

17、多选 消化性溃疡的特殊类型包括（）

- A. 复合溃疡
- B. 幽门管溃疡
- C. 球后溃疡
- D. 巨大溃疡
- E. 老年人溃疡

**正确答案：**A, B, C, D, E

18、判断题 食管测压是诊断胃食管反流病最准确的方法。

**正确答案：**错

19、单选 溃疡性结肠炎的病变大多位于（）

- A. 空肠
- B. 末段回肠
- C. 回盲部
- D. 全结肠
- E. 直肠、乙状结肠

**正确答案：**E

20、单选 食管癌恶性程度最高的是（）

- A. 髓质型
- B. 蕈伞型
- C. 溃疡型
- D. 缩窄型
- E. 未定型

**正确答案：**A

21、单选 原发性肝癌从出现症状到死亡一般为（）

- A. 1年
- B. 半年以上
- C. 3~6个月
- D. 1个月
- E. 2个月

**正确答案：**C

22、单选 男，60岁，结肠癌术后，术后病理示癌穿透浆膜层，肠系膜转移。术后治疗方案首选（）

- A. 3~6个月后复查结肠镜
- B. 生物治疗
- C. 放疗
- D. 以氟尿嘧啶为主的化疗
- E. 以羟基喜树碱为主的化疗

**正确答案：**D

23、单选 男性，50岁，4年前诊断为肝硬化，近半个月感腹胀，下肢水肿。今日吃花生后1h，自觉心慌、冷汗，吐出暗红色血约200ml，内有血块，解柏油样便700ml，急诊入院。查体：Bp60 / 40mmHg，HR130次 / min，肠鸣音活跃。抢救时，首先应采取哪项措施（）

- A. 胃镜下套扎食管曲张静脉
- B. 紧急手术
- C. 静滴施他宁
- D. 快速输血、输液，补充血容量
- E. 去甲肾上腺素加冰生理盐水口服

**正确答案：D**

24、单选 男，58岁，上腹痛1个月。既往有胃溃疡病史20年。胃镜：胃角2.0cm×2.0cm溃疡。给予质子泵抑制药治疗8周，症状缓解，复查胃镜：胃角1.2cm×1.2cm溃疡。治疗失败最可能的原因是（）

- A. 特殊溃疡
- B. 溃疡癌变
- C. 非消化性溃疡
- D. 药物疗程不足
- E. 药物选择错误

**正确答案：B**

25、单选 兼具保护胃黏膜和抗幽门螺杆菌作用的是（）

- A. 奥美拉唑
- B. 法莫替丁
- C. 阿莫西林
- D. 硫糖铝
- E. 枸橼酸铋钾

**正确答案：E**

26、单选 男，45岁，受凉后胸痛1个月，伴烧心、咳嗽，体检：心肺听诊无异常，腹软，无压痛和反跳痛。其治疗方法首选（）

- A. 饮食治疗
- B. 体育锻炼
- C. 药物治疗
- D. 内镜治疗
- E. 手术治疗

**正确答案：C**

27、单选 晚期胃癌的主要转移方式是（）

- A. 淋巴转移
- B. 血行转移
- C. 直接蔓延

## D. 种植转移

E. 肝内转移

**正确答案：** B

28、多选 急性糜烂出血性胃炎的常见病因有（）

A. 药物

B. 幽门螺杆菌

C. 应激

D. 乙醇

E. 食物

**正确答案：** A, C, D

29、单选 反流性食管炎患者的正确做法是（）

A. 半卧位

B. 提高床头

C. 服用钙拮抗药

D. 餐后立即卧床

E. 高脂肪饮食

**正确答案：** B

30、单选 肝性脑病治疗主要是减少肠道氨的生成和吸收，一般首选（）

A. 乳酸菌

B. 果糖

C. 乳果糖

D. 头孢菌素

E. 乳酸

**正确答案：** C

31、单选 急性胰腺炎血清淀粉酶升高一般在发病后（）

A. 6~12h

B. 12~24h

C. 24~36h

D. 36~48h

E. 18~24h

**正确答案：** A

32、单选 女，40岁，确诊为急性胰腺炎，内科正规治疗2周后体温仍在38~39℃，左上腹部压痛明显。尿淀粉酶256U/L，血白细胞 $16 \times 10^9/L$ ，可能性最大的是（）

A. 病情迁延未愈

B. 并发胰腺脓肿

C. 并发胰腺假性囊肿

D. 败血症

E. 合并急性胆囊炎

**正确答案：**B

33、判断题 十二指肠可见于中老年，胃溃疡多见于青壮年。

**正确答案：**错

34、单选 对于肠结核有诊断意义的病理改变是（）

- A. 渗出性炎症
- B. 慢性溃疡
- C. 干酪样坏死性肉芽肿
- D. 纤维组织增生
- E. 血管内膜炎

**正确答案：**C

35、单选 门脉高压症发生消化道出血的主要原因是（）

- A. 痔静脉曲张
- B. 脾肿大破裂
- C. 腹壁静脉曲张
- D. 食管下段和胃底静脉曲张
- E. 胃黏膜广泛糜烂

**正确答案：**D

36、判断题 肝硬化患者胃黏膜可见淤血、水肿和糜烂，呈马赛克或蛇皮样改变，称为门脉高压性胃病。

**正确答案：**对

37、单选 女，18岁。低热、腹痛、腹泻伴腹胀2个月。查体：腹壁揉面感，移动性浊音阳性。腹水为渗出液。最有价值诊断的检查是（）

- A. 血培养
- B. 腹水细菌培养
- C. 卡介苗试验
- D. 血沉
- E. 腹膜活检

**正确答案：**E

38、单选 女，32岁，腹胀、腹泻与便秘交替半年，常有午后低热，夜间盗汗。体检：腹壁柔韧感，轻度压痛，肝脾未触及，腹水征（+）。腹水检验：比重1.018，蛋白25g/L。白细胞 $0.7 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.30，淋巴0.70，红细胞 $0.3 \times 10^9/L$ 。最可能的诊断是（）

- A. 原发性腹膜炎
- B. 结核性腹膜炎
- C. 癌性腹膜炎
- D. 巨大卵巢囊肿
- E. 肝静脉阻塞综合征

**正确答案：**B

39、单选 男，26岁，反复上腹痛伴反酸10年，近半个月出现呕吐隔夜食物。其呕吐物的性状最可能为（）

- A. 黄绿色液体
- B. 血性液体
- C. 带粪臭味
- D. 咖啡色样液体
- E. 发酵酸性宿食

**正确答案：**E

40、单选 肝硬化患者出现血性腹水首先应考虑合并（）

- A. 原发性腹膜炎
- B. 肝肾综合征
- C. 肝性脑病
- D. 门静脉血栓形成
- E. 原发性肝癌

**正确答案：**E

41、单选 肝性脑病的发病机制最有证据的学说是（）

- A. 氨中毒
- B. 假性神经递质
- C.  $\gamma$ -氨基丁酸/苯二氮复合体学说
- D. 色氨酸
- E. 锰中毒

**正确答案：**A

42、单选 Grey-Turner征是指（）

- A. 上腹可扪及肿块，有肌紧张及反跳痛
- B. 明显腹胀，肠鸣音减弱或消失
- C. 急性胰腺炎时见两侧胁腹皮肤呈灰蓝色
- D. 急性胰腺炎时见脐周皮肤青紫
- E. 胆总管或壶腹部结石时出现黄疸

**正确答案：**C

43、单选 男，24岁。低热、右下腹痛、腹泻3个月。有时腹泻便秘交替。临床考虑克罗恩病。如果患者对复方新诺明过敏，治疗时下列哪种药物不能使用（）

- A. 甲硝唑
- B. 柳氮磺吡啶
- C. 羟氨苄青霉素
- D. 诺氟沙星
- E. 克拉霉素

**正确答案：**B

44、单选 男，42岁，腹痛1个月，上消化道钡剂提示胃溃疡。病因治疗最佳方案是（）

- A. 奥美拉唑
- B. 奥美拉唑+硫糖铝
- C. 奥美拉唑+阿莫西林+甲硝唑
- D. 奥美拉唑+硫糖铝+甲硝唑
- E. 奥美拉唑+头孢曲松+甲硝唑

**正确答案：**C

45、单选 男，48岁，上腹痛3个月。胃镜：胃溃疡。给予奥美拉唑治疗6周，症状缓解，复查胃镜溃疡未愈合。下列哪项提示为恶性溃疡（）

- A. 溃疡形状规则，一般较小
- B. 底部平坦，有黄白苔
- C. 周围皱襞规则
- D. 边缘呈结节状隆起
- E. 胃壁僵硬，蠕动快

**正确答案：**D

46、单选 慢性萎缩性胃炎B型的病变主要在（）

- A. 胃底
- B. 胃角
- C. 胃体
- D. 胃窦
- E. 幽门

**正确答案：**D

47、单选 女，20岁，因低热、腹痛诊断为结核性腹膜炎。近日来呕吐、腹胀，未解大便。查体：肠鸣音亢进。最可能的并发症是（）

- A. 肠穿孔
- B. 肠梗阻
- C. 肠出血
- D. 腹腔脓肿
- E. 中毒性肠麻痹

**正确答案：**B

48、单选 男，22岁，因呕吐咖啡色液体及黑粪来诊。既往无胃病及肝病史。查体：面色稍苍白，血压100/60mmHg，心率92/min，腹软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。检查方法首选（）

- A. 上消化道钡剂
- B. 胃镜检查
- C. 腹部CT
- D. 粪便隐血试验

E. B 型超声检查

**正确答案：** B

49、单选 食管癌易早期转移的是（）

- A. 髓质型
- B. 蕈伞型
- C. 溃疡型
- D. 缩窄型
- E. 未定型

**正确答案：** C

50、单选 诊断消化性溃疡首选（）

- A. 钡剂造影
- B. 胃镜检查
- C. 胃液分析
- D. 腹部 B 超
- E. 腹部 CT

**正确答案：** B

51、判断题 结核性腹膜炎的腹水常为以中性粒细胞为主的渗出液。

**正确答案：** 错

52、单选 早期大肠癌病变（）

- A. 一般局限于黏膜和黏膜下层
- B. 局限于黏膜层
- C. 只累及肌层
- D. 只累及浆膜层
- E. 累及全层

**正确答案：** A

53、单选 男，58 岁，反复上腹痛 5 年，近期出现纳差、早饱、消瘦、食欲减退，服用胃药疗效差。该例诊断时最可能的疾病是（）

- A. 慢性胃炎
- B. 胃溃疡
- C. 胃癌
- D. 胃息肉
- E. 消化不良

**正确答案：** C

54、判断题 胃镜检查后 2h 左右，等麻醉作用消失后，可进温流质或半流质饮食，次日即可恢复正常饮食。

**正确答案：** 对

55、单选 胰头部癌的突出症状是（）

- A. 腹痛

- B. 消瘦
- C. 纳差
- D. 腹泻
- E. 黄疸

**正确答案：**E

56、判断题 早期食管癌按其形态可分为隐伏型、糜烂型、斑块型和乳头型，其中以糜烂型为最多见。

**正确答案：**错

57、单选 胃癌主要转移途径及部位是（）

- A. 种植于膀胱直肠窝
- B. 直接侵及横结肠
- C. 血性扩散至肝
- D. 转移至壁层腹膜
- E. 由淋巴管转移到淋巴结

**正确答案：**E

58、单选 男，58岁，进行性贫血、消瘦、乏力半年，有时右腹隐痛，无腹泻。查体：右中腹部可扪及肿块。此例男患者最可能的病变部位是（）

- A. 右半结肠
- B. 左半结肠
- C. 回肠
- D. 空肠
- E. 阑尾

**正确答案：**A

59、单选 女，40岁，乙肝肝硬化5年，3d前突然出现呕血，鲜红色，量约1000ml。伴头晕、心慌、出冷汗等。经输血、补液和止血治疗后病情好转。1d前起出现睡眠障碍，伴幻听和言语不清。化验检查示：血氨 $130\mu\text{g/dl}$ ，血糖 $5.6\text{mmol/L}$ ，尿素氮 $7.2\text{mmol/L}$ 。应该首先考虑的治疗方案是（）

- A. 抗生素
- B. 胰岛素
- C. 降氨药物
- D. 镇静药
- E. 血液透析

**正确答案：**C

60、单选 不典型部位发生的多发性、难治性胃十二指肠溃疡首先要考虑（）

- A. 胃癌
- B. 十二指肠癌
- C. 胃泌素瘤
- D. 间质瘤

E. 血管活性肠肽瘤

**正确答案：** C

61、单选 肝区疼痛、肝脏肿大、AFP 持续上升与转氨酶下降呈二曲线分离现象，应考虑为（）

- A. 慢性肝炎活动期
- B. 急性肝炎恢复期
- C. 肝脓肿
- D. 原发性肝癌
- E. 肝硬化

**正确答案：** D

62、单选 对鉴别肝癌和良性活动性肝病，下列检查最有帮助的是（）

- A. AFP 阳性
- B. AFP 阴性
- C. 肝功能严重损害
- D. HBV-DNA 阳性
- E. AFP 和 ALT 动态曲线

**正确答案：** E

63、单选 男，58 岁，肝炎病史 10 余年，乏力、纳差、腹胀 20d，诊断为肝炎后肝硬化（失代偿期）。肝功能示清蛋白降低，球蛋白增高。为治疗低蛋白血症，首选的血制品是（）

- A. 全血
- B. 新鲜冰冻血浆
- C. 普通冰冻血浆
- D. 冷沉淀
- E. 清蛋白

**正确答案：** E

64、单选 男，60 岁，反复上腹痛 5 年余，伴腹胀、嗝气、乏力、腹泻，ERCP 示胰管扭曲变形，局部狭窄。其治疗首选（）

- A. 气滞胃痛冲剂
- B. 多潘立酮（吗丁啉）
- C. 消炎利胆片
- D. 胃蛋白酶
- E. 胰酶

**正确答案：** E

65、单选 男，30 岁，腹痛、腹泻 3 个月，临床考虑溃疡性结肠炎。钡灌肠提示“慢性结肠炎”。最有诊断价值的大便性状是（）

- A. 稀水样便
- B. 柏油样便

- C. 果酱样便
- D. 黏液脓血便
- E. 血便

**正确答案：** D

66、单选 结核性腹膜炎最常见的直接原发病灶为（）

- A. 肺结核
- B. 肠结核
- C. 肝结核
- D. 肾结核
- E. 脾结核

**正确答案：** B

67、单选 男，42岁，右上腹痛伴发热3个月，查体：蜘蛛痣，肝肋下4cm，质硬，脾肋下2cm，白细胞 $4.8 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.6，ALT60U/L，AKP24IU/L。最可能的诊断是（）

- A. 慢性胆囊炎
- B. 肝脓肿
- C. 肝囊肿伴感染
- D. 慢性活动性肝炎
- E. 肝硬化合并肝癌

**正确答案：** E

68、单选 男，30岁，间歇性上腹痛2年，伴嗝气、纳差，受凉后加重，近2d疼痛加剧，突然呕血500ml，暗红色，解黑粪200ml，出血后腹痛缓解。最可能的出血原因是（）

- A. 慢性胃炎
- B. 消化性溃疡
- C. 急性胃黏膜病变
- D. 食管静脉曲张
- E. 胃癌

**正确答案：** B

69、单选 男，52岁，消瘦1个月，胃镜示中下段食管癌，胸部CT示纵隔淋巴结肿大，该患者的治疗方案首选（）

- A. 手术
- B. 化疗
- C. 放疗
- D. 生物治疗
- E. 内镜治疗

**正确答案：** C

70、单选 原发性肝癌最早转移的途径是（）

- A. 肝内转移
- B. 血行转移
- C. 淋巴转移
- D. 种植转移
- E. 以上均不是

**正确答案：**A

71、多选 下列哪些与肝硬化患者内分泌紊乱有关（）

- A. 男性乳房发育
- B. 蜘蛛痣
- C. 肝掌
- D. 面部皮肤色素沉着
- E. 脾大

**正确答案：**A, B, C, D

72、判断题 大部分急性胰腺炎患者在起病 24h 内血清淀粉酶超过正常值上限的 3 倍，血清淀粉酶升高可持续 3~5 天或更长时间，但在起病 48h 后高峰下降而尿淀粉酶升高。

**正确答案：**对

73、单选 诊断功能性消化不良必需病程超过（）

- A. 持续 1 周或累计超过 3 周
- B. 持续 1 个月或累计超过 3 个月
- C. 持续 4 个月或累计超过 2 个月
- D. 持续半年或累计超过 3 个月
- E. 持续 1 年或累计超过 3 个月

**正确答案：**B

74、单选 男，40 岁。饮酒后持续性上腹疼痛 12h，向腰背部放射，伴恶心、呕吐、发热，无血尿。在诊断尚未确立之前，不应采用的是（）

- A. 禁食、胃肠减压
- B. 吗啡类止痛药
- C. 胰酶抑制药
- D. 抗感染治疗
- E. 营养支持

**正确答案：**B

75、单选 原发性肝癌在我国消化系统肿瘤中居（）

- A. 第一位
- B. 第二位
- C. 第三位
- D. 第四位
- E. 第五位

**正确答案：** C

76、单选 治疗溃疡性结肠炎的有效药物是（）

- A. 克拉霉素
- B. 羟氨苄青霉素
- C. 柳氮磺吡啶
- D. 头孢曲松
- E. 氧氟沙星

**正确答案：** C

77、多选 奥美拉唑可以治疗上消化道出血的机制是（）

- A. pH 大于 6 时血小板的凝血功能才能发挥作用
- B. 刺激末梢血管收缩
- C. 促进凝血因子分泌
- D. 激活凝血蛋白活性
- E. 形成的凝血块在 pH 大于 5 时才不会 被胃液消化

**正确答案：** A, E

78、单选 上消化道出血常见的病因是（）

- A. 胆道疾病
- B. 食管胃底静脉曲张
- C. 消化性溃疡
- D. 慢性胃黏膜病变
- E. 慢性萎缩性胃炎

**正确答案：** C

79、单选 男，34 岁，反复腹泻、腹痛伴里急后重半年，脓血便，每天 3~4 次，在当地按“痢疾”治疗无明显效果。查体：贫血貌，腹软，左下腹轻压痛。以上症状首选的检查方法是（）

- A. 大便细菌培养
- B. 钡剂灌肠检查
- C. 结肠镜检查
- D. B 超腹部
- E. 腹部 CT

**正确答案：** C

80、判断题 酒精性肝炎的特征性酶学改变是 AST/ALT 常大于 2。

**正确答案：** 对

81、单选 女，22 岁，右下腹痛、腹泻 3 个月，伴有午后低热，夜间盗汗。体检：腹软，右下腹压痛，无反跳痛，肝脾未触及，腹水征（-）。最可能的诊断是（）

- A. 急性阑尾炎
- B. 克罗恩病

- C. 肠结核
- D. 结肠癌
- E. 阑尾类癌

**正确答案：C**

82、单选 判断幽门梗阻时，下列选项中最有意义的是（）

- A. 可见胃蠕动波
- B. 上腹部胀满不适
- C. 失水及代谢性碱中毒
- D. 胃震水音
- E. 呕吐大量隔夜酸酵宿食

**正确答案：E**

83、单选 男，20岁，解柏油样便2d，今晨突然晕倒，既往健康。查体：血压70/50mmHg，脉搏126/min。首选的急救措施是（）

- A. 急诊胃镜下止血
- B. 口服去甲肾上腺素
- C. 口服凝血酶
- D. 静滴抑酸药
- E. 补充血容量

**正确答案：E**

84、单选 男，52岁，进行性吞咽困难2个月，体重下降4kg，查体无阳性体征。该病人最可能的诊断是（）

- A. 食管憩室
- B. 食管平滑肌瘤
- C. 食管癌
- D. 贲门失弛缓症
- E. 反流性食管炎

**正确答案：C**

85、单选 中晚期食管癌的主要症状是（）

- A. 胸痛
- B. 呕吐
- C. 进行性咽下困难
- D. 消化道出血
- E. 贫血

**正确答案：C**

86、单选 男，24岁。低热、右下腹痛、腹泻3个月。有时腹泻便秘交替。临床考虑克罗恩病。如果确诊克罗恩病。最有诊断意义的病理改变是（）

- A. 纤维组织增生
- B. 黏膜炎症波及肌层

- C. 淋巴组织增生
- D. 非干酪样肉芽肿
- E. 淋巴管扩张

**正确答案：** D

87、判断题 血行转移是胃癌最常见的转移方式。

**正确答案：** 错

88、单选 男，30岁，肝区钝痛、低热、乏力3个月，有血吸虫疫水接触史，偶饮酒。查体：肝肋下2cm，质硬。HBsAg(+)，ALT60U/L，白/球比1.2，AFP先后检测2次，分别为200ng/ml和400ng/ml。诊断首先应考虑( )

- A. 慢性活动性肝炎
- B. 肝炎肝硬化
- C. 血吸虫病性肝纤维化
- D. 酒精性肝硬化
- E. 肝炎肝硬化合并原发性肝癌

**正确答案：** E

89、单选 男，42岁，腹痛1个月，上消化道钡剂提示胃溃疡。上述治疗的时间应为( )

- A. 5d
- B. 7d
- C. 10d
- D. 14d
- E. 1个月

**正确答案：** B

90、单选 结核性腹膜炎的主要感染途径是( )

- A. 经口
- B. 经淋巴管
- C. 经血液循环
- D. 腹腔病变直接蔓延
- E. 腰椎病变直接蔓延

**正确答案：** D

91、单选 诊断慢性胰腺炎最有价值的检查是( )

- A. X线腹部平片
- B. 腹部B超
- C. 腹部CT
- D. 磁共振胰胆管成像
- E. 胃镜

**正确答案：** D

92、单选 临床上肝硬化最常见的死亡原因是( )

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/566152110140010203>