

2023-24 年山西省原平市《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题通关秘籍题库及答案（夺冠系列）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 《中华人民共和国药典》、国家食品药品监督管理局颁布标准收录的处方属于

- A: 急诊处方？
- B: 医师处方？
- C: 普通处方？
- D: 法定处方？

答案：D

2. 具有抗肿瘤作用的抗风湿药

- A: 塞来昔布
- B: 甲氨蝶呤
- C: 布洛芬
- D: 利妥昔单抗

答案：B

3. 饮食对粪外观的影响,食绿叶菜

- A: 黑褐色
- B: 红色
- C: 酱色
- D: 暗绿色

答案：D

4. 患者男性，45 岁，反复发作夜间呼吸困难 1 个月，加重 1 天就诊。体格检查：血压 180 / 110mmHg，呼吸急促，双肺散在哮鸣音，双肺底细湿啰音，心率 130 次 / 分。

- A: 慢性支气管炎还是急性支气管炎
- B: 肺炎还是肺间质纤维化
- C: 支气管哮喘还是心源性哮喘
- D: 肺心病还是冠心病

答案：C

5. 属于新型抗凝药物的是

- A: 美托洛尔
- B: 胺碘酮
- C: 氯吡格雷
- D: 达比加群酯

答案：D

6. 原发性高血压的临床表现中错误的是

- A: 可出现靶器官损害的临床表现
- B: 绝大多数原发性高血压属于缓进型
- C: 初期即有明显症状
- D: 诊断标准是血压高于 140/90mmHg

答案：C

7. 饮食对粪外观的影响,食西红柿、西瓜

- A: 暗绿色
- B: 黑褐色
- C: 酱色

D: 红色

答案: D

8. 可出现体位性低血压的是

A: 甲氧氯普胺

B: 双嘧达莫

C: 苯二氮

D: 哌替啶

答案: B

9. 饮酒后酒精除了影响神经系统、心血管系统的功能外，还会影响药物的疗效作用和毒副作用。因此，在服用药物时应该考虑酒精对药物的影响。

A: 低血糖反应

B: 血糖升高

C: 过敏反应

D: 血压升高

答案: A

10. (治疗消化性溃疡的胃黏膜保护剂)可促进胃黏膜-黏液分泌与内源性前列腺素生成的药物是 ()

A: 碳酸镁

B: 米索前列醇

C: 雷贝拉唑

D: 硫糖铝

答案: B

11. 通过直接阻断 α

- A: 甲基多巴
- B: 硝苯地平
- C: 哌唑嗪
- D: 利血平

答案：C

12. 香豆素类抗凝血药

- A: 肝素
- B: 华法林
- C: 氯吡格雷
- D: 利伐沙班

答案：B

13. 患者，男，60 岁，诊断为高血压伴蛋白尿，首选的药物是

- A: 美托洛尔
- B: 螺内酯
- C: 维拉帕米
- D: 氯沙坦

答案：D

14. 不宜选静滴 5%碳酸氢钠注射液、碱化尿液的情况是是

- A: 苯妥英钠中毒
- B: 苯巴比妥中毒
- C: 司可巴比妥中毒
- D: 异戊巴比妥中毒

答案：D

15. 某女性，19 岁，2 年前因上呼吸道感染后逐渐出现甲状腺肿大，伴多汗、多食、消瘦、心悸、烦躁，根据血 T

- A: 嗜睡
- B: 粒细胞计数减少
- C: 皮疹
- D: 白细胞计数减少

答案：A

16. 干扰敏感细菌细胞壁黏肽的合成，使细菌细胞壁缺损的药物是

- A: 四环素
- B: 青霉素
- C: 磺胺嘧啶
- D: 链霉素

答案：B

17. 能减弱华法林的抗凝作用的食物是

- A: 维生素 K
- B: 地瓜
- C: 韭菜
- D: 芒果

答案：C

18. 属于医师用药咨询的是

- A: 注射剂溶媒的正确选择
- B: 减肥、补钙、补充营养素
- C: 抗菌药物的合理应用
- D: 栓剂、气雾剂的正确使用方法

答案：C

19. 老年人应该避免使用与疾病状态相关的潜在不适当用药。以下用于判断老年患者潜在不适当用药的依据是

- A: CTP 评分标准
- B: Bayesian 反馈法
- C: Beers 标准
- D: 数字评分法

答案：C

20. 患者，男，54 岁，患冠心病 3 年，长期服用阿司匹林。近几天肢体多处出现瘀斑，故前来就诊。实验室检查：PLT $70\times 10^9/L$ 。下列药物中不会引起血小板减少的药物是

- A: 氯霉素
- B: 阿司匹林
- C: 碳酸锂
- D: 噻氯匹定

答案：C

21. 治疗发热成人服对乙酰氨基酚，每隔 4~6 小时重复用药 1 次；1 日用量不得超过

- A: 4.5g
- B: 2.0g
- C: 3.0g
- D: 2.5g

答案：B

22. 可导致丙氨酸氨基转移酶升高的帕金森病治疗药为（）

- A: 苯海索

B: 恩托卡朋

C: 苄丝肼-左旋多巴

D: 金刚烷胺

答案：B

23. 禁用油类泻剂导泻的毒物是()。

A: 阿片类药物

B: 磷化锌

C: 麦角胺

D: 麻黄碱

答案：B

24. 所有病情稳定并无禁忌证的心功能不全患者一经诊断均应立即使用

A: 坎地沙坦

B: 美托洛尔

C: 卡托普利

D: 地高辛

答案：B

25. 肌酸磷酸激酶检查超过正常值

A: 诊断心肌梗死

B: 诊断痛风

C: 诊断消化性溃疡

D: 诊断急性胰腺炎

答案：A

26. 对于轻度（IPSS<8 分）至中度（IPSS 为 8~19 分）前列腺增生症患者，建议初始治疗药物是

- A: 奥昔布宁
- B: 米多君
- C: 坦索罗辛
- D: 非那雄胺

答案：C

27. 以下临床联合用药中，药物相互作用主要影响药效学的是

- A: 维生素 C 与多潘立酮同服吸收减少
- B: 四环素同服硫酸亚铁降低疗效
- C: 氢氯噻嗪减弱甲苯磺丁脲的降糖作用
- D: 昆布片同服异烟肼导致药效降低

答案：C

28. 患者到药店要求购买痢特灵，药师应该给予

- A: 喷托维林
- B: 双嘧达莫
- C: 呋喃唑酮
- D: 诺氟沙星

答案：C

29. 某患者，男，25 岁，苯二氮

- A: 氟马西尼
- B: 硫酸钠
- C: 间羟胺
- D: 亚甲蓝

答案：A

30. 妊娠早期是胚胎器官和脏器的分化时期，最易受到外来药物的影响引起胎儿畸形。胎儿形成期为胎儿发育的最后阶段，器官形成过程已经大体完成并继续发育，某些药物可导致胎儿发育异常。

- A: 妊娠 3~5 周
- B: 妊娠 1~3 周
- C: 妊娠 3~4 周
- D: 妊娠 1~2 周

答案：A

31. 一般给予肠外营养的热氮比为

- A: NPC5: 5
- B: 150kcal:1gN
- C: 100kcal:1gN
- D: NPC7:3

答案：B

32. 胃食管反流病患者应避免使用的药物是

- A: 美托洛尔
- B: 阿司匹林
- C: 特拉唑嗪
- D: 阿仑膦酸钠

答案：D

33. 男性，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

- A: 利伐沙班
- B: 氯吡格雷
- C: 肝素

D: 华法林

答案：B

34. (2019 年真题) 患者，女，25 岁，临床诊断为癫痫，给予丙戊酸钠 200mg tid 治疗。关于患者用药教育的说法，错误的是

A: 发作次数增多时应及时复诊

B: 必要时监测血药浓度

C: 应于每日三餐前服用药物

D: 不要随意增减剂量

答案：C

35. 可导致体重增加的抗癫痫药是

A: 苯妥英钠

B: 拉莫三嗪

C: 卡马西平

D: 丙戊酸钠

答案：D

36. 冠心病患者如不能耐受 ACEI，可考虑给予

A: α 受体拮抗剂

B: 地高辛

C: β 受体激动剂

D: AR

答案：D

37. 急性化脓性中耳炎局部治疗，鼓膜穿孔前可使用

A: 2% 酚甘油滴耳液

B: 2% 过氧化氢溶液

C: 3%酚甘油滴耳液

D: 3%过氧化氢溶液

答案：A

38. 服用头孢曲松、甲硝唑、氯丙嗪等应该禁用的是

A: 酒

B: 浓茶

C: 食醋

D: 烟

答案：A

39. 影响伊曲康唑药效的 PK / PD 参数是

A: $\%T > MI$

B: C_{max}

C: C_{max} / MIC

D: $AUC_{0 \sim 24} / MIC$

答案：D

40. 易经乳汁分泌的药物特性是

A: 分子量大

B: 弱酸性

C: 蛋白结合率高

D: 脂溶性高

答案：D

41. 患者，男，35 岁。于中饭后即开始有胃部疼，胀满食少，现感觉脐周硬、闷痛拒按，于 1 日无改善情况下，前来医院就诊。诊断结果：因饱食而导致的继发性消化不良。

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 双八面体蒙脱石

B: 胰酶片

C: 碳酸氢钠

D: 小檗碱

答案：B

42. 急性冠状动脉综合征患者使用他汀类药物降低 LDL-C 的目标值为

A: <60mg / dl

B: <70mg / dl

C: <40mg / dl

D: <50mg / dl

答案：B

43. 抗凝治疗

A: 低分子肝素

B: 阿司匹林

C: 阿替普酶

D: 巴曲酶

答案：A

44. 药学服务是药师对患者的关怀和责任。下列人员中，属于药学服务重要人群的是

A: 过敏体质者

B: 门诊患者

C: 住院患者

D: 社区患者

答案：A

45. 与西咪替丁、喹诺酮类及大环内酯类药物合用，应减少其用量的药品是

- A: 噻托溴铵
- B: 异丙托溴铵
- C: 氨茶碱
- D: 孟鲁司特

答案：C

46. 患者，女，35 岁，部分发作性癫痫病史 12 年，最初使用苯妥英钠单药治疗，6 个月前因癫痫病情控制不佳，提高苯妥英钠剂量，因不能耐受不良反应换用卡马西平联合丙戊酸钠治疗，癫痫得到控制。患者近期出现体重增加及严重脱发，到神经内科复诊。患者同时患有 2 型糖尿病，长期口服二甲双胍、阿卡波糖治疗。此外患者长期服用复合维生素 B。

- A: 糖尿病病情进展
- B: 卡马西平的不良反应
- C: 停用了苯妥英钠
- D: 丙戊酸钠的不良反应

答案：D

47. 临床实践验证，一些毒物有相应的特效拮抗剂。因此，在进行排出毒物的同时，应积极使用特效的拮抗剂。

- A: 二巯丙醇
- B: 依地酸钙钠
- C: 青霉胺
- D: 二巯丁二钠

答案：A

48. 下列药物中，即使肝功能不全的病人也可使用原剂量的是

- A: 氯霉素
- B: 苯妥英钠
- C: 洋地黄毒苷
- D: 青霉素

答案：D

49. 过敏性疾病、皮肤病与寄生虫病可呈现

- A: 淋巴细胞增多
- B: 单核细胞增多
- C: 嗜酸性粒细胞增多
- D: 中性粒细胞增多

答案：C

50. 患者，女，62 岁，2 型糖尿病伴下肢浮肿、活动后呼吸困难，不宜选用的药物是()

- A: 阿卡波糖
- B: 吡格列酮
- C: 二甲双胍
- D: 格列齐特

答案：B

51. 据统计，妊娠期和哺乳期妇女不合理用药高达 80% 左右。故临床药师应熟悉妊娠期和哺乳期妇女用药原则，以确保胎儿及乳儿的安全。

- A: 水溶性维生素
- B: 阿莫西林
- C: 米非司酮
- D: 青霉素

答案：C

52. 患者，男，40 岁，因肺结核使用抗结核药后，肌肉痉挛，四肢感觉异常，导致这种症状的药物是

- A: 异烟肼
- B: 吡嗪酰胺
- C: 乙胺丁醇
- D: 利福平

答案：A

53. 影响药物治疗有效性的因素不包括（）

- A: 患者的病生理状态
- B: 药物相互作用
- C: 药品价格
- D: 给药途径

答案：C

54. 阿托品联用氯解磷定解救有机磷重度中毒的机制是

- A: 促进机体的利用
- B: 作用于不同的靶点
- C: 延缓或降低抗药性
- D: 竞争性拮抗作用

答案：B

55. 患者，女，40 岁，既往有风湿性心脏病病史，近 2 年来出现劳累性呼吸困难，1 天前因受凉出现发热、咳嗽，咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：半卧位，口唇发绀，两肺大量水泡音及哮鸣音。

- A: 硝普钠

- B: 多索茶碱
- C: 硝苯地平
- D: 毛花苷丙

答案：D

56. 妇女在月经期间不宜服用的药品是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 颠茄浸膏
- C: 山莨菪碱
- D: 氨酚待因

答案：A

57. 缺铁性贫血患者应服用

- A: 苯妥英钠注射液
- B: 叶酸片
- C: 维生素 B12
- D: 硫酸亚铁片

答案：D

58. 急性结膜炎患者禁用的药品是

- A: 醋酸可的松滴眼剂
- B: 硫酸锌滴眼剂
- C: 利福平滴眼剂
- D: 酞丁安滴眼剂

答案：B

59. (2019 年真题) 患者，男，50 岁，临床诊断为焦虑症，给予氟西汀 20mgqd 治疗。对该患者用药教育的说法错误的是

- A: 不得随意自行调整氟西汀剂量
- B: 不能突然停止服用氟西汀
- C: 氟西汀应于睡前服用
- D: 服用氟西汀期间不能饮酒

答案：C

60. 他汀类药物引起的典型药源性疾病是

- A: 血液系统疾病
- B: 胃肠道疾病
- C: 神经系统疾病
- D: 肌病

答案：D

61. “将药物治疗的成本与所产生的效益归化为以货币为单位的数字，用以评估药物治疗方案的经济性”是指查看材料

- A: 最小成本分析方法
- B: 成本一效用分析方法
- C: 成本一效益分析方法
- D: 最大效果分析方法

答案：C

62. （2016 年真题）患者，男，50 岁，诊断为高血压、冠心病。

- A: 氯吡格雷片
- B: 华法林片
- C: 对乙酰氨基酚片
- D: 双嘧达莫片

答案：A

63. 溶液的规范书写是

- A: Mist
- B: Dos
- C: Liq
- D: Dil

答案：C

64. （2018 年真题）甲状腺功能亢进合并哮喘的患者慎用的药物是（）

- A: 沙美特罗
- B: 异丙托溴铵
- C: 奥马珠单抗（抗 IgE 抗体）
- D: 茶碱

答案：D

65. 可能导致血小板 (PLT) 计数减少的药物是

- A: 阿司匹林
- B: 胰岛素
- C: 氯氮平
- D: 苯妥英钠

答案：A

66. （2015 年真题）治疗大肠埃希菌所致的尿路感染，不宜选用的抗菌药是（）。

- A: 阿莫西林
- B: 头孢呋辛
- C: 左氧氟沙星
- D: 阿奇霉素

答案：D

67. 服用药物对粪外观的影响,水杨酸钠

- A: 红至黑色
- B: 黄色
- C: 橘红至红色
- D: 变红或黑色

答案: A

68. 肺结核的临床表现是

- A: 可有低热或高热,清瘦、轻咳、盗汗,有黄绿色痰
- B: 有慢性咳嗽,伴有大量脓痰及反复咯血
- C: 多为轻咳或干咳,偶见少量薄白痰,并伴有背痛、发热、头痛、咽喉痛
- D: 多发生于儿童,为阵发性剧烈痉挛性咳嗽伴有鸡鸣样吸气吼声,病程可达 2~3 个月

答案: A

69. 用体重计算年长儿童的剂量时,一般应选择

- A: 剂量的上限
- B: 剂量的 1/2
- C: 剂量的下限
- D: 剂量的 1/3

答案: C

70. 患者,男,42 岁,因“高热持续不退、盗汗、咳嗽、咳痰、咯血”就诊,经胸部 CT、结核菌核酸检测,初步诊断为“肺结核”收入医院治疗。患者服用布洛芬并未缓解高热症状,在联合使用抗结核药的前提下应给予患者

- A: 每日 5mg 泼尼松
- B: 每日酚妥拉明 10~20mg
- C: 每日 20~30mg 泼尼松
- D: 每日垂体后叶素 8~10U

答案：C

71. 关于尿蛋白和尿葡萄糖的叙述正确的是

- A: 尿液中出现葡萄糖只取决于血糖水平的高低
- B: 出现蛋白尿时即表明机体出现病理性变化
- C: 正常情况下，人体尿液中的尿蛋白含最和尿葡萄糖含量都极微
- D: 当人体肾脏的肾小球通透能力下降时会出现蛋白尿

答案：C

72. 用于缓解胆石症患者疼痛症状的药物是

- A: 匹维溴铵
- B: 复方阿嗪米特
- C: 头孢曲松与甲硝唑联用
- D: 脂肪乳

答案：A

73. 经口急性铅中毒出现的典型症状是（）

- A: 恶心、呕吐、视物模糊
- B: 肌肉震颤、抽搐
- C: 腐蚀性口腔炎
- D: 恶心、呕吐、口内有金属味

答案：D

74. 苯丙胺类中毒的解救措施不包括

- A: 酸化尿液促进毒物排出
- B: 口服中毒，发生惊厥者催吐、药用炭混悬液洗胃
- C: 如血压明显升高者首选硝苯地平 10mg 舌下含化
- D: 严重中毒者可行腹膜透析或血液透析

答案：B

75. 在中成药活胃胶囊、神曲胃痛片、陈香白露片、复方陈香味片、复方田七胃痛片中，所含有的共同组分是

- A: 碳酸镁
- B: 氧化镁
- C: 氢氧化铝
- D: 碳酸氢钠

答案：D

76. 血尿酸检查超过正常值

- A: 诊断心肌梗死
- B: 诊断急性胰腺炎
- C: 诊断痛风
- D: 诊断消化性溃疡

答案：C

77. 下列影响老年人血药浓度的因素中，叙述错误的是

- A: 常规剂量连续给药就有可能引起蓄积性中毒
- B: 与血浆蛋白结合率增加，使游离型药物减少
- C: 对药物的代谢、排泄减慢，血浆半衰期延长
- D: 心肝肾及胃肠等主要器官功能在不断下降

答案：B

78. 提供药师药学服务的重要方式和途径的是

- A: 治疗药物监测
- B: 静脉药物配置
- C: 参与临床药物治疗
- D: 处方调配

答案：A

79. 白细胞分类中，单核细胞参考范围为

- A: 20%~40%
- B: 1%~5%
- C: 3%~8%
- D: 50%~70%

答案：C

80. 服用头孢曲松、甲硝唑、氯丙嗪等应该禁用的是

- A: 烟
- B: 酒
- C: 咖啡
- D: 浓茶

答案：B

81. 是人体储存能量的形式，直接参与胆固醇和胆固醇酯合成的为

- A: 低密度脂蛋白胆固醇
- B: 血清总胆固醇
- C: 极低密度脂蛋白胆固醇
- D: 三酰甘油酯

答案：D

82. 针对单纯严重乙醇中毒同时出现烦躁不安症状的患者，下列救治措施，错误的是()

- A: 肌肉注射维生素 B
- B: 静脉注射纳洛酮 0.4mg 和吗啡 20mg
- C: 静脉注射 50%葡萄糖注射液 100ml 和胰岛素 20U
- D: 静脉滴注维生素 C 注射液 1g

答案：B

83. (2018 年真题) 患者,男,65 岁,诊断为持续性心房纤颤,医生处方胺碘酮和华法林治疗。患者既往有高血压、糖尿病、冠心病和高脂血症,目前正在服用贝那普利、美托洛尔、二甲双胍、阿卡波糖、辛伐他汀等药物治疗。根据患者用药情况,药师提出的合理化药物治疗建议,不包括()

- A: 胺碘酮可以显著抑制 CYP2D6,减慢美托洛尔的代谢,应该根据患者心率和血压调整美托洛尔剂量
- B: 患者在复律成功后,尽可能以最小的胺碘酮剂量维持治疗
- C: 胺碘酮能增加华法林的抗凝活性,在逐渐降低胺碘酮剂量的时候,注意随时根据 INR 值调整华法林的剂量
- D: 因为胺碘酮和贝那普利存在临床意义的相互作用,建议换成氨氯地平 CCB 降压药

答案：D

84. 麻醉药品处方印刷用纸为

- A: 淡红色
- B: 淡黄色
- C: 淡绿色
- D: 白色

答案：A

85. 归属"用药记录"项下的是

- A: 主要实验室检查数据
- B: 临床诊断
- C: 联合用药
- D: 医保和费用支付情况

答案: C

86. 在与患者进行沟通的过程中，切忌的事项是

- A: 尽量避免使用专业术语
- B: 可提供一些宣传资料
- C: 一次性尽量提供更多的信息
- D: 认真聆听

答案: C

87. 患者，男，72 岁。体重 75kg，1 小时前出现右上肢体活动不利，半小时后自行缓解。查体：血压 210/90mmHg；检查结果示：糖化血红蛋白 9.3%，血肌酐 143.2 μmol/L。既往有高血压、糖尿病、心病病史。诊断为短暂性脑缺血发作。

- A: 阿司匹林联合氯吡格雷
- B: 阿替普酶
- C: 阿司匹林
- D: 氯吡格雷

答案: A

88. 患者，男性，30 岁，确诊为支气管哮喘，入院治疗 3 周，经正规治疗病情缓解，仅偶有胸闷，出院时医生嘱咐了一些用药注意事项。

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 抗胆碱能药物

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/567001153061010024>