2025 年甘肃省陇南市护士执业资格考试《专业实务》模拟试题及答案解析

毕业院校：_____姓名：_____考场：_____考号：_____

一、选择题

1．运用 PDCA 循环的护理管理方法起到的作用是

A、监督指导

B、循环管理

C、持续改进

D、目标管理

E、检查落实

答案：

C

2．患者，男性，40 岁。以充血性心力衰竭入院，医嘱给予洋地黄增强心肌收缩力，护士在观察患者脉搏时，发现在一系列正常均匀的脉搏中，出现一次提前而较弱的搏动，其后有一较正常延长的间歇，此脉搏称为

A、丝脉

B、洪脉

C、缓脉

D、间歇脉

E、短绌脉

答案：

D

3．某护士，业务知识、技能较好，但性情急躁、工作中缺乏耐心，导致护患关系紧张。护士长应指导该护士

A、加强工作责任心

B、刻苦钻研专业知识

C、为患者做好心理护理

D、减少与患者的交流

E、学会控制情绪，耐心解释患者的提问

答案：

D

4．患者男，28 岁。主诉腹痛、腹泻 2 天，以急性胃肠炎收入院。护士遵医嘱为其进行静脉输液，操作过程中护士使用的主要非语言沟通形式是

A、触摸

臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥

B、眼神

C、表情

D、手势

E、仪表

答案：

A

5．患者女，51 岁，因坠落致颅脑损伤，病情危急入院，家属痛不欲生，一度晕厥，以下沟通内容最合理的是

A、“请不要影响到其他患者休息”

B、“请您尽量保持镇静，您的配合也会帮助我们对患者的抢救和治疗”

C、“您这样哭是没有用的，请坚强一点”

D、让其自己发泄内心的情绪，不予过多理睬

E、“我们一定能救活他，您别着急”

答案：

B

6．患儿，3 岁，含糖玩耍呛入气管。查体：患儿神志不清，呛咳，呼吸困难，面色发绀。急诊护士应采取的措施是

A、使患儿平卧，头偏向一侧

B、清理口腔、呼吸道分泌物

C、给氧吸入

D、口对口人工呼吸

E、做好协助气管取异物的准备

答案：

E

7．意识完全丧失，对各种刺激均无反应及生命体征不稳定属于意识状态的

A、浅昏迷

B、意识模糊

C、昏睡

D、嗜睡

E、深昏迷

答案：

E

8．患者，男性，45 岁，胃、十二指肠溃疡出血。患者面色苍白、四肢湿冷，脉速、尿少、血压 80/60mmHg 。

判断该患者的失血量占循环血量的百分比是

A、<10%

B、10% ～20%

C、>20%

D、>30%

E、>40%

答案：

C

9．患者，男性，60 岁。退休前是单位的高管，退休后不适应退休生活，患抑郁症。护士对其进行健康宣导时，患者表示没有兴趣，此时护士的最佳反应是

A、“如果你不想听，我陪您坐一会儿吧。”

B、“你现在需要多和人交流，否则病情无法减轻。”

C、“认真听我说的话，听完病就会减轻。”

D、“你必须听，配合我完成自己的工作。”

E、“不想听也行，我把宣传材料放在这里，您一会自己看吧。”

答案：

A

10．中药的“四性”不包括

A、寒

B、燥

C、热

D、凉

E、温

答案：

B

11．长期服用利尿剂（呋塞米）的心衰患者，护士应当关注的不良反应是

A、低血压

B、低血钾

C、低血钠

D、脱水

E、发热

答案：

B

12．护士长为今天当班的护士小白、小兰、小于和小柯进行工作的安排，小白是处理医嘱的主班护士，小兰是治疗护士，小于是药疗护士，小柯是生活护理护士。每隔一段时间护士长安排她们进行调换岗位。这种工作方式被称为

A、个案护理

B、功能制护理

C、责任制护理

D、小组护理

E、临床路径

答案：

B

13．患者，男性，42 岁，肥厚型心肌病入院。护士交班时，监护仪显示心房颤动，心率 200 次/分，心律不齐，双肺底可闻湿啰音。该护士应首先采取转复心律的措施是

A、电复律

B、胺碘酮静脉注射

C、毛花苷丙静脉注射

D、奎宁丁静脉注射

E、维拉帕米静脉注射

其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》

答案：

A

14．下列护患沟通中，属于开放式提问的是

A、“您今天早上吃过药了吗？”

B、“您为什么不愿意选择手术治疗呢？”

C、“您的学历是本科吧？”

D、“你现在有疼痛的感觉吗？”

E、“你每天运动的时间有 1 小时吗？”

答案：

B

15．在传染病区中属于污染区的是

A、走廊

B、病室

C、护士站

D、治疗室

E、值班室

答案：

B

16．在静脉补钾时，200ml 生理盐水中最多可加 10% 氯化钾的量是

A、12ml

B、10ml

C、8ml

D、6ml

E、3ml

答案：

D

17．患者女，50 岁。近日来常便秘，护士告诉她多吃水果对排便有帮助，水果中通便的营养素为

A、纤维素

B、维生素 C

C、蛋白

D、果胶

E、维生素 E

答案：

A

18．患者女，28 岁。停经 40 天，下腹隐痛 2 天，加重 1 天入院。查体：面色苍白，四肢湿冷，体温不升，脉搏 126 次/分，血压 70/50mmHg 。此时其最适宜的体位是

A、侧卧位

B、俯卧位

C、中凹卧位

D、半坐卧位

E、去枕仰卧位

答案：

C

19．提示有机磷农药中毒的尿液气味是

A、蒜臭味

B、氨臭味

C、硫磺味

D、恶臭味

E、烂苹果味

英雄者，胸怀大志，腹有良策，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志者也。——《三国演义》

答案：

A

20．患者男，70 岁。2 年前被诊断为焦虑症，常因小事发脾气，护士下列用语不当的是

A、“您能谈谈您的焦虑感受吗？”

B、“请您在我的指导下进行放松。”

C、“您是因为胃炎可能癌变才觉得焦虑吗？”

D、“下面我给您介绍一下焦虑症的性质。”

E、“我们可以想一些办法来缓解身心不适。”

答案：

C

21．患者，男性，69 岁。农民，无文化，胃癌术后。护士在探视时间与其进行交谈。交谈过程中，护士手机来电，护士立刻将手机关闭；患者感到伤口阵阵疼痛，并很烦躁；探视患者的女儿轻轻地安慰；最终交谈无法再进行下去，不得不终止。

导致此次交谈失败的个人生理因素是患者

A、无文化

B、情绪烦躁

C、年龄较大

去留无意，闲看庭前花开花落；宠辱不惊，漫随天外云卷云舒。——《幽窗小记》

D、伤口疼痛

E、女儿在场

答案：

D

22．患者男，58 岁。因肝癌晚期入院，患者出现烦躁不安、躁动，为保证患者安全，最重要的护理措施是

A、用牙垫放于上下臼齿之间

B、加床栏，用约束带保护患者

C、室内光线宜暗

D、护理动作要轻

E、减少外界刺激

答案：

B

23．破伤风抗毒素皮试液的标准是每毫升皮试液含破伤风抗毒素

A、50IU

B、100IU

C、150IU

以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

D、1500IU

E、15000IU

答案：

C

24．法洛四联症的主要畸形不包括

A、肺动脉狭窄

B、室间隔缺损

C、主动脉骑跨

D、右心室肥厚

E、动脉导管未闭

答案：

E

25．持续用冷疗超过 1 小时，会引起局部组织损伤，称为

A、局部效应

B、后续效应

C、远处效应

D、继发效应

去留无意，闲看庭前花开花落；宠辱不惊，漫随天外云卷云舒。——《幽窗小记》

E、协同效应

答案：

D

26．患者男，68 岁。因患膀胱癌住院，入院时，护士主动与其交流：“您好，我是您的责任护士，有事请找我。”患者治疗多日病情不见好转，情绪低落，化疗不良反应重。护士悉心照顾、鼓励，患者深受感动。患者经治疗后即将出院，对护士的服务非常满意。

患者出院时，责任护士最主要的工作是

A、向患者交代出院后的注意事项

B、评价护理措施

C、征求患者意见，寻找护理工作中问题

D、保持与患者的信任关系

E、评估患者，制定随访计划

答案：

E

27．患者，女性，51 岁。身高 155cm ，体重 75kg ，因消化性溃疡少量出血入院检查。

经治疗，患者停止出血。查体：体温 38℃，脉搏 88 次/分，呼吸 21 次/分，血压 165 /95mmHg 。应为患者选择的最适宜饮食为

A、高蛋白、高纤维素饮食

B、高纤维素、低脂饮食

C、少渣、高热量饮食

D、低蛋白、低盐饮食

E、低脂、低盐饮食

答案：

E

28．患儿，女，3 岁。自幼发现心脏杂音，经常患肺炎，查体胸骨左缘第 3～4 肋间Ⅳ级粗糙收缩期杂音，心电图示左心室及右心室均肥大，X 线片示肺血多。

最可能的诊断是

A、室间隔缺损

B、房间隔缺损

C、动脉导管未闭

D、法洛四联症

E、肺动脉狭窄

士不可以不弘毅，任重而道远。仁以为己任，不亦重乎？死而后已，不亦远乎？ ——《论语》

答案：

A

29．便秘患者应用液体石蜡导泻的原理是

A、刺激肠蠕动

B、润滑肠壁，软化粪便

C、阻止肠道吸收水分

D、使肠内容物形成高渗透压

E、解除肠痉挛

答案：

B

30．患者女，54 岁，行痔疮手术后给予热水坐浴，不正确的叙述是

A、坐浴时间 30～45 分钟

B、坐浴后更换敷料

C、坐浴前需排空膀胱

D、浴盆和溶液要求无菌

E、具有消炎，止痛作用

答案：

A

31．建立良好医护关系的原则是双方应相互

A、补充

B、独立

C、监督

D、尊重

E、依存

答案：

D

32．发生细菌性肝脓时，细菌最主要的入侵途径是

A、胆道系统

B、肝动脉

C、淋巴系统

D、门静脉

E、损伤伤口

答案：

A

33．护士在进行关于滥用抗生素危害的健康指导时，告知患者最可能诱发白血病的抗生素是

A、青霉素

B、氯霉素

C、链霉素

D、诺氟沙星

E、罗红霉素

答案：

B

34．在抢救患者时，关于医生护士的合作的描述，正确完整的是

A、在抢救患者时，护士应执行医生的口头

医嘱，但必须复述一遍无误后方可执行，且在抢救完成6 小时内补写书面医嘱

B、在抢救患者时，护士可以考虑执行医生的口头医嘱

C、在抢救患者时，护士应执行医生的口头医嘱，但必须复述二遍无误后方可执行

D、在抢救患者时，护士应拒绝医生口头医嘱

E、在抢救患者时，护士应执行医生的口头医嘱但必须复述一遍无误后方可执行，且在抢救完成1 小时以内补写书面医嘱

答案：

A

35．可使人体产生对结核菌获得免疫力的预防措施是

A、进行卡介苗接种

B、普及结核病防治知识

C、及早发现并治疗患者

D、消毒衣物，隔离患者

E、加强锻炼，增强体质

答案：

A

36．患者，男性，22 岁。骑车时与人相撞，会阴部骑在车梁上，自述伤后会阴部剧痛。约 20 分钟后尿道外口滴血，不能自行排尿，急诊就医。体检：面色苍白，心率 100 次/分，血压 100 /60mmHg ，呼吸急促；会阴部皮下淤血，尿道外口滴血；导尿管不能插入膀胱。血常规和下腹部X 线平片未见异常。

受伤的类型是

A、撞伤

B、剪应力伤

C、骑跨伤

D、牵拉伤

E、骨刺切割伤

答案：

C

37．有机磷农药中毒的作用机制是

A、增加胆碱酯酶活性

B、抑制胆碱酯酶活性

C、抑制大脑皮质

D、舒张支气管平滑肌

E、松弛支气管平滑肌

答案：

B

38．下列药物中，通过同时扩张外周动脉和静脉减轻心脏的后、前负荷的是

A、螺内酯

B、普萘洛尔

C、哌唑嗪

D、地高辛

E、硝酸甘油

答案：

C

39．患者，女性，40 岁。因减肥过度造成严重营养不良。遵医嘱行深静脉输注全营养混合液。护士为患者行锁骨下静脉置管，应该警惕最严重的并发症是

A、气胸

B、血胸

C、神经损伤

D、血管损伤

E、空气栓塞

答案：

E

40．患者，女性，23 岁，有长期癫痫病史，来院前 6 小时内有 2 次发作，到院后又有 1 次全身性大发作，历时 2 分钟，现处于发作后状态，宜采用的治疗是

A、呋塞米 10mg　静脉注射

B、苯巴比妥（鲁米那）10mg　肌内注射

C、苯妥英钠 500mg　肌内注射

D 、吗啡静脉注射

E、苯妥英钠 250mg　静脉注射 5 分钟以上

答案：

E

41．患者女，62 岁。退休工程师。因心前区压榨样疼痛 3 小时，伴冷汗、恐惧来院急诊。暂不需要的检查项目是

A 、监测血压

B、心电监护

C 、拍 X 线胸片

D 、生化检查

E、护理体检

答案：

C

42．患者，男性，16 岁。篮球比赛时不慎扭伤踝关节，40 分钟后到校医室就诊，正确的处理方法是

A 、热敷

B、冷敷

C、热水足浴

D、局部按摩

E、冷热交替使用

答案：

B

43．小儿机体需要的总能量中，为其所特有的需要是

A、基础代谢

B、食物的特殊动力作用

C、活动

D、生长

E、排泄

答案：

D

44．患者女性，70 岁，大学退休教师，因脑梗死入院治疗，住院第 2 天，年轻护士张某在为其进行静脉输液时，静脉穿刺 3 次均失败，更换李护士后方才成功。患者非常不满，其女儿向护士长投诉。从此，患者拒绝张护士为其护理。

护患关系冲突的主要责任人是

其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》

A、患者

B、张护士

C、李护士

D、护士长

E、患者女儿

答案：

B

45．新生儿出生后进行 Apgar 评分的评价指标不包括

A、皮肤颜色

B、角膜反射

C、心率

D、呼吸

E、肌张力

答案：

B

46．初产妇，28 岁。临产 15 小时，宫颈口开大 5cm ，胎心好，宫缩规律，胎头已入盆，胎膜未破，可触及前羊水囊，首选的护理措施是

其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》

A、肥皂水灌肠

B、人工破膜

C、静脉滴注缩宫素

D、继续观察 2～4 小时

E、针刺三阴交、合谷穴位

答案：

C

47．缓解支气管痉挛的药物中，其作用机制为兴奋β肾上腺素能受体的是

A、氨茶碱

B、沙丁胺醇

C、异丙托溴铵

D、色甘酸钠

E、甲泼尼龙

答案：

B

48．患者，男性，37 岁，在工地被钉子扎伤。遵医嘱给予破伤风抗毒素注射。伤后数天，患者因害怕感染破伤风，心情总是忐忑不安。

若患者告诉医师被钉子扎伤是有人设计陷害他，那颗钉子上一定有破伤风梭菌，而自己一定会感染破伤风。自己受到了迫害，心情低沉，想自杀。对该患者的最佳治疗药物是

A、奋乃静

B、碳酸锂

C、利培酮

D、帕罗西汀

E、氯丙嗪

答案：

D

49．患者，男性，70 岁，脑血管意外后遗症，长期卧床，自理困难。今晨护理发现患者骶尾部皮肤发红，除去压力无法恢复正常肤色。根据病情，护士拟采取的护理措施应除外

A、加强晨晚间护理，增加背部按摩次数

B、每 2 小时变换体位 1 次

C、温水擦浴，促进皮肤血液循环

D、使用减压床垫

E、翻身时避免拖拉

答案：

C

50．孕妇，因尿潴留，护士准备为该孕妇行导尿术。下列操作方法，错误的是

A、戴口罩、帽子并清洗双手

B、关闭门窗、保持患者隐私

C、将无菌与非无菌物品分别放置

D、检查导尿包的名称及灭菌日期

E、用无菌持物镊夹取棉球消毒外阴

答案：

E

51．患者，女性，61 岁。风湿性瓣膜病，因心源性水肿医嘱给予噻嗪类利尿药治疗，护士执行完医嘱后应重点预防

A、低钾血症

B、高钠血症

C、低钠血症

D、高钾血症

E、低镁血症

其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》

答案：

A

52．婴幼儿呼吸道黏膜缺乏某物质，是导致呼吸道感染的原因之一，该物质是

A、IgM

B、纤毛

C、鼻毛

D、IgE

E、sIgA

答案：

E

53．患儿女，3 岁。平时活动耐力低下，诊断为先天性心脏病，其心脏的血流动力学如图所示。

[HS61_281_1.gif]

根据上述血流动力学特点，考虑该患儿为

A、房间隔缺损

B、室间隔缺损

C、法洛四联症

D、动脉导管未闭

E、主动脉瓣关闭不全

答案：

D

54．患者男，60 岁。有活动义齿，护士为其做口腔护理时，应将义齿取下放在

A、乙醇中

B、热水中

C、冷开水中

D、清洗消毒液中

E、朵贝尔漱口液中

答案：

E

55．患者男，50 岁。因高热急诊入院，体温 39.9℃。正确的物理降温措施是

A、嘱患者多饮水

B、前额、头顶部置冰袋

C、全身温水擦浴

D、心前区酒精擦浴

E、冰敷 60 分钟后测体温

答案：

C

56．患者女，28 岁。主诉停经 50 天，阴道不规则出血 12 天，左下腹痛 1 天，妇科检查：后穹窿穿刺抽出不凝血 4ml ，尿妊娠试验(+)，诊断为异位妊娠，其最常见的病因是

A、子宫肌炎

B、输卵管炎

C、子宫内膜炎

D、卵巢囊肿

E、宫颈炎

答案：

B

57．沟通的基本层次中最高的层次是

A、互动性沟通

B、分享个人想法、感受

C、议论

D、一致性的沟通

E、陈述事实的沟通

答案：

D

58．患者，男性，20 岁，足趾划伤 1 周。昨日起发热、厌食、张口受限、咀嚼困难，呈苦笑面容，急诊入院。

接诊护士应采用的隔离方法是

A、严密隔离

B、飞沫隔离

C、空气隔离

D、接触性隔离

E、体液隔离

答案：

D

59．患者女，28 岁。因发热、腰痛、尿频、尿急、尿痛就医，入院后诊断为急性肾盂肾炎。对其有特征性价值的尿检查结果是

A、颗粒管型(++)

不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。——《韩非子》

B、大量红细胞

C、蜡样管型

D、蛋白(++)

E、白细胞管型

答案：

E

60．患者男，30 岁。因进食油腻食物后 4 小时，感右上腹及剑突下钻顶样疼痛急诊入院。

对该患者治疗原则不当的是

A、解痉

B、镇痛

C、驱虫

D、抗感染治疗

E、立即手术治疗

答案：

E

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/567054105066010042