

2024 湖北省汉川市《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题大全【名校卷】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 滴鼻剂的正确使用方法不包括()

- A: 如滴鼻液过多流入口腔，可将其吐出
- B: 使用滴鼻剂时，可以同时使用同类的滴鼻剂加强疗效
- C: 儿童必须在成人监护下使用
- D: 如果正在服用其他药品，需要遵医嘱使用滴鼻剂

答案：B

2. 属于抗雄激素类，首选用于晚期前列腺癌的药物是

- A: 乙烯雌酚
- B: 氟他胺
- C: 他莫昔芬
- D: 甲羟孕酮

答案：B

3. 属于白三烯受体阻断剂的平喘药是

- A: 布地奈德
- B: 沙美特罗
- C: 孟鲁司特
- D: 多索茶碱

答案：C

4. 喷托维林为中枢性镇咳药。

- A: 氨溴索
- B: 沙丁胺醇
- C: 喷托维林
- D: 噻托溴铵

答案：C

5. 用于肾移植的排异反应和类风湿关节炎的是()

- A: 环孢素
- B: 环磷酰胺
- C: 硫唑嘌呤
- D: 甲泼尼龙

答案：C

6. 可作为全营养支持或部分营养补充的是

- A: TP
- B: 视黄酸
- C: TPF-D
- D: 视黄醇

答案：A

7. 需要内因子辅助吸收的维生素是

- A: 维生素 B6
- B: 烟酸
- C: 叶酸
- D: 维生素 B12

答案：D

8. 聚乙二醇干扰素 $\alpha 2a$ 可抑制的肝药酶是

A: CYP1A2

B: CYP2D6

C: CYP2C9

D: CYP2C19

答案：A

9. (2016 年真题) 2 岁以下儿童腹泻，禁用的药品是

A: 双歧三联活菌胶囊

B: 地衣芽孢杆菌胶囊

C: 双八面体蒙脱石散

D: 洛哌丁胺片

答案：D

10. 长效的 5-HT₂受体阻断剂是

A: 劳拉西泮

B: 甲氧氯普胺

C: 氯丙嗪

D: 帕洛诺司琼

答案：D

11. 以下属于第三代头孢菌素的是

A: 头孢噻吩

B: 头孢噻肟

C: 头孢羟氨苄

D: 头孢克洛

答案：B

12. 他汀类所引起的肝损害特点不包括

- A: 肝毒性与剂量无关
- B: 所有他汀类药物都产生肝毒性
- C: 使用辛伐他汀当转氨酶升高至正常值上限的 3 倍需停药
- D: 当转氨酶升高至正常值上限的 3 倍以上，需要减量或停药

答案：A

13. 患者，女，54 岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润行导管癌 II 级，同侧腋下淋巴结 1/18，免疫组化：ER(-)，PR(-)，Her(+). 肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。下列关于多柔比星的说法中错误的是()

- A: 典型不良反应为骨髓抑制和心脏毒性
- B: 对增殖和非增殖细胞均有杀伤作用
- C: 曾用过表柔比星的患者可更换多柔比星
- D: 属于蒽环类抗肿瘤药物

答案：C

14. 关于维 A 酸软膏治疗痤疮的说法，错误的是

- A: 有明确的致畸性，妊娠期妇女禁用
- B: 为了加强疗效，可以一日多次给药
- C: 使用初期可能出现皮肤干燥或脱屑，对紫外光敏感性增强，宜在睡前使用
- D: 不宜用于皮肤皱褶部位

答案：B

15. 以下关于睾酮替代治疗的描述，错误的是

- A: 最好选择能模拟睾酮生理分泌节律的药物
- B: 长期应用高剂量雄激素注意监测电解质、心功能与肝功能
- C: 丙酸睾酮应采用静脉注射

D: 在补充雄激素前，应常规进行前列腺直肠指检

答案：C

16. 与核糖体 30S 亚基结合，阻止氨基酰 tR-NA 进入 A 位的抗菌药是

A: 万古霉素

B: 青霉素

C: 氯霉素

D: 四环素

答案：D

17. 以下 PPI 中，主要代谢酶是 CYP3A4 的是

A: 奥美拉唑

B: 雷贝拉唑

C: 泮托拉唑

D: 兰索拉唑

答案：D

18. 易引起低血钾的利尿药是

A: 山梨醇

B: 阿米洛利

C: 氨苯蝶啶

D: 氢氯噻嗪

答案：D

19. 物质代谢过程中催化"一碳单位"转移反应的辅酶组成成分是

A: 维生素 B

B: 维生素

C: 叶酸

D: 维生素 A

答案：C

20. (2016 年真题) 可以碱化尿液，用于代谢性酸中毒的药品是

A: 氯化钾

B: 乳酸钠

C: 硫酸镁

D: 谷氨酸

答案：B

21. 可引起高钾血症，应避免与留钾利尿药联合应用的是()

A: 卡托普利

B: 呋塞米

C: 地高辛

D: 哌唑嗪

答案：A

22. 利那洛肽为泻药的作用机制是

A: 在消化道不被吸收，在胃内酸性条件下，脱钙形成聚卡波非，在小肠或大肠的中性环境下显示了高度的吸水性，膨胀成为凝胶，保持消化道内水分，调节消化道内容物的输送，从而对便秘发挥治疗作用

B: 一种阴离子表面活性剂，口服后基本不吸收，在肠道内促进水和脂肪类物质浸入粪便，通过物理性润滑肠道排便

C: 通过激活 CFTR (囊性纤维化跨膜传导调节因子)，细胞内 cGMP 可增加小肠腔内氯化物和碳酸氢盐的分泌量，最终使小肠液分泌增多和结肠转运速度增快

D: 选择性、高亲和力的 5-HT₄ 受体激动剂，可通过 5-HT₄ 受体激活作用来增强胃肠道中蠕动反射和推进运动模式，具有促肠动力活性

答案：C

23. 可用于重度痤疮（尤其是结节囊肿型痤疮）的药品是

- A: 阿达帕林
- B: 异维 A 酸
- C: 克林霉素
- D: 过氧苯甲酰

答案：B

24. 主要用于治疗呼吸道合胞病毒感染的药物是

- A: 利巴韦林
- B: 阿德福韦酯
- C: 拉米夫定
- D: 更昔洛韦

答案：A

25. 用于颅脑损伤的氨基酸制剂的是()

- A: 复方氨基酸注射液(20AA)
- B: 丙氨酰谷氨酰胺注射液
- C: 复方氨基酸注射液(18AA)
- D: 赖氨酸注射液

答案：D

26. 糖皮质激素和抗生素合用治疗严重感染的目的是

- A: 增强机体的应激性
- B: 增强抗菌药物的抗菌活性
- C: 抗毒素、抗休克、缓解毒血症状
- D: 增强机体对疾病的防御能力

答案：C

27. 顺铂作为常见抗恶性肿瘤药物，首选用于治疗

- A: 慢性淋巴细胞性白血病
- B: 纤维瘤
- C: 恶性淋巴瘤
- D: 非小细胞肺癌

答案：D

28. 下述利尿药中，不宜与氨基糖苷类抗生素合用的是

- A: 呋塞米
- B: 氨苯蝶啶
- C: 氢氯噻嗪
- D: 螺内酯

答案：A

29. 关于孟鲁司特钠临床使用注意事项的说法，正确的是()

- A: 12 岁以下儿童禁用孟鲁司特钠
- B: 孟鲁司特钠起效快，适用于哮喘急性发作
- C: 孟鲁司特钠可单独用于哮喘治疗
- D: 孟鲁司特钠使用后可能会导致嗜酸性粒细胞增多

答案：D

30. 下列选项中，除抑制延髓咳嗽中枢外，还可阻断肺-胸膜的牵张感受器产生的肺迷走神经反射，并具有罂粟样平滑肌解痉作用的药物是()。

- A: 可待因
- B: 右美沙芬

C: 苯丙哌林

D: 喷托维林

答案: C

31. 与硝酸酯类药物联合应用发生严重低血压的药物是

A: 去甲肾上腺素

B: 丙酸萘酮

C: 西地那非

D: 坎利酮

答案: C

32. 双香豆素与苯巴比妥合用可

A: 与其竞争结合血浆蛋白

B: 诱导肝药酶加速灭活，作用减弱

C: 产生协同作用

D: 竞争性对抗

答案: B

33. 抑制叶酸合成的抗癌药物是

A: 顺铂

B: 环磷酰胺

C: 阿糖胞苷

D: 甲氨蝶呤

答案: D

34. 多黏菌素主要作用于

A: 支原体

B: 革兰阴性杆菌

C: 厌氧菌

D: 革兰阳性菌

答案: B

35. (2020 年真题) 患者，男，60 岁。入院诊断为: 高胆固醇血症、支原体肺炎。医师拟选用克拉霉素治疗支原体肺炎，同时需进行调血脂治疗，不宜与克拉霉素合用的调血脂药是

A: 辛伐他汀

B: 氟伐他汀

C: 依折麦布

D: 非诺贝特

答案: A

36. (2020 年真题) 消化道溃疡和胃肠道出血高风险患者可以选用，但禁用于有心肌梗死病史患者的药物是

A: 泮哌美辛

B: 对乙酰氨基酚

C: 塞来昔布

D: 阿司匹林

答案: C

37. 成人口服左甲状腺素替代治疗，开始剂量每日 25~50 μg ，每 2 周增加

A: 6 μg / kg

B: 4 μg / kg

C: 25 μg

D: 5 μg / kg

答案: C

38. 突然停药可导致反跳现象的是

- A: 氨氯地平
- B: 哌唑嗪
- C: 可乐定
- D: 硝酸甘油

答案: D

39. 下述属于第三代 α

- A: 酚苄明
- B: 坦洛新
- C: 十一酸睾酮
- D: 哌唑嗪

答案: B

40. 患哪种疾病禁用吡喹酮

- A: 绦虫病
- B: 血吸虫病
- C: 眼囊虫病
- D: 囊虫病

答案: C

41. 大量用药可致球后视神经炎的药物是

- A: 乙胺丁醇
- B: 吡嗪酰胺
- C: 红霉素
- D: 异烟肼

答案: A

42. (2018 年真题) 患者，男，60 岁诊断为房性心律失常，医生给予胺碘酮治疗。近日，因胃溃疡开始用西咪替丁，出现窦性心动过缓症状。

- A: 西咪替丁抑制 CYP1A2，升高胺碘酮血浆药物浓度
- B: 胺碘酮与西咪替丁竞争 CYP2C19，减慢胺碘酮的代谢
- C: 西咪替丁抑制 CYP3A4，升高胺碘酮血浆药物浓度
- D: 西咪替丁诱导 CYP2C9，升高胺碘酮血浆药物浓度

答案：C

43. 氨茶碱的作用特点是

- A: 10 $\mu\text{g/ml}$ 为有效治疗浓度，15-20 $\mu\text{g/ml}$ 以上会出现毒性反应
- B: 不宜长期、单一、过量使用，不宜用于重度哮喘患者，对小于 18 个月的婴幼儿和大多数儿童有效
- C: 舒张支气管作用弱且慢，适用于夜间哮喘和痰多的患儿
- D: 适用于轻度持续型（2 级以上）哮喘的长期治疗

答案：A

44. 防止急性深静脉血栓形成的药物是

- A: 达肝素钠
- B: 香豆素类
- C: 维生素 K1
- D: 维生素 B12

答案：A

45. 下列钙通道阻滞剂中可用于治疗心律失常的是

- A: 维拉帕米
- B: 拉西地平

C: 左旋氨氯地平

D: 硝苯地平

答案: A

46. 长期大剂量应用头孢菌素类抗菌药物的患者，应注意适当补充

A: 维生素 B 和维生素 K

B: 维生素 A 和维生素 D

C: 维生素 C 和烟酸

D: 维生素 E 和叶酸

答案: A

47. 柔红霉素可能与()存在交叉耐药性。

A: 阿糖胞苷

B: 多柔比星

C: 环磷酰胺

D: 甲氨蝶呤

答案: B

48. 大剂量使用维生素 K

A: 肝素

B: 维生素

C: 双香豆素

D: 氨甲苯酸

答案: A

49. 中毒后可用等剂量维生素 B

A: 乙胺丁醇

B: 对氨基水杨酸

C: 异烟肼

D: 利福平

答案: C

50. 下列哪项不是维生素 K 的适应证

A: 梗阻性黄疸所致的出血

B: 用于弥散性血管内凝血症高凝期

C: 水杨酸类药物过量引起的出血

D: 早产儿及新生儿肝脏合成功能不足引起维生素 K 缺乏

答案: B

51. 别嘌醇抗痛风的作用机制是

A: 抑制近端肾小管对尿酸盐的重吸收，使尿酸排出增加

B: 抑制粒细胞浸润和白细胞趋化

C: 可促进尿酸分解，将尿酸转化为一种溶解性更好的尿囊素

D: 抑制黄嘌呤氧化酶，阻止次黄嘌呤和黄嘌呤代谢为尿酸

答案: D

52. 糖尿病合并轻度肾功能不全患者宜选用

A: 普通胰岛素

B: 格列喹酮

C: 二甲双胍

D: 低精蛋白锌胰岛素

答案: B

53. 关于黄体酮的叙述，下列说法正确的是

A: 具有雄激素作用

B: 是短效类口服避孕药的组成成分

C: 是天然孕激素

D: 是长效类口服避孕药的组成成分

答案: C

54. 可引起巨幼红细胞性贫血的药物是()

A: 甲氟喹

B: 氯喹

C: 乙胺嘧啶

D: 伯氨喹

答案: C

55. 用于治疗急、慢性支气管炎及各种刺激引起的刺激性干咳。片剂一次 20~40mg，一日 3 次的药物是

A: 地塞米松

B: 右美沙芬

C: 苯丙哌林

D: 可待因

答案: C

56. 用于抗乙肝病毒的药物是

A: 阿昔洛韦

B: 拉米夫定

C: 西多福韦

D: 扎那米韦

答案: B

57. 患者男性，26 岁。主诉发热、全身酸痛，头痛、乏力等，伴有阵发性刺激性干咳，红细胞冷凝集素试验阳性，血清肺炎支原体抗体阳性。

- A: 肝脏损害
- B: 胃肠道反应
- C: 二重感染
- D: 过敏反应

答案：C

58. 抗血栓形成、保护动脉内皮的调血脂药是

- A: 藻酸双酯钠
- B: 氟伐他汀
- C: 阿伐他汀
- D: 普伐他汀

答案：A

59. 治疗系统性红斑狼疮选用

- A: 甲硝唑
- B: 氯喹
- C: 吡嗪酮
- D: 甲苯咪唑

答案：B

60. 以上药物镇咳作用最强的是

- A: 可待因
- B: 吗啡
- C: 喷托维林
- D: 右美沙芬

答案：B

61. 以下为广谱抗病毒药的是

- A: 阿糖腺苷
- B: 碘苷
- C: 利巴韦林
- D: 更昔洛韦

答案：C

62. (2017 年真题) 为避免引起大面积中毒性表皮坏死松解症, 服用前提倡做人体白细胞抗原等位基因检测的抗癫痫药是 ()

- A: 丙戊酸钠
- B: 卡马西平
- C: 托吡酯
- D: 氟硝西泮

答案：B

63. 抑制碳酸酐酶的药物是

- A: 呋塞米
- B: 氯苯蝶啶
- C: 乙酰唑胺
- D: 氢氯噻嗪

答案：C

64. 以下哪种心律失常禁用强心苷

- A: 心房颤动
- B: 室上性心动过速
- C: 心房扑动

D: 室性心动过速

答案：D

65. 用于肝病的氨基酸制剂的是 ()

A: 丙氨酰谷氨酰胺注射液

B: 复方氨基酸注射液 (18AA)

C: 复方氨基酸注射液 (20AA)

D: 赖氨酸注射液

答案：C

66. 以上药物镇咳作用最弱的是

A: 吗啡

B: 喷托维林

C: 右美沙芬

D: 可待因

答案：B

67. 单纯疱疹性或溃疡性角膜炎患者禁用 ()

A: 夫西地酸

B: 四环素可的松

C: 利福平

D: 氯霉素

答案：B

68. 下列关于吉非替尼的描述，错误的是

A: 与传统化疗药存在交叉耐药

B: 与细胞毒类药物如铂类、紫杉类有协同作用

C: 用于治疗经含有铂类或多西他赛治疗失败的晚期非小细胞肺癌患者

D: 常见典型不良反应是皮肤毒性、腹泻

答案：A

69. 下列关于氯化钾注射液的描述，正确的是()

A: 可以肌肉注射，禁止直接静脉注射

B: 禁止肌肉注射，可以直接静脉注射

C: 严禁肌肉注射和直接静脉注射，仅可静脉滴注

D: 可以肌肉注射，也可以直接静脉注射

答案：C

70. 可作为心血管不良事件一级和二级预防的药物是()

A: 阿司匹林

B: 塞来昔布

C: 双氯芬酸

D: 对乙酰氨基酚

答案：A

71. 糖皮质激素在临床上一般不用于

A: 支气管哮喘

B: 真菌感染

C: 全身性红斑狼疮

D: 中毒性感染

答案：B

72. 以下食物与华法林钠不存在相互作用的是

A: 脱皮黄瓜

B: 洋葱

C: 红叶苋菜

D: 菠菜叶

答案: A

73. 癫痫部分性发作首选 ()。

A: 苯妥莫钠

B: 奥卡西平

C: 氯巴占

D: 乙琥胺

答案: B

74. 可发生双硫仑样反应的是

A: 甲硝唑+乙醇

B: 替硝唑+华法林

C: 替硝唑+苯巴比妥

D: 奥硝唑+乙醇

答案: A

75. 阻断 H₂ 受体的药物是

A: 奥美拉唑

B: 氢氧化铝

C: 雷尼替丁

D: 阿托品

答案: C

76. 可诱发哮喘且变异型心绞痛不宜选用的药物是

A: 硝酸甘油

B: 洛伐他汀

C: 硝苯地平

D: 普萘洛尔

答案: D

77. 氯霉素的最严重的不良反应是

A: 胃肠道反应

B: 抑制骨髓造血功能

C: 肝脏损害

D: 二重感染

答案: B

78. 属于噻唑烷二酮类胰岛素增敏剂的是

A: 瑞格列奈

B: 罗格列酮

C: 沙格列汀

D: 格列美脲

答案: B

79. (2018 年真题) 属于短效胰岛素或短效胰岛素类似物的是 ()

A: 普通胰岛素

B: 地特胰岛素

C: 甘精胰岛素

D: 低精蛋白锌胰岛素

答案: A

80. 患者，男，56 岁，有高血压病史 4 年。体检：血压 156 / 96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利控制血压。

A: 氨氯地平

B: 吲达帕胺

C: 缬沙坦

D: 美托洛尔

答案: C

81. 下列不属于治疗前列腺增生的药物是

A: 西地那非

B: 坦洛新

C: 特拉唑嗪

D: 非那雄胺

答案: A

82. 维持心肌和神经肌肉的正常应激性，须静脉滴注给药的电解质是

A: 硫酸镁

B: 氯化钙

C: 氯化钠

D: 氯化钾

答案: D

83. 属于刺激性泻药的是()

A: 利那洛肽

B: 番泻叶

C: 欧车前

D: 多库酯钠

答案: B

84. 替比夫定的作用靶点是

A: 神经氨酸酶

B: 脱氧核糖核酸聚合酶

C: HIV-1 反转录酶

D: HIV-1 和 HIV-2 蛋白酶

答案: B

85. 患者，男，57 岁，身高 175cm，体重 87kg，诊断为 2 型糖尿病。医生给予二甲双胍片口服，500mg，bid。

A: 餐前半小时

B: 餐后 1 小时

C: 餐前即刻或餐时

D: 餐后半小时

答案: C

86. 属于抑制疟原虫的二氢叶酸还原酶，阻碍核酸合成的抗疟药物是

A: 乙胺嘧啶

B: 吡喹酮

C: 奎宁

D: 青蒿素

答案: A

87. 属于肾小管上皮细胞钠离子通道抑制剂的是()

A: 呋塞米

B: 阿米洛利

C: 乙酰唑胺

D: 氢氯噻嗪

答案: B

88. 属于前列腺素 FP 受体激动剂的是

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 曲伏前列素

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/567113165046010024>