

学习资料整理汇编

(考点或配套习题突击训练)

康复医学复习题库含答案

1、脑的动脉来源于()。

- A、 椎动脉和基底动脉
- B、 椎动脉和锁骨下动脉
- C、 颈内动脉和主动脉
- D、 颈内动脉和颈外动脉
- E、 颈内动脉和椎动脉

答案：E

2、特发性脊柱侧弯 Cobb 角 $20^{\circ} \sim 40^{\circ}$ ，其主要治疗方法是()。

- A、 密切随访
- B、 姿势训练
- C、 矫正体操
- D、 矫形器
- E、 手术

答案：D

3、关于肩关节周围炎的正确叙述是()。

- A、 多见于青少年
- B、 发病急,病程约数周
- C、 晚间疼痛减轻
- D、 可见典型疼痛弧
- E、 肩关节外展受限

答案：E

4、下列关于 Barthel 指数的描述中,错误的是()。

- A、 日常生活活动能力评定可采用 Barthel 指数测定
- B、 Barthel 指数的总分为 100 分
- C、 59~41 分者需要帮助才能完成 BADL
- D、 40~21 分者需要很大帮助
- E、 60 分以上者需要很大帮助

答案：E

5、某患者难以发出“喀”和“拉”的声音,最可能的原因是()。

- A、 唇的动度差
- B、 舌的动度差
- C、 软腭动度差
- D、 通气功能差
- E、 声带动度差

答案：B

6、高频电疗主要生物学效应是()。

- A、对人体组织的穿透力弱
- B、具有温热效应
- C、不具有非热效应
- D、可以引起肌肉收缩
- E、对神经系统具有兴奋作用

答案：B

7、最大代谢当量 10MET 相当于()。

- A、残疾
- B、日常生活受限
- C、正常健康水平
- D、有氧运动员水平
- E、高水平运动员

答案：C

8、患者男,60 岁。确诊原发性高血压病 10 年,多年来,一直与主管医生主动沟通,询问用药量及注意事项,不适情况的处理等,主管医生对其病情亦十分了解,此种医患关系为()。

- A、主动-被动模式
- B、指导-合作模式
- C、共同参与模式
- D、主动模式
- E、被动模式

答案：C

9、腹外斜肌()。

- A、肌纤维斜向上
- B、腱膜构成腹股沟管后壁
- C、腱膜下缘形成腹股沟韧带
- D、腱膜分别是在腹直肌前、后
- E、部分纤维形成腹直肌

答案：C

10、慢性支气管炎的定义,要求咳嗽咳痰连续 2 年以上,且每年发作的时间不少于()。

- A、2 个月
- B、3 个月

- C、 4 个月
- D、 5 个月
- E、 6 个月

答案： B

11、 脑血栓形成的常见病因是()。

- A、 房颤
- B、 风湿性心脏病
- C、 动脉粥样硬化
- D、 脑动脉瘤
- E、 高血压病

答案： C

12、 患儿女, 13 岁, 右下肢缺如 1 年余。 患儿 1 年余前车祸外伤致右下肢截肢, 目前病情平稳, 左下肢肌力正常, 假肢安装前接受腔的评估不包括()。

- A、 接受腔的松紧度
- B、 残肢与接受腔是否能全面接触
- C、 重点负重的部位是否合适
- D、 压力敏感部位是否受压
- E、 接受腔材质如何

答案： E

13、 II 度压疮的治疗措施不包括()。

- A、 手术治疗
- B、 紫外线照射
- C、 红外线照射
- D、 加强营养
- E、 解除压迫

答案： A

14、 I 度烧伤的局部表现是()。

- A、 皮肤红斑, 无水疱, 干燥
- B、 水疱较大, 创底红润, 水肿
- C、 表皮下积薄液, 创面微湿
- D、 创面苍白干燥, 皮革样
- E、 皮肤改变不明显, 似正常皮肤

答案： A

15、 痉挛的益处不包括()。

- A、 借助伸肌痉挛等帮助患者站立

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/567116100132006115>