

2024 年甘肃省《执业药师之西药学综合知识与技能》考试内部题库附答案（名师推荐）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 白细胞分类中，淋巴细胞参考范围为

- A: 1%~5%
- B: 50%~70%
- C: 20%~40%
- D: 3%~8%

答案：C

2. 消化不良很常见，半数以上人群在生命过程中曾因此病症而就诊，其主要症状有上腹饱胀、食欲缺乏等表现。

- A: 胰酶片
- B: 复方阿嗪米特肠溶片
- C: 莫沙必利
- D: 铝碳酸镁

答案：D

3. 普萘洛尔联用硝苯地平抗高血压的机制是

- A: 减少不良反应
- B: 协同作用
- C: 敏感化作用
- D: 拮抗作用

答案：A

4. 稳定型心绞痛发作时的治疗选用

- A: 氯贝丁酯
- B: 阿司匹林
- C: 低分子肝素
- D: 硝酸甘油

答案：D

5. 容易引湿的药物是

- A: 牛痘菌苗
- B: 青霉素类
- C: 阿扑吗啡
- D: 胃蛋白酶

答案：D

6. 用于有机磷中毒早期解除胆碱酯酶与有机磷结合的药物是

- A: 毛果芸香碱
- B: 阿托品
- C: 亚甲蓝
- D: 碘解磷定

答案：D

7. 可引起药源性肾脏疾病的药物是

- A: 含有马兜铃酸的中药
- B: 吡罗昔康
- C: 三环类抗抑郁药
- D: 异烟肼

答案：A

8. 患者，女，24 岁，患有缺铁性贫血并伴有慢性腹泻，实验室检查：Hb55g/L，血清铁 12 μg/L，首选的治疗方案是()

- A: 口服铁剂及维生素 C
- B: 注射维生素 B
- C: 静脉滴注铁剂
- D: 雄性激素治疗

答案：C

9. 老年患者对低血糖的耐受能力差，不建议使用的降糖药是

- A: α-葡萄糖苷酶抑制剂
- B: 胰高血糖素样肽-1 (GLP-1) 类似物
- C: 磺酰脲类促胰岛素分泌剂
- D: 二肽基肽酶-4 (DPP-4) 抑制剂

答案：C

10. 抗肿瘤药物中，影响核酸合成的药物是

- A: 放线菌素
- B: 顺铂
- C: 甲氨蝶呤
- D: 依托泊苷

答案：C

11. (2016 年真题) 患者，女，55 岁，诊断为类风湿性关节炎，既往有十二指肠溃疡病史。医生给予甲氨蝶呤+柳氮磺吡啶治疗。甲氨蝶呤用法用量正确的是()。

- A: 7.5mg tid
- B: 75mg qd
- C: 7.5mg qod

D: 7.5mgqw

答案：D

12. 除常规检查外，需要检查有无瘪粒、变形、膨胀等变质现象的制剂是

A: 软膏剂

B: 胶囊剂

C: 注射剂

D: 丸剂

答案：B

13. 药物治疗的效果不以货币为单位表示，而是用其他量化的方法表达治疗目的的药物经济学评价方法是

A: 最小成本法

B: 成本-效果分析

C: 最大成本法

D: 成本-效益分析

答案：B

14. 有机磷农药中毒者体内血胆碱酯酶活力下降，中度中毒者可降至

A: 50%~70%

B: 20%以下

C: 30%~50%

D: 30%以下

答案：C

15. 为解热或镇痛，有心功能不全史的患者应慎用布洛芬。因为用药后可能发生

- A: 过敏反应
- B: 重度肝损伤
- C: 急性肾衰竭
- D: 尿潴留和水肿

答案：D

16. (2019 年真题) 下列通用名与别名的组合中，不是同一种药品的是

- A: 醋酸氯己定与洗必泰
- B: 氨甲苯酸与止血敏
- C: 桂利嗪与脑益嗪
- D: 利可君与利血生

答案：B

17. 患者，女，85 岁，既往有高血压病史，慢性心力衰竭，给予地高辛每日维持量治疗，近 1 周频发室性心动过速，检测血钾值在正常范围。如果患者出现严重的室性心动过速、室颤，需采用

- A: 阿托品
- B: 电复律
- C: 苯海拉明
- D: 胺碘酮

答案：D

18. 氟马西尼用于解救的是 ()

- A: 汞中毒
- B: 氰化物中毒
- C: 有机磷中毒
- D: 三唑仑中毒

答案：D

19. 描述是否充分、详细、准确是评价

- A: 前言
- B: 讨论
- C: 摘要
- D: 结果

答案：D

20. 下列关于甲状腺功能亢进症患者教育的说法错误的是()

- A: 避免饮用咖啡等兴奋性饮料
- B: 禁食富含碘的食物
- C: 妊娠伴甲状腺功能亢进症患者宜选甲巯咪唑
- D: 避免使用含碘药物

答案：C

21. 患者，男，70岁，2周前因缺血性脑卒中入院治疗，经积极治疗，病情显著缓解后出院，目前无其他伴随疾病，为进行心脑血管事件的二级预防，应首选的药物是（）

- A: 利伐沙班
- B: 阿司匹林
- C: 肝素
- D: 巴曲酶

答案：B

22. (2019 年真题) 患者，女，69 岁，体型偏胖，BMI30.1，主诉夜间咳嗽、咽部有异物感，平躺时常有反酸、烧心、胸痛伴背痛，自用止咳糖浆无效。查体：咽红，听诊双肺未闻及干湿性啰音，偶有哮鸣音。既往史：高血压病史 12 年，服用氨氯地平片 5mgqd，血压控制在 140/85mmHg 左右，高脂血症 10 年，服用阿托伐他汀钙片 20mgqd。

- A: 胃食管反流病
- B: 心绞痛
- C: 支气管哮喘
- D: 胃溃疡

答案：A

23. 糖尿病酮症酸中毒患者应选用

- A: 格列本脲
- B: 大剂量碘剂
- C: 二甲双胍
- D: 胰岛素

答案：D

24. 告知"培高利特致心脏瓣膜病风险已经撤市"属于

- A: 药品不良反应
- B: 药物相互作用
- C: 合理用药信息
- D: 禁忌证

答案：A

25. 大多数慢性汞中毒患者中毒的主要原因是 ()

- A: 饮食
- B: 长期吸入汞蒸气

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 被投毒

D: 环境污染

答案: B

26. 下列引起药源性疾病的事例中，其影响因素主要是"药物制剂因素"的是

- A: 输液中颗粒物引起肺部异物肉芽肿
- B: 以 50%乙醇、抗组胺药、抗抑郁药可增强催眠药的作用
- C: 排钾利尿药增加心脏对强心苷的敏感性
- D: 阿司匹林与华法林同服会增加出血风险

答案：A

27. 药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素、药物因素。

- A: 氯霉素在新生儿体内蓄积呈现灰婴综合征
- B: 服用阿司匹林出现哮喘、慢性荨麻疹等
- C: 肾病患者服用呋喃妥因可引起周围神经炎
- D: 口服避孕药致阿米替林清除率下降

答案：D

28. 患者，女，77 岁，53kg，既往糖尿病病史 10 年，因“反复尿路感染 4 个月，加重 3 天”来院就诊。4 个月前，患者无明显诱因出现排尿疼痛，间断低热，体温波动在 37.2℃~37.5℃之间，自服左氧氟沙星片 0.29bid 治疗 5 天后好转停药。其间多次反复发作，自服左氧氟沙星片好转。3 天前，患者再次出现尿路刺激症状，自行口服左氧氟沙星 0.29bid 治疗后无明显好转。门诊查尿常规示：白细胞（+++），白细胞计数 463.2 / g1，细菌计数 1262.1 / μl。查体：T37.9℃P86 次 / 分 R21 次 / 分 BP132 / 77mmHg，心、肺听诊无异常，腹平软，无压痛及反跳痛，左肾区叩击痛（+），双下肢无水肿。辅助检查：血常规：白细胞计数 12.35×10⁹ / L、中性粒细胞百分比 86.5%，CRP69.5mg / L。血生化：AST15U / L，ALT11U / L，ALB43.29 / L，Scr669mol / L。尿培养及药敏试验结果：大肠埃希菌（ESBLs+），细菌计数>10⁵cfu / ml；对左氧氟沙星耐药，对哌拉西林一他唑巴坦、亚胺培南敏感。

A: 口服头孢呋辛 0.25gbid，疗程 3d

B: 给予呋喃妥因 50mgqd，睡前排尿后口服，每隔 7d 换用其他类型抗菌药，疗程 6 个月

C: 口服左氧氟沙星 0.5gqd，疗程 14d

D: 无需再服用抗菌药

答案：B

29. 卡马西平使环孢菌素疗效降低属于（）。

A: 排泄

B: 与血浆蛋白结合

C: 作用于同一受体的拮抗作用

D: 酶诱导作用

答案：D

30. 左心衰竭最早出现的症状是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 端坐呼吸
- B: 劳力性呼吸困难
- C: 粉红色泡沫样痰
- D: 夜间阵发性呼吸困难

答案：B

31. 能刺激骨骼、肌肉和组织生长发育的是

- A: 肽类激素
- B: 利尿剂

C: 蛋白同化激素

D: 麻醉药品

答案：A

32. (抗甲状腺药分阶段治疗时间)，初治阶段

A: 1~2 周

B: 1~2 年

C: 2~3 个月

D: 1~2 个月

答案：D

33. 患者，女，31 岁，产后 3 个月，哺乳期。因“尿路感染”需给予抗生素治疗，首选的药物是

A: 左氧氟沙星

B: 头孢曲松

C: 阿米卡星

D: 复方磺胺甲噁唑

答案：B

34. 抗氧化，减少再灌注期氧自由基的产生

A: 别嘌醇

B: 丙磺舒

C: 秋水仙碱

D: 阿司匹林

答案：A

35. 肝素使用过量造成出血，特效的解救药是

A: 阿司匹林

- B: 白蛋白
- C: 鱼精蛋白
- D: 维生素 C

答案：C

36. 接种乙型肝炎疫苗后，血清免疫学检查可呈阳性反应的指标是：

- A: 乙型肝炎病毒 e 抗体
- B: 乙型肝炎病毒 e 抗原
- C: 乙型肝炎病毒表面抗原
- D: 乙型肝炎病毒表面抗体

答案：D

37. 成人空腹血糖正常参考区间是

- A: 3.7~6.1mmol / L
- B: 3.9~6.1mmol / L
- C: 3.5~6.1mmol / L
- D: 3.3~5.5mmol / L

答案：B

38. (2015 年真题) 氨基糖苷类药物引起的典型药源性疾病是 ()。

- A: 神经系统疾病
- B: 胃肠类疾病
- C: 血液系统疾病
- D: 肝病

答案：A

39. 药师在调剂工作中，首先要审核处方的

- A: 完整性

- B: 合法性
- C: 规范性
- D: 用药适宜性

答案：B

40. 属于蛋白酶抑制剂的是（）

- A: 依非韦伦
- B: 齐多夫定
- C: 利托那韦
- D: 利巴韦林

答案：C

41. 属于 A 型单胺氧化酶抑制剂的是

- A: 文拉法辛
- B: 氟西汀
- C: 吗氯贝胺
- D: 阿米替林

答案：C

42. 相互作用使药物吸收增加的联合用药是

- A: 铁剂联用维生素
- B: 硝苯地平联用普萘洛尔
- C: 阿托品联用吗啡
- D: 阿托品联用普萘洛尔

答案：A

43. 有关氰化物中毒的解救措施，错误的是

- A: 给予亚硝酸异戊酯吸入

- B: 注射硫代硫酸钠
- C: 使用活性炭吸附
- D: 注射亚硝酸钠

答案：C

44. 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药品对胎儿的危害，将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别。头孢曲松属于 ()

- A: D 级
- B: C 级
- C: A 级
- D: B 级

答案：D

45. 哺乳期妇女应用下列药物会对乳婴产生何种不良影响，妊娠早期服用甲氨蝶呤

- A: 可能引起乳婴视神经损害、智力障碍
- B: 可能致胎儿畸形
- C: 导致新生儿血钙过高
- D: 可引起过期妊娠、产程过长和产后出血

答案：B

46. 属于选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂的是

- A: 氟西汀
- B: 阿米替林
- C: 文拉法辛
- D: 吗氯贝胺

答案：A

47. 妊娠期尿路感染宜选用

- A: 阿莫西林?
- B: 四环素?
- C: 丙硫氧嘧啶?
- D: 喹诺酮类?

答案: A

48. 提示"胰酶肠溶胶囊不宜嚼碎服用，以免药粉残留口腔内、发生溃疡"，是针对

- A: 交代药物的用量
- B: 交代药品贮存条件与方法
- C: 交代用药注意事项
- D: 交代用药途径及用药方法

答案: D

49. 血清天门冬氨酸氨基转移酶正常参考区间是

- A: 男性<40U/L
- B: 成人<50U/L
- C: 成人<40U/L
- D: 男性 11~50U/L

答案: C

50. 与左旋多巴合用，可提高疗效的药物是

- A: 叶酸
- B: 奥美拉唑
- C: 克拉维酸钾
- D: 苄丝肼

答案: D

51. 前记

- A: 对药物治疗的建设性意见与结果评价
- B: 医师签名、药品金额
- C: 主要实验室数据
- D: 临床诊断、费别

答案：D

52. (2015 年真题) 患者，男，64 岁，身高 174cm，体重 92kg。既往有高血压、高脂血症及心肌梗死病史，近日因反复胸闷就诊，临床处方，阿司匹林肠溶片、辛伐他汀片、特拉唑嗪片、氨氯地平片、曲美他嗪片、单硝酸异山梨酯注射液进行治疗。

- A: 应注意监护血压变化，防止血压过度降低
- B: 患者使用抗血小板聚集药物时，应注意预防出血
- C: 出现弥漫性肌痛或乏力，同时伴全身不适时，应及时就医
- D: 单硝酸异山梨酯能扩张血管引起头痛，即使可耐受也必须停药

答案：D

53. 运动员长期使用可提高疼痛忍耐力，但易导致成瘾和呼吸抑制的兴奋剂是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 人促红细胞生成素
- C: 苯丙酸诺龙
- D: 可待因

答案：D

54. 肺结核的临床表现是

- A: 可有低热或高热，清瘦、轻咳、盗汗，有黄绿色痰

B: 多发生于儿童，为阵发性剧烈痉挛性咳嗽伴有鸡鸣样吸气吼声，病程可达 2~3 个月

C: 有慢性咳嗽，伴有大量脓痰及反复咯血

D: 多为轻咳或干咳，偶见少量薄白痰，并伴有背痛、发热、头痛、咽喉痛

答案：A

55. 用药期间尿液可呈橘红色的抗结核药物是

A: 链霉素

B: 吡嗪酰胺

C: 利福平

D: 乙胺丁醇

答案：C

56. 处方用药须与临床诊断密切相符，医师开具的处方在病情与诊断栏中应明确记录对患者的临床诊断。药师应审查处方用药与临床诊断的相符性，以加强合理用药监控。

A: 脂肪乳用于急性肝损伤、脂质肾病、脑卒中

B: 福辛普利用于降压

C: 老年女性补钙给予阿托伐他汀钙

D: I 类手术切口应用第三代头孢菌素

答案：A

57. 保钾利尿剂

A: 阿米洛利

B: 雷米普利

C: 阿利吉仑

D: 依普利酮

答案：A

58. 合并闭角型青光眼的前列腺增生症患者，不宜选用的药物是

- A: 坦索罗辛
- B: 非那雄胺
- C: 多沙唑嗪
- D: 奥昔布宁

答案：D

59. 对急性心肌梗死引起的室性心律失常首选

- A: 硝酸酯类
- B: 普萘洛尔
- C: 地高辛
- D: 利多卡因

答案：D

60. 患者，男，48 岁，患有青光眼 3 年。近日因支气管哮喘急性发作，给予舒张支气管、抗炎等治疗应告知该患者用药后需漱口的药物是

- A: 孟鲁司特钠咀嚼片
- B: 布地奈德混悬液
- C: 多索茶碱注射液
- D: 沙丁胺醇气雾剂

答案：B

61. 感冒初出现卡他症状，如鼻黏膜充血、打喷嚏、流眼泪、流鼻涕，宜选服

- A: 含中枢兴奋剂咖啡因制剂
- B: 含氢溴酸右美沙芬制剂

C: 含非甾体抗炎药制剂

D: 含伪麻黄碱及氯苯那敏制剂

答案: D

62. 通过阻断 β 受体，同时具有血管扩张作用的非苷类药物是

A: 米力农

B: 洋地黄毒苷

C: 卡维地洛

D: 地高辛

答案: C

63. 药师在知道合理用药时应正确的交代给药途径和给药方法，下列交代的内容错误的是：

A: 肠溶片要整体吞服，不易咀嚼服用

B: 泡腾片是可以溶解于温开水后服用，也可以作为咀嚼片服用

C: 栓剂是外用制剂，不可口服

D: 活菌制剂不能超过 40℃ 的水送服

答案: B

64. 药物不良反应多潘立酮 ()

A: 睡眠障碍

B: 性功能障碍

C: 黑便

D: 溢乳现象

答案: D

65. 下列哪种药对强心苷类中毒引起的快速型心律失常疗效最佳

A: 普鲁卡因胺

- B: 阿托品
- C: 普萘洛尔
- D: 苯妥英钠

答案：D

66. 药师应具备的素质中，开展药学服务工作的关键是()。

- A: 良好的教育背景
- B: 高尚的职业道德
- C: 药历制订、修改
- D: 交流沟通能力

答案：D

67. 患者，女，55 岁，因反复发作胸骨后疼痛 2 年，伴反酸、胃灼热、间断积食来诊，食管测压提示食管下括约肌压力小于 6mmHg，结合胃镜检查 results，临床诊断为胃食管反流病。医师处方：奥美拉唑 20mgqd 强化抑酸治疗。

- A: 适宜餐前 30 分钟服用
- B: 长期服用可能会出现维生素 K 缺乏
- C: 用药后可能出现头痛、便秘等不良反应
- D: 应整片吞服

答案：B

68. 解热镇痛药用于退热，两次用药的间隔时间应该是

- A: 2~4 小时
- B: 5~7 小时
- C: 3~5 小时
- D: 4~6 小时

答案：D

69. 以下药物中，妊娠妇女使用可能引起胎儿肢体、耳、内脏畸形的是

- A: 辛伐他汀
- B: 苯妥英钠
- C: 沙立度胺
- D: 甲氨蝶呤

答案: C

70. 导致 13 万多例横纹肌溶解症患者的是

- A: 阿托伐他汀
- B: 罗非昔布
- C: 加替沙星
- D: 己烯雌酚

答案: A

71. 药品中的危险品应存放于()，

- A: 低温库
- B: 专用仓库
- C: 凉暗库
- D: 常温库

答案: B

72. 关于透析患者使用磷结合剂的下列叙述错误的是

- A: 透析患者服用钙剂必须在进食的同时服用
- B: 高磷血症会导致心脏、血管的钙化
- C: 透析患者服用磷结合剂的钙剂，目的是为了补钙
- D: 透析患者服用钙剂量大时易出现高钙血症

答案: C

73. 部分药品的中文药名容易混淆，药师在审核处方时应格外小心，防止处方出现用药错误。下列处方中符合适应证的是

- A: 为闭塞性脑血管病、中心性视网膜炎患者开具曲克芦丁
- B: 为肿瘤患者开具氟胞嘧啶
- C: 为疱疹病毒患者开具阿糖胞苷
- D: 为社区获得性肺炎患者开具柔红霉素

答案：A

74. 尿液是人体泌尿系统排除的代谢废物，正常人每日排出尿液 1000～3000ml。其中 97% 为水分，而在 3% 的固体物质中，主要含有两大类物质：有机物（尿素、尿酸、肌酐等蛋白质代谢产物）和无机物（氯化钠、磷酸盐、硫酸盐、铵盐等）。

- A: 肾性肾小球肾炎
- B: 心肌梗死
- C: 肢端肥大症
- D: 肝脏疾病

答案：A

75. 属于核苷酸类 HIV 逆转录酶抑制剂的是（）

- A: 奈韦拉平
- B: 阿巴卡韦
- C: 洛匹那韦
- D: 多替拉韦

答案：B

76. 除胰岛功能低下外，主要引起血糖超过正常参考区间高限的疾患是

- A: 肾功能衰减

- B: 肝癌、重症肝炎
- C: 激素分泌功能亢进
- D: 激素分泌功能衰退

答案：C

77. (2018 年真题) 甲状腺功能亢进合并哮喘的患者慎用的药物是 ()

- A: 茶碱
- B: 沙美特罗
- C: 奥马珠单抗 (抗 IgE 抗体)
- D: 异丙托溴铵

答案：A

78. 治疗药源性疾病的方法如下，最先采用的是

- A: 拮抗致病药物
- B: 停用致病药物
- C: 对症治疗
- D: 调整治疗方案

答案：B

79. 治疗抗肿瘤药引起的恶心、呕吐等不良反应，可选用的止吐药物是

- A: 昂丹司琼
- B: 奥美拉唑
- C: 维生素 B6
- D: 雷尼替丁

答案：A

80. 氨基糖苷类药物引起的典型药源性疾病是

- A: 血液系统疾病

B: 肌病

C: 神经系统疾病

D: 胃肠道反应

答案: C

81. 急性缺血性脑卒中溶栓治疗的时间窗为 ()

A: 2h

B: 3h

C: 1h

D: 0.5h

答案: B

82. 驾驶员工作时不宜服用的药品是

A: 阿莫西林?

B: 维生素 C?

C: 氯苯那敏?

D: 阿司匹林?

答案: C

83. (2017 年真题) 可分泌到乳汁中引起新生儿黄疸的药物是 ()

A: 阿莫西林

B: 头孢克洛

C: 诺氟沙星

D: 复方磺胺甲噁唑

答案: D

84. 应提示患者，该药品内附药片，须先溶解再滴眼

A: 胰岛素笔

B: 噻托溴铵粉吸入剂

C: 利福平滴眼剂

D: 复方甲硝唑栓

答案: C

85. 结核病、水痘、麻疹、风疹、流行性腮腺炎等传染病可呈现

A: 单核细胞增多

B: 淋巴细胞增多

C: 嗜酸性粒细胞增多

D: 中性粒细胞增多

答案: B

86. 对肠道寄生虫具有神经肌肉阻滞作用，蛔虫产生痉挛性麻痹作用的是

A: 枸橼酸哌嗪

B: 噻嘧啶

C: 甲苯咪唑

D: 阿苯达唑

答案: B

87. 归属于药历“用药记录”项下的是

A: 主要实验室检查数据

B: 医保和费用支付情况

C: 联合用药

D: 临床诊断

答案: C

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/568024046044007022>