

2023年-2024年执业医师资格证之临床助理医师基础题库和答案要点

单选题（共45题）

1、溃疡性结肠炎的临床表现下列哪项是错误的

- A. 腹痛、便意便后缓解
- B. 左下腹有压痛
- C. 常有腹胀
- D. 易形成肠瘘
- E. 可有发热

【答案】 D

2、传染性最强的梅毒是

- A. 二期梅毒
- B. 三期梅毒
- C. 一期梅毒
- D. 晚期梅毒
- E. 晚期潜伏梅毒

【答案】 C

3、女性，18岁，发热、鼻出血、皮肤紫癜2周，舌尖可见血疱，双下肢可见瘀斑，浅表淋巴结及肝脾未触及，胸骨压痛阴性，血红蛋白52g/L，白细胞 $2.0 \times 10^9 / L$ ，分类中性0.24，淋巴0.75。嗜碱粒0.01，血小板 $22 \times 10^9 / L$ 。网织红细胞0.001，胸部X线片示右下肺炎。

- A. B超
- B. 硫酸亚铁或右旋糖酐铁

- C. 骨髓检查
- D. MRI
- E. 同位素骨扫描

【答案】 C

4、目前治疗 SLE 的主要药物是

- A. 非甾体抗炎药
- B. 泼尼松
- C. 硫唑嘌呤
- D. 吗替麦考酚酯
- E. 环磷酰胺

【答案】 B

5、脂肪酸合成的原料乙酰 CoA 从线粒体转移至细胞液的途径是

- A. 三羧酸循环
- B. 乳酸循环
- C. 糖醛酸途径
- D. 柠檬酸—丙酮酸循环
- E. 丙氨酸—葡萄糖循环

【答案】 D

6、男，71岁。咳嗽、咳痰20年，气短2天，高血压病史20年。查体：T37.5℃，BP150/90mmHg，半坐位，口唇发绀，呼吸相延长，双肺可闻及干湿性啰音，心界向左下扩大，心率120次/分，律齐，为改善患者的临床症状，下列药物应首选的是

- A. 毛花昔丙（西地兰）
- B. 氨茶碱
- C. 肾上腺素
- D. 吗啡
- E. 呋塞米

【答案】 B

7、对丁肺炭疽患者应当采取的预防、控制措施是

- A. 为甲类传染病，按照甲类处理
- B. 为乙类传染病，按照甲类处理
- C. 为丙类传染病，按照丙类处理
- D. 为丙类传染病，按照乙类处理
- E. 因未发现流行的证据，按常规处理

【答案】 B

8、下列哪项不属于实施放射诊疗应当遵守的规定

- A. 应当尽量以胸部 X 射线摄影代替胸部荧光透视检查
- B. 严格执行检查资料的登记、保存、提取和借阅制度
- C. 给婴幼儿实施 X 射线照射操作时，必须有其家属陪同进入操作现场
- D. 非特殊需要，对于受孕后 8~15 周的育龄妇女，不得进行下腹部的放射影像检查
- E. 不得将核素显像检查和 X 射线胸部检查列入对少年儿童体检的常规检查项目

【答案】 C

9、肾结核时肾受累的部位首先应在

- A. 肾小管祥
- B. 肾小球
- C. 肾乳头
- D. 肾盖
- E. 集合管

【答案】 B

10、女性，24岁，因“上腹疼”4小时入院，现感觉除上腹外右侧下腹部亦感疼痛，伴有恶心、呕吐。1年前曾有类似表现。外周血 WBC $12 \times 10^9/L$ 。

- A. 急性阑尾炎
- B. 急性机械性肠梗阻
- C. 急性上消化道穿孔
- D. 急性胰腺炎
- E. 肠系膜动脉血栓

【答案】 A

11、女孩，8岁，发热1周，体温 $38.5^{\circ}C$ ，伴频繁咳嗽、胸痛。查体：一般情况可，双肺未闻及干湿啰音，肺部 X 线片示两下肺云雾状阴影。

- A. 青霉素
- B. 链霉素
- C. 红霉素
- D. 氯霉素
- E. 阿昔洛韦（无环鸟苷）

【答案】 C

12、血栓的结局不包括

- A. 吸收
- B. 机化
- C. 排出
- D. 钙化
- E. 溶解

【答案】 C

13、李某怀孕期间到医院进行产前检查，此时医生如果发现一些情况存在，就会提出终止妊娠的医学意见，这些情况中不包括

- A. 李某有致畸物质接触史
- B. 胎儿有严重缺陷
- C. 胎儿患严重遗传性疾病
- D. 李某患严重高血压，继续妊娠会危及其生命
- E. 李某患严重糖尿病，继续妊娠会严重危害其健康

【答案】 A

14、静脉血经异常通道进入体循环动脉血中所引起的发绀常见于

- A. 肺炎
- B. 左心衰竭
- C. 法洛四联症
- D. 严重休克
- E. 神经源性肺水肿

【答案】 C

15、肝癌血行转移至肝外最多见于

- A. 肾
- B. 胰
- C. 骨
- D. 肺
- E. 胃

【答案】 D

16、一中年女性哮喘患者住院治疗 1 个月，经过正规治疗病情缓解，生活可以自理，睡眠、食欲正常，仅偶有胸闷。

- A. 溴己新（必嗽平）
- B. 沙丁胺醇（舒喘灵）气雾剂
- C. 特布他林气雾剂
- D. 丙酸倍氯米松气雾剂
- E. 酮替芬

【答案】 D

17、小叶性肺炎属于

- A. 浆液性炎
- B. 纤维素性炎
- C. 化脓性炎
- D. 出血性炎

E. 变质性炎

【答案】 C

18、卵巢恶性肿瘤中，能分泌雌激素的是

A. 原发性绒癌

B. 子宫内膜样癌

C. 未成熟型畸胎瘤

D. 颗粒细胞瘤

E. 浆液性囊腺癌

【答案】 D

19、女，69岁，病人干咳，有少量白色泡沫痰，无吐血及痰中带血2个月，伴发热，胸痛2天。体格检查：左下肺呼吸音减弱，心电无异常，胸片示左下肺有一直径3.0cm阴影，成分叶状，边缘不光滑。

A. 肺炎

B. 肺脓肿

C. 肺结核

D. 肺癌

E. 肺错构瘤

【答案】 D

20、某女士，36岁。半年前其母突然病故，此后失眠，情绪低沉，不愿与人交往。近3个月来独处时常听见有声音对她讲话，说其母病故与某人有关，故多次给公安机关写信反映母亲被害之事，后来又感到自己的思维、情感不由自己支配，自己的想法还未说出已人人皆知，常独自哭泣。神经系统检查未见异常，有慢性肝炎病史3年，目前肝功ALT80U/L。

- A. 抑郁症伴精神病性症状
- B. 反应性精神病
- C. 神经衰弱
- D. 精神分裂症伴抑郁症状
- E. 躯体疾病所致精神障碍

【答案】 D

21、某医疗机构在成立的时候，相关人员到卫生行政部门进行医疗机构进行了执业登记，登记的主要事项不应该包括

- A. 主要负责人
- B. 医疗机构人员数量
- C. 注册资金
- D. 诊疗科目、床位
- E. 名称、地址

【答案】 B

22、18岁未婚少女，3个月前发现腹部肿块，伴胸、腹水，均为淡黄色渗液，患者月经正常，一般情况好，妇检子宫前位，大小正常，其右前方实质性肿块15cm*12cm*10cm，表面光滑，浮球感。下列哪项为最可能的诊断

- A. 盆腔结核
- B. 卵巢恶性畸胎瘤
- C. 卵巢无性细胞瘤
- D. 卵巢纤维瘤伴胸腹水
- E. 卵巢颗粒细胞瘤

【答案】 D

23、男，52岁。初诊2型糖尿病2个月，每日进主食量500g，身高171cm，体重90kg，BMI30.8，实验室检查，空腹血糖7.5mmol/L，餐后2小时血糖12.8mmol/L，糖化血红蛋白0.072，目前首选的糖尿病治疗药物是

- A. 吡格列酮
- B. 二甲双胍
- C. 格列本脲
- D. 那格列奈
- E. 阿卡波糖

【答案】 B

24、治疗重症胃食管反流病的首选药物是

- A. 法莫替丁
- B. 莫沙必利
- C. 奥美拉唑
- D. 甲氧氯普胺
- E. 多潘立酮

【答案】 C

25、多根多处肋骨骨折患者，最典型的症状和体征是

- A. 疼痛剧烈
- B. 呼吸困难
- C. 伤处肿青紫
- D. 反常呼吸运动
- E. 胸廓挤压痛

【答案】 D

26、DIC 消耗性低凝期首选的是

- A. 肝素
- B. 输新鲜血浆
- C. 输新鲜全血
- D. 氨基己酸
- E. 输浓缩血小板

【答案】 A

27、以下哪项提示重症肺炎的诊断

- A. 血压 80/50mmHg
- B. 心率 90 次 / 分
- C. 头痛，烦躁不安
- D. 畏寒，高热
- E. 呼吸频率 26 次 / 分

【答案】 A

28、门静脉高压手术后最易发生肝性脑病的术式是

- A. 非选择性门体分流术
- B. 食管下端胃底切除术
- C. 限制性门体分流术
- D. 远端脾-肾静脉分流术
- E. 贲门周围血管离断术

【答案】 A

29、某缺铁性贫血的患者口服铁剂 2 月余，复查血红蛋白已正常，此时你建议患者仍需口服铁剂

- A. 3~7 天
- B. 1~2 周
- C. 3~4 周
- D. 4~6 个月
- E. 6 个月~1 年

【答案】 D

30、强心苷治疗心房颤动的机制主要是

- A. 缩短心房有效不应期
- B. 减慢房室传导
- C. 兴奋交感神经
- D. 直接抑制心房颤动
- E. 延长心房不应期

【答案】 B

31、关于月经的临床表现，下列哪项错误

- A. 月经是妇女生殖系统周期性变化的重要标志
- B. 无排卵而有子宫出血称为无排卵性月经
- C. 月经周期是指这次月经第 1 天至下次月经第 1 天
- D. 月经血量呈暗红色不凝固

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/568037101142006134>