专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024湖南省通道侗族自治县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试完整题库附参考答案（典型题）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.胃食管反流病患者应避免使用的药物是（）

A：维生素C

B：美托洛尔

C：特拉唑嗪

D：阿仑膦酸钠

答案：D

2.二甲双胍用于非糖尿病患者的减肥

A：非适应证用药

B：超适应证用药

C：过度治疗用药

D：盲目联合用药

答案：B

3.老年性骨质疏松的"三联药物"治疗

A：长期口服维生素D

B：用甲状旁腺激素

C：钙制剂+维生素D+双膦酸盐

D：单独用双膦酸盐

答案：C

4.常用的抗肿瘤药给药途径有:动脉、静脉、肌内、腔内、口服五种途径用于某些晚期不宜手术或复发的局限性肿瘤

A: 腔内注射

B: 静脉注射

C: 肌内注射

D: 动脉注射

答案：D

5.治疗指数低者静脉滴注给药；治疗指数高者分次给药，以保证血药浓度始终高于最低有效浓度针对

A: 半衰期大于24小时

B: 半衰期小于30分钟

C: 半衰期8～24小时

D: 半衰期大于30小时

答案：B

6.痛风患者急性关节炎期间常见单个关节出现红、肿、热、痛，最常见的病变部位是

A: 第一跖趾关节

B: 腰椎关节

C: 胸椎关节

D: 颈椎关节

答案：A

7.患者，男，66岁，身高170cm，体重85kg，以“头晕、胸闷、乏力1周”为主诉入院治疗。空腹血糖11.2mmol／L，餐后血糖16.5mmol／L。诊断结果：2型糖尿病。既往有磺胺类药过敏史，一直服用硝苯地平控释片、辛伐他汀片、阿司匹林肠溶片控制高血压和冠心病。医师处方：二甲双胍0.5gbid、消渴丸10丸（规格30g／120丸）bid、罗格列酮4mgqd治疗。

A: 糖化血红蛋白（HbA1c）

B: 餐后血糖

C: 白细胞计数

D: 空腹血糖

答案：A

8.药品不良反应按照程度分为轻度、中度、重度三级。

A: 没有临床症状，无需治疗

B: 指不良反应症状明显，重要器官或系统功能有中度损害

C: 指轻微的反应或疾病，症状不发展，一般无需治疗

D: 指不良反应症状不明显，重要器官或系统功能有轻度损害

答案：B

9.患者因扁桃体炎给予头孢拉定治疗，服用4小时后，面部出现皮疹，无其他不适，停药后皮疹消失，排除其他疾病可能，该病例用药与不良反应因果关系评价结果是

A: 肯定?

B: 可能?

C: 可能无关?

D: 很可能?

答案：D

10.两性霉素B用0．9%氯化钠注射液溶解，可导致（）

A：微浑浊或沉淀

B：溶液变色

C：产生胶状不溶物

D: 产生气体

答案：A

11.阿卡波糖可能导致的不良反应是

A: 肌痛、关节痛和高血压

B: 消化道反应、过敏和白细胞减少

C: 腹胀、肠鸣音亢进

D: 心力衰竭和水肿

答案：C

12.告知"新上市药品的品牌名、商品名以及药动学与药效学信息"属于

A: 药品不良反应

B: 禁忌证

C: 新药信息

D: 药物相互作用

答案：C

13.以下不属于胃黏膜保护剂的是（）

A: 克拉霉素

B: 硫糖铝

C: 米索前列醇

D: 胶体果胶铋

答案：A

14.（2018年真题）患者,女,46岁,高血压病史3年,2年前出现关节晨僵、手关节及膝关节疼痛,诊断为类风湿关节炎。半年前症状加重,采用了联合用药方案:患者用药如下:

A: 羟氯喹片

B: 双氯芬酸钠缓释片

C: 氨氯地平片

D: 甲氨蝶呤片

答案：A

15.一些药品吸收二氧化碳发生碳酸化

A: 湿度

B: 日光

C: 温度

D: 空气

答案：D

16.用药剂量相同，妊娠期的血药浓度低于非妊娠期，是由于

A: 妊娠期药物分布容积明显增加

B: 妊娠晚期血流动力学发生改变较多

C: 血容量增加使血浆清蛋白浓度降低

D: 胃肠活动程度减弱，使吸收减慢

答案：A

17.用药期间粪便呈橘红至红色的药物是

A: 水杨酸钠

B: 氢氧化铝制剂

C: 利福平

D: 硫酸钡

答案：C

18.苯二氮（艹卓）类中毒血压下降时可给予

A: 阿托品

B: 有机硫类

C: 间羟胺

D: 地西泮

答案：C

19.缓解视疲劳可选用的药物是()

A: 羟甲基纤维素钠滴眼液

B: 氧氟沙星滴眼液

C: 色甘酸钠滴眼液

D: 酞丁安滴眼液

答案：A

20.特异体质者应当慎用解热镇痛药，其机制是用药后可能发生

A: 惊厥

B: 过敏反应

C: 出血

D: 虚脱

答案：B

21.使用解热镇痛药用于解热，症状未缓解应及时就诊或向医师咨询，一般不超过

A: 1日

B: 3日

C: 2日

D: 4日

答案：B

22.腔道疾病时宜选用

A: 注射剂
B: 软膏剂
C: 片剂
D: 栓剂
答案：D

23.药库接收了一批药品，其中需要在冷处贮藏的是()
A: 乳酶生片
B: 硫普罗宁片
C: 西地碘片
D: 双歧三联活菌胶囊
答案：D

24.与黄连上清丸不宜联用的药物是
A: 氨茶碱
B: 苯巴比妥
C: 乳酶生
D: 氢氧化铝
答案：C

25.糖浆剂给药时的注意事项是
A: 宜含服于舌下，以达到迅速缓解病情的作用
B: 宜用温开水送服，以免药品黏附在咽喉和食管壁上引起刺激，产生恶心等不适
C: 不宜直接给患者服用，应溶解在水中服用，以免呛入气管
D: 服用时在口咽部黏膜表面形成一层保护膜，不宜立刻饮水，以免冲淡药物，降低疗效
答案：D

26.不属于常用缓泻药的作用机制的是

A: 润滑性

B: 容积性

C: 润湿性

D: 膨胀性

答案：C

27.增加胃肠蠕动，影响同服药物吸收

A: 西咪替丁+格列本脲

B: 四环素+硫酸亚铁

C: 青霉素+丙磺舒

D: 多潘立酮+维生素 C

答案：D

28.相互作用延缓或降低抗药性的联合用药是

A: 青蒿素联用乙胺嘧啶

B: 阿托品联用氯磷定

C: 普萘洛尔联用硝苯地平

D: 阿托品联用普萘洛尔

答案：A

29.患者，女，64 岁，患 2 型糖尿病、高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0．59tidpo、瑞格列奈片 1mgtidpo、阿托伐他汀钙片 20mgqdpo 等药物治疗。

A: 停用阿托伐汀钙片

B: 停用瑞格列奈片和阿托伐他汀钙片

C: 停用瑞格列奈片

D: 停用二甲双胍肠溶片

答案：D

30.常用缓泻药的作用机制不包括

A: 刺激性

B: 润湿性

C: 膨胀性

D: 容积性

答案：B

31.下列药物中，属于弱阿片类药物的为

A: 美沙酮

B: 哌替啶

C: 吗啡

D: 曲马多

答案：D

32.患者，女，27岁，妊娠5个月，确诊为单纯性外阴阴道假丝酵母菌病，首选用药方案是

A: 咪康唑栓，阴道给药，每晚1粒（200mg），连用7日

B: 1：2服克林霉素300mg，每日2次，连用7日

C: 甲硝唑阴道栓（片）200mg，阴道用药，每晚1次.连用7日

D: 口服甲硝唑400mg，每日2次，连服7日

答案：A

33.适宜餐前给药的药物是

A: 法莫替丁

B: 复方铝酸铋

C：缬沙坦

D：二甲双胍

答案：B

34.(妊娠的危险性分级)在动物生殖试验中并未显示对胎儿的危险，但无孕妇的对照组；或对动物生殖试验显示有副作用(较不育为轻)，但在早孕妇女的对照组中并不能肯定其不良反应(并在中、晚期妊娠亦无危险的证据)

A：A级

B：C级

C：D级

D：B级

答案：D

35.患者，女，55岁，诊断为类风湿关节炎，既往有十二指肠溃疡病史。医生给予甲氨蝶呤+柳氮磺吡啶治疗。甲氨蝶呤用法用量正确的是

A：7.5mgqd

B：7.5mgtid

C：7.5mgqod

D：7.5mgqw

答案：D

36.具有降低TC、LDL-C和TG，升高HDL-C的作用的是（）

A：普罗布考

B：烟酸类

C：他汀类

D：依折麦布

答案：B

37.(常用的特殊解毒剂的适应证)，对乙酰氨基酚过量的特殊解毒剂

A: 谷胱甘肽

B: 纳洛酮

C: 乙酰半胱氨酸

D: 二巯丁二钠

答案：C

38.以下医学检查项目中，主要用于诊断急性胰腺炎的是

A: 淀粉酶增高

B: 血淀粉酶

C: 尿淀粉酶

D: 肌酸激酶增高

答案：A

39.格列本脲

A: 宜清晨服用

B: 宜睡前服用

C: 宜餐后服用

D: 宜餐前服用

答案：D

40.可治疗男性性功能障碍的药物是

A: 维生素 E

B: 度洛西汀

C: 沙美特罗

D: 西地那非

答案：D

41.患者，女，39岁，有哮喘病史。1天前因发热服用阿司匹林250mg，用药后30分钟哮喘严重发作，大汗、发绀、强迫坐位。

A: 这是由于发热引发了哮喘

B: 这是阿司匹林中毒的表现

C: 这是由于阿司匹林诱发了哮喘

D: 可用肾上腺素治疗

答案：C

42.患者，男，26岁，因“咳嗽伴间断发热1周”入院，查体：T38.9℃，P90次/分，R21次/分，BP110/70mmHg，血常规：白细胞16.9×109/L，中性粒细胞百分比84.6%；胸部CT示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”。

A: 莫西沙星属于氟喹诺酮类

B: 莫西沙星对非典型病原体无效

C: 莫西沙星对厌氧菌无效

D: 莫西沙星可覆盖社区获得性肺炎的常见病原体

答案：B

43.针对该患者的现有症状,应选用的药物是（）

A: 奥美拉唑肠溶胶囊

B: 多潘立酮片

C: 布地奈德吸入剂

D: 单硝酸异山梨酯缓释片

答案：A

44.患者向药师咨询停用口服避孕药后多久可备孕。下列答复中正确的是()

A：复方短效口服避孕药停药3个月后方可备孕

B：复方短效口服避孕药停药后即可备孕

C：复方短效口服避孕药停药6个月后方可备孕

D：长效避孕药停药后即可备孕

答案：B

45.代表乙型肝炎病毒e抗原的是

A：HBeAg

B：HBeAb

C：HBcAb

D：HBsAb

答案：A

46.以下关于抑郁症的介绍错误的是

A：该病具有高发病、高复发、高致残的特点

B：抑郁症的好发年龄在20～50岁

C：及时恰当的治疗能提高抑郁症的临床治愈率

D：抑郁症的病因明确

答案：D

47.患者,女,49岁,近日因发热、咳嗽、咳黄痰就诊,临床诊断为下呼吸道细菌性感染,处方如下：

A：甲硝唑餐后服用

B：铋剂餐后服用

C：质子泵抑制剂餐后服用

D：甲硝唑餐前服用

答案：A

48.患者，男，32岁，患有肠易激综合征（IBS），常排便较急，一般每日3～5次，可有黏液，但无脓血，近期服用吗氯贝胺控制抑郁症。针对该患者，不宜使用的IBS治疗药物是

A: 蒙脱石散

B: 地芬诺酯

C: 山莨菪碱

D: 利福昔明

答案：B

49.药品中的危险品应存放于(),

A: 常温库

B: 凉暗库

C: 专用仓库

D: 低温库

答案：C

50.服药后应保持上身直立的药物是

A: 阿仑膦酸钠

B: 阿莫西林

C: 硫酸亚铁

D: 去氨加压素

答案：A

51.患者,女,68岁,体重45kg,因发热、咳嗽咳痰入院治疗,临床诊断为社区获得性肺炎。化验结果:白细胞计数11.76×109/L,肌酐清除率18ml/min。该患者使用下列抗菌药物治疗时不需要减量的是()

A: 莫西沙星

B: 左氧氟沙星

C: 阿莫西林

D: 头孢噻肟钠

答案：A

52.门诊处方药品用量一般不宜超过

A: 15 日用量

B: 3 日用量

C: 1 日用量

D: 7 日用量

答案：D

53.应用胆碱酯酶复活剂时做法错误的是()。

A: 复活剂不需稀释，可以直接注射

B: 不能与碱性药物并用

C: 切勿两种或三种复活剂同时使用，以免毒性增加

D: 复活剂对解除烟碱样作用和促使患者昏迷苏醒的作用比较明显

答案：A

54.脂溶性维生素 A 宜餐后服用的原理是

A: 餐后胃酸分泌增多有利于吸收

B: 延长在胃肠道中的滞留时间

C: 利用油脂增加其溶解

D: 减少被胃酸破坏

答案：C

55.正常人的体温在37℃左右，但各个部位的温度不尽相同，内脏温度最高，头部次之，皮肤和四肢末端的温度最低。发热是指人体体温升高，超过正常范围。发热是人体对致病因子的一种全身性防御反应，是患病时常伴发或主要表现的一种症状。

A: 口腔温度超过37.3℃

B: 直肠温度超过36.3℃

C: 腋下温度超过36.6℃

D: 口腔温度超过37.0℃

答案：A

56.抗胆碱药或抗过敏药用于伴有青光眼患者，应评判为

A: 有禁忌证用药

B: 过度治疗用药

C: 无适应证用药

D: 联合用药不适宜

答案：A

57.下列药品可以申请医疗机构制剂的是

A: 中药注射剂

B: 生物制品（变态反应原除外）

C: 中药颗粒剂

D: 中药、化学药的复方制剂

答案：C

58.下列情况不宜选用的抗高血压药，直立性低血压不宜选用

A: 利尿药

B: 非二氢吡啶类钙拮抗剂

C: 哌唑嗪

D: ACEI

答案：C

59.患者，女，52岁，近年来发现手关节肿痛，且呈对称性，并有畸形，晨起时有僵硬现象持续1小时，疼痛难忍。经实验室检测示血沉28mm／1h，指尖关节的X线片显示受累关节有骨侵蚀特征。

A：柳氮磺吡啶

B：环孢素

C：来氟米特

D：甲氨蝶呤

答案：D

60.淋巴细胞正常参考区间是

A：0.03～0.08

B：0.20～0.40

C：0～0.01

D：0.005～0.05

答案：B

61.新生儿白细胞计数的正常范围值

A：（11.0～12.0）×109/L

B：（10.0～20.0）×109/L

C：（15.0～20.0）×109/L

D：（3.5～10.0）×109/L

答案：C

62.(毒物及药物中毒解救)，烯丙吗啡用于解救

A：吗啡中毒

B：水银中毒

C：有机磷中毒

D：氰化物中毒

答案：A

63.患者，女，42岁。左足背部出现严重冻疮，可考虑应用

A：肝素钠乳膏

B：紫云膏

C：樟脑软膏

D：赛庚啶

答案：A

64.下列哪种药物不会引起丙氨酸氨基转移酶(ALT、GPT)升高()。

A：硝苯地平

B：阿昔洛韦

C：氟康唑

D：克林霉素

答案：A

65.有关汞中毒的解救措施，错误的是

A：可以用二巯丙磺钠驱汞

B：可以用青霉胺驱汞

C：口腔出现炎症时，可以用2%碳酸氢钠或氯己定含漱

D：可以用二巯丙醇驱汞，并应酸化尿液以促进排泄

答案：D

66.（2017年真题）因可提高血液携氧量,被长跑运动员用于提高成绩,因而被列为兴奋剂管理的药物是（）

A：可卡因

B：人促红素

C：哌替啶

D：甲睾酮

答案：B

67.普萘洛尔的别名是

A：安痛定

B：消心痛

C：心得安

D：心痛定

答案：C

68.易受光线影响而变质的药品

A：安乃近

B：肝素

C：冰硼散

D：氰化钾

答案：B

69.临床用药实践表明，人类正常饮食中的一些品种将影响某些药物的药理作用。酒是人类饮食中对药物疗效影响最大的品种。酒的主要成分为乙醇，饮用后人体先是兴奋，随之其对中枢神经产生抑制作用，并扩张血管，刺激或抑制肝药酶代谢系统；另外，有些药也可延迟酒的代谢和分解。总体上，药与酒的相互作用结果有两个：一是降低药效；二是增加不良反应发生率。

A：血糖不降

B：低血糖症状

C：血压升高

D：过敏反应

答案：B

70.检查栓剂／软膏剂的异嗅和散剂的气味属于

A: 嗅觉试验

B: 视觉试验

C: 听觉试验

D: 触觉试验

答案：A

71.患者，男,69岁，BMI27．8kg/mr,既往有骨性关节炎病史。近期爬山后，再次出现膝关节疼痛，患者热敷后疼痛未缓解，前来咨询如何选用“止痛药"。

A: 便秘

B: 肾损害

C: 共济失调

D: 口干

答案：B

72.妊娠初始3个月妇女禁用的药品是

A: 阿司匹林

B: 硫糖铝

C: 乳酸菌素

D: 沙利度胺

答案：D

73.患者，女，22岁，因淋雨导致发热、咳痰伴胸痛1天就诊。查体：体温38.6℃，脉搏90次/分，呼吸24次/分，血压正常；双肺布满湿啰音。实验室检查：WBC11×109/L，胸片显示斑片状浸润性阴影。既往无过敏史。选用有效抗生素治疗后2天，体温恢复正常，咳痰减少。

A: 慢性阻塞性肺病

B: 社区获得性肺炎

C: 医院获得性肺炎

D: 支气管炎

答案：B

74.可提示隐性黄疸或亚临床性黄疸的是

A: STB>342μmol/L

B: STB17.1μmol/L～34.2μmol/L

C: STB34.2μmol/L～171μmol/L

D: STB17.1μmol/L～171μmol/L

答案：B

75.患者,男,21岁因过敏性鼻炎就诊。关于过敏性鼻炎药物治疗及用药教育的说法,错误的是()

A: 治疗过敏性鼻炎可局部使用糖皮质激素鼻喷剂

B: 治疗过敏性鼻炎使用口服糖皮质激素,首选地塞米松

C: 过敏性鼻炎的典型症状和感冒症状相似,应注意鉴别

D: 过敏性鼻炎患者应尽量避免接触已知的过敏原

答案：B

76.患者，女，75岁，因腰痛无法起床2天就诊。患者已有多年的腰痛病史，经物理疗法后可有所好转。现于久坐之后起立困难，行走为小

步慢行。夜间经常失眠，早晨自觉腰痛而无法起床。既往无抗癫痫药、抗甲状腺药及糖皮质激素长期服用史，但是患慢性阻塞性肺疾病 10 余年。经 x 线检查诊断为老年性骨质疏松症导致的腰椎压缩性骨折。

A：地西泮

B：水合氯醛灌肠

C：唑吡坦

D：苯巴比妥

答案：C

77.用药后不会出现畸形胎儿的时间是在受精后

A：20天之内

B：15天之内

C：10天之后

D：15天之后

答案：B

78.患者,男，72岁既往有高血压、心绞痛、心力衰竭、房室传导阻滞和胃溃疡病史。一个月前因出现哮喘症状就诊医师布地奈德气雾剂200μgbid吸入沙丁胺醇气雾剂100μgprn吸入,氨氯地平片5mgqd口服及硝酸甘油片0.5mgprn舌下含服治疗。

A：沙丁胺醇的不良反应

B：布地奈德剂量太大

C：硝酸甘油剂量不足

D：氨氨地平的不良反应

答案：A

79.属于白三烯受体阻断剂的是

A：孟鲁司特

B：多索茶碱

C：氨茶碱

D：曲尼司特

答案：A

80.是否增加房颤患者死亡率尚无定论，可谨慎地用于房颤的心室率控制的是()

A：地高辛

B：美托洛尔

C：普罗帕酮

D：地尔硫

答案：A

81.长期大量用药时，可出现流感样症状的抗结核药是

A：链霉素

B：乙胺丁醇

C：利福平

D：异烟肼

答案：C

82.依据咳嗽的发病时间，夜间咳嗽者宜首选()。

A：可待因

B：右美沙芬

C：吗啡

D：苯丙哌林

答案：B

83.服药饮酒可致使低血糖、呼吸抑制的是

A：吲哚美辛

B：普萘洛尔

C：格列本脲

D: 甲氨蝶呤

答案：C

84.患者，女，45岁，6个月前出现口吐白沫、意识丧失、二便失禁。在神经专科医生指导下进行抗癫痫药物治疗，症状控制较好。近3个月服用西咪替丁，患者出现脱发、体重增加、胃肠道功能紊乱。该患者在全国各地求医，服用各种药物，具体药物品种不详。围绕该病例，医师、药师、护士对抗癫痫药物的安全用药和用药注意事项进行讨论。

A: 苯巴比妥

B: 卡马西平

C: 丙戊酸钠

D: 地西泮

答案：C

85.可提示肝细胞性黄疸的是

A: 17.1μmol/L～171μmol/L

B: 34.2μmol/L～171μmol/L

C: 17.1μmol/L～34.2μmol/L

D: >342μmol/L

答案：A

86.真性红细胞增多症

A: 淋巴细胞增多

B: 白细胞减少

C: 白细胞增多

D: 红细胞沉降率减慢

答案：D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/568063013042007022