

精神科护士护理专科知识考核

一、单选题

1、关于抗精神病药的使用原则，下列哪项描述是正确的（）[单选题]。

- A、初始计量宜大
- B、老年患者用药剂量通常与成年人无明显差异
- C、对于首发的精神分裂症患者，在症状消失后，即可停用药物
- D、对于反复发作的精神分裂症患者，建议出院后维持用药 1~2 年
- E、对于药物依从性差的患者，可考虑注射针或口服液 ✓

2、下列哪项属于抗精神病药（）[单选题]。

- A、地西洋
- B、氟哌啶醇 ✓
- C、舍曲林
- D、碳酸锂
- E、文拉法辛

3、下列哪项属于抗抑郁（）[单选题]。

- A、奥氮平
- B、卡马西平
- C、帕罗西汀 ✓
- D、美金刚
- E、劳拉西泮

4、躁狂发作急性期治疗的最佳血清锂浓度范围是（）[单选题]。

A、0.4~0.8mmol/L

B、0.8~1.2mmol/L ✓

C、1.2~1.4mmol/L

D、1.4~1.6mmol/L

E、1.6~1.8mmol/L

5、不属于椎体外系反应的是（）[单选题]。

A、体位性低血压 ✓

B、急性肌张力障碍

C、迟发性运动障碍

D、静坐不能

E、药源性帕金森综合征

6、不属于锂盐早期中毒表现的是（）[单选题]。

A、高热 ✓

B、手细颤变为粗颤

C、困倦或烦躁不安

D、反复呕吐或腹泻

E、轻度意识障碍

7、下列哪项因素会降低患者的药物依从性（）[单选题]。

A、患者对药物治疗持积极的态度

B、患者能正确应对药物不良反应

C、患者存在严重的被害妄想症、木僵 ✓

D、患者对坚持服药有充足的信心

E、患者能主动的按时复诊

8、下列哪项不属于精神药物治疗相关的常见护理问题（）[单选题]。

A、不合作

B、便秘

C、焦虑

D、体重增加

E、尿失禁 ✓

9、关于精神药物的给药护理措施，描述正确的是（）[单选题]。

A、静脉滴注舒必利，速度宜快，每分钟 100 滴

B、发药时，如患者不在，应将药物留在患者床头上

C、肌肉注射氟哌啶醇时，应选择臀大肌 ✓

D、肌肉注射氯硝西泮后，为加快药物吸收，可揉搓注射部位

E、使用长效缓释片的患者，如果拒绝服药，可将药物研碎后强制患者服药

10、关于抗抑郁药使用的原则描述正确的是（）[单选题]。

A、多数抗抑郁药采用早餐后顿服

B、当抑郁症缓解后，可以停药

C、一般小剂量起始，1~2 周加至最高治疗有效剂量 ✓

D、维持剂量宜与有效治疗剂量相当

E、反复发作者建议间断大剂量冲击治疗，在症状缓解期可以停止使用抗抑郁药

11、下列哪项属于抗精神病药所致的锥体外系反应（）[单选题]。

A、意识障碍

B、过度镇静

C、体重增加

D、急性肌张力障碍 ✓

E、体位性低血压

12、阿片类物质平均使用多长时间即可形成依赖（）[单选题]。

A、半个月

B、1 个月 ✓

C、2 个月

D、3 个月

E、4 个月

13、《中华人民共和国精神卫生法》正式实施时间（）[单选题]。

A、2013 年 4 月 1 日

B、2013 年 5 月 1 日 ✓

C、2013 年 6 月 1 日

D、2013 年 3 月 1 日

E、2013 年 7 月 1 日

14、精神科护理中最重要的一环（）[单选题]。

A、环境管理

B、心理护理

C、安全管理 ✓

D、病人管理

E、精神疾病特性的管理

15、新入院病人应安置于（）[单选题]。

- A、隔离病房
- B、一级病房
- C、二级病房 ✓
- D、三级病房
- E、抢救病房

16、精神科最为常见的危急事件（）[单选题]。

- A、出走
- B、暴力 ✓
- C、自杀自杀
- D、跌倒
- E、噎食

17、精神患者暴力攻击风险按严重程度分为几级（）[单选题]。

- A、2 级
- B、3 级
- C、4 级 ✓
- D、5 级
- E、6 级

18、患者有主动的言语攻击，被动的躯体攻击，及既往有主动的躯体攻击等，严重程度属于几级（）
[单选题]。

- A、Ⅰ 级
- B、Ⅱ级

C、III级 ✓

D、IV级

E、V级

19、下列哪项因素会降低患者的药物依从性（）[单选题]。

A、患者对药物治疗持积极的态度

B、患者能正确应对药物不良反应

C、患者存在严重的被害妄想症、木僵 ✓

D、患者对坚持服药有充足的信心

E、患者能主动的按时复诊

20、下列哪项不属于精神科常见的危急状态（）[单选题]。

A、出走

B、暴力

C、自杀自杀

D、跌倒

E、缄默 ✓

21、交接班重点做到（）[单选题]。

A、书面交接

B、口头交接

C、床边交接

D、以上都是 ✓

E、以上都不是

22、对于有自杀倾向的抑郁症患者，首要的护理措施是（）[单选题]。

A、饮食护理

B、睡眠饮食

C、日常生活护理 ✓

D、安全管理

E、环境管理

23、下列哪项是精神科常见的级危状态（）[单选题]。

A、暴力、噎食、自缢、锥体外系不良反应

B、自缢、暴力、噎食、流涎

C、暴力、噎食、自缢、出走

D、暴力、噎食、锥体外系不良反应 ✓

E、出走、暴力、流涎、出走

24、出院后精神病人的家庭护理必须做到一个“定期”是（）[单选题]。

A、定期预检

B、定期服药

C、定期做好心理护理

D、定期复查 ✓

E、定期康复

25、目前抗抑郁药物起效时间为服药后几天左右（）[单选题]。

A、3 天

B、7 天

C、10 天

D、14 天 ✓

E、24 天

26、抑郁症的典型临床表现（）[单选题]。

A、晨重夕轻 ✓

B、自我评价过低

情绪低落

D、夕重

E、心境

27、躁狂发作病人首选药物（）[单选题]。

A、丙戊酸镁

B、碳酸锂 ✓

C、丙戊酸钠

D、卡马西平

E、托吡酯

28、一般静脉输液钢针穿刺处的皮肤消毒直径;外周静脉留置针穿刺处皮肤消毒直径;.PICC.穿刺处的皮肤消毒直径。（）[单选题]。

A、 $\geq 5\text{ cm}$ 、 $\geq 10\text{ cm}$ 、 $\geq 20\text{ cm}$

B、 $\geq 5\text{ cm}$ 、 $\geq 8\text{ cm}$ 、 $\geq 20\text{ cm}$ ✓

C、 $\geq 8\text{ cm}$ 、 $\geq 10\text{ cm}$ 、 $\geq 20\text{ cm}$

D、 $\geq 5\text{ cm}$ 、 $\geq 10\text{ cm}$ 、 $\geq 15\text{ cm}$

E、 $\geq 5\text{ cm}$ 、 $\geq 8\text{ cm}$ 、 $\geq 20\text{ cm}$

29、心脏性猝死是指在急性症状开始的多少小时内发生心脏骤停（）[单选题]。

A、6 小时内

B、2 小时内

C、3 小时内

D、1 小时内 ✓

E、4 小时内

30、静脉留置针的进针角度（）[单选题]。

A、5-10°

B、15-45°

C、15-30° ✓

D、30-55°

E、15-25°

31、跌倒/坠床风险评估分值多少属于高危人群（）[单选题]。

A、≥35 分

B、≥55 分

C、≥45 分 ✓

D、≥25 分

D、≥65 分

32、DVT 常见好发部位（）[单选题]。

A、上肢

B、下肢 ✓

C、四肢肢端

D、关节部位

E、腕部

- 、踝肱指数正常值：（）[单选题]。
- A、0.5-1.5
- B、1.0-1.5
- C、0.5-1.0
- D、0.9-1.3
- E、0.5-1.3
- 34、糖尿病足患者，进行充分的血糖控制，糖化血红蛋白控制（）[单选题]。
- A、HbA1c >7%
- B、HbA1c<7% ✓
- C、HbA1c<6.5%
- D、HbA1c<7.5%
- E、HbA1c >7.5%
- 35、口臭患者应选用的漱口液是（）[单选题]。
- A、1% ~4% 碳酸氢钠
- B、0.1% 乙酸
- C、等渗盐水
- D、2% 呋喃西林
- E、稀释后双氧水溶液 ✓

二、多选题

- 1、下列哪些属于精神药物（）[多选题]。
- A、抗精神药 ✓

、抗抑郁药

C、抗焦虑药 ✓

D、心境稳定剂 ✓

E、中枢神经兴奋药 ✓

2、药物依从性的评估内容包括（）[多选题]。

A、患者是否积极配合药物治疗 ✓

B、患者有无拒绝服药、治疗等现象的发生 ✓

C、有无影响治疗依从性的精神症状，如被害妄想、木僵等 ✓

D、患者对药物不良反应有无担心或恐惧 ✓

E、患者对坚持服药的信心如何 ✓

3、当患者接受精神药物治疗时，护理评估内容包括（）[多选题]。

A、药物依从性 ✓

B、患者的躯体状况 ✓

C、患者的精神状态 ✓

D、药物不良反应 ✓

E、药物知识与社会支持 ✓

4、药物不良反应的评估内容包括（）[多选题]。

A、既往使用精神药物后出现的不良反应 ✓

B、患者对不良反应的耐受性、情绪变化 ✓

C、患者自我处理不良反应的经验 ✓

D、患者使用精神药物后的疗效

E、哪些不良反应是患者无法接受的 ✓

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/568074022142007021>