

## 2024 年广东省清城区《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题大全附参考答案（培优 B 卷）

### 第 I 部分 单选题（100 题）

1. 能竞争 DNA 聚合酶的抗病毒药是

- A: 利巴韦林
- B: 碘苷
- C: 阿昔洛韦
- D: 拉米夫定

答案：C

2. （2017 年真题）可能引起持续性干咳的抗高血压药是（）

- A: 氨氯地平
- B: 阿利克仑(阿利吉仑)
- C: 硝普钠
- D: 卡托普利

答案：D

3. 属于钙通道阻滞剂的抗心律失常药是（）

- A: 利多卡因
- B: 胺碘酮
- C: 维拉帕米
- D: 普鲁卡因胺

答案：C

4. 以降低总胆固醇(TC)和低密度脂蛋白(LDL)含量为主的药物是

- A: 非诺贝特
- B: 辛伐他汀
- C: 烟酸
- D: 氯贝丁酯

**答案：B**

5. 下述种类的利尿药中，利尿作用最强的是

- A: 袢利尿剂
- B: 噻嗪类利尿剂
- C: 留钾利尿剂
- D: 碳酸酐酶抑制剂

**答案：A**

6. 与唑来膦酸合用可使颌骨坏死的发生率升高的药物是

- A: 抗血管生成药
- B: 萘普生
- C: 高钙食品
- D: 沙利度胺

**答案：A**

7. 主要用于复发转移乳腺癌、乳腺癌术后转移的辅助治疗和子宫内膜癌的治疗的药物是

- A: 氟维司群
- B: 他莫昔芬
- C: 来曲唑
- D: 依西美坦

**答案：B**

8. 采用华法林钠治疗需短期缓解痛楚时，宜选用的药品是()

- A: 维生素 B12
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 维生素 B1
- D: 维生素 B2

**答案：B**

9. 可能导致牙龈出血的药物是

- A: 普伐他汀
- B: 普萘洛尔
- C: 拉西地平
- D: 依诺肝素

**答案：D**

10. 与氢氯噻嗪不存在交叉过敏反应的是

- A: 依他尼酸
- B: 磺胺类药
- C: 布美他尼
- D: 呋塞米

**答案：A**

11. 维生素 A 缺乏时可引起

- A: 坏血病
- B: 角膜软化
- C: 脚气病
- D: 成人佝偻病

**答案：B**

12. 用于合胞病毒引起的肺炎和支气管肺炎的抗病毒药是

- A: 利巴韦林
- B: 碘苷
- C: 拉米夫定
- D: 更昔洛韦

**答案：A**

13. 以降低三酰甘油为主要治疗目标时，首选的调血脂药是

- A: 依折麦布
- B: 瑞舒伐他汀
- C: 非诺贝特
- D: 辛伐他汀

**答案：C**

14. 下列哪种药物能抑制尿酸生成的是

- A: 呋塞米
- B: 丙磺舒
- C: 秋水仙碱
- D: 别嘌醇

**答案：D**

15. (2020 年真题) 患者，男，66 岁。BMI24kg/m<sup>2</sup>，高血压病史 15 年，冠心病史 3 年，目前规律服用阿司匹林、贝那普利、氨氯地平、美托洛尔、阿托伐他汀、螺内酯、呋塞米、单硝酸异山梨酯治疗。患者饮酒饱餐后出现胸闷，心前区疼痛，自服 1 片硝酸甘油不能缓解，来急诊科就诊。查体：血压 163/83mmHg，心率 80 次/分。临床诊断为：(1) 心绞痛急性发作；(2) 心功能不全、心功能 III 级；(3) 高血压病 3 级；(4) 高脂血症。

- A: 呋塞米
- B: 美托洛尔
- C: 氨氯地平
- D: 阿托伐他汀

**答案：B**

16. 在常用剂量下，非那雄胺可使血清前列腺特异抗原 (PSA) 水平下降的幅度为

- A: 0.1
- B: 0.6
- C: 0.5
- D: 0.25

**答案：C**

17. 润滑性泻药 ()

- A: 甘油
- B: 地芬诺酯
- C: 硫酸镁
- D: 乳果糖

**答案：A**

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

18. 适用于需要尽快解决急性症状的抗前列腺增生症药物是

- A: 坦洛新
- B: 西地那非
- C: 丙酸睾酮
- D: 非那雄胺

**答案：A**

19. 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌感染宜首选的抗菌药物是()。

- A: 罗红霉素
- B: 头孢曲松
- C: 头孢他啶
- D: 利奈唑胺

**答案：D**

20. 吸入用布地奈德混悬液抗炎作用是氢化可的松的

- A: 25 倍
- B: 40 倍
- C: 15 倍
- D: 100 倍

**答案：D**

21. 对曲霉无效的药物是

- A: 伊曲康唑
- B: 两性霉素 B
- C: 伏立康唑
- D: 氟康唑

**答案：D**

22. 关于单克隆抗体抗肿瘤药物的描述错误的是()

- A: 贝伐珠单抗作用于血管内皮生长因子
- B: 对癌细胞和正常体细胞都有"杀灭"作用
- C: 利妥昔单抗主要用于淋巴瘤的治疗
- D: 静脉滴注可致过敏样反应

**答案：B**

23. 不良反应为刺激性干咳的药物是()

- A: 硝酸甘油
- B: 氨氯地平
- C: 哌唑嗪
- D: 依那普利

**答案：D**

24. 直接舒张小动脉平滑肌的降压药是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 硝苯地平
- C: 肼屈嗪
- D: 利血平

**答案：C**

25. 大剂量可导致 Q-Tc 间期延长的是

- A: 西沙必利
- B: 莫沙必利
- C: 甲氧氯普胺
- D: 多潘立酮

**答案：A**

26. 骨髓抑制最严重的是()

- A: 卡铂
- B: 奥沙利铂
- C: 亚叶酸钙
- D: 顺铂

**答案：A**

27. 伴有冠心病的高血压患者宜选用

- A: 尼莫地平
- B: 维拉帕米
- C: 尼群地平
- D: 硝苯地平

**答案：D**

28. (2021 年真题) 能抑制外周 (甲状腺外) T<sub>4</sub> 转化为 T<sub>3</sub> 的抗甲状腺药物是 ( )

- A: 卡比马唑
- B: 甲巯咪唑
- C: 丙硫氧嘧啶
- D: 美托洛尔

**答案：C**

29. 用于防止排异反应、糖皮质激素不能长期缓解的多种自身免疫性疾病的是 ( )

- A: 环孢素
- B: 环磷酰胺
- C: 硫唑嘌呤
- D: 甲泼尼龙

**答案：B**

30. 长期大量服用维生素 A 会出现

- A: 疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、食欲减退、贫血、眼球突出等中毒现象

- B: 低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症
- C: 严重神经感觉异常，进行性步态不稳至足麻木、手不灵活
- D: 视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等

**答案：A**

31. 属于胞嘧啶抗代谢类药物的是()

- A: 吉西他滨
- B: 巯嘌呤
- C: 长春瑞滨
- D: 甲氨蝶呤

**答案：A**

32. 属于抑制疟原虫的二氢叶酸还原酶，阻碍核酸合成的抗疟药物是

- A: 奎宁
- B: 吡喹酮
- C: 乙胺嘧啶
- D: 青蒿素

**答案：C**

33. 接受多西他赛治疗的患者为减少多西他赛导致的水钠潴留和超敏反应所采取的下列预处理方案中确的是（）

- A: 输注多西他赛前 30 分钟肌注维生素 B120|mg
- B: 输注多西他赛前先肌注苯海拉明,25mgq8h,持续 3 天
- C: 在使用多西他赛前先口服地塞米松 8mg,BiD,持续 3 天
- D: 使用多西他赛前先口服叶酸片,5mg,BiD 持续 3 天

**答案：C**

34. 抑制 DNA 多聚酶

- A: 氟尿嘧啶
- B: 羟基脲
- C: 甲氨蝶呤
- D: 阿糖胞苷

**答案：D**

35. 下列药物除哪项外都属于钙拮抗剂()

- A: 溴苄胺
- B: 地尔硫
- C: 硝苯地平
- D: 维拉帕米

**答案：A**

36. (2017 年真题) 奎宁或氯喹日剂量超过 1g 或持续长时间应用，可见耳鸣、头疼、视力与听力减退等，停药后即可恢复，临床成为 ( )

- A: 神经毒性反应
- B: 金鸡纳反应
- C: 双硫仑样反应
- D: 郝氏反应

**答案：B**

37. 与避孕药同时服用，不会导致避孕失败的药物是

- A: 苯巴比妥
- B: 利福平
- C: 四环素
- D: 环孢素

**答案：D**

38. 头孢曲松

- A: 肾毒性较大
- B: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染
- C: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染
- D: 口服，肌肉注射或静脉注射均可用于全身感染

**答案：C**

39. 属于必需氨基酸，人体不能合成或合成速度不能满足人体需要的是

- A: 赖氨酸
- B: 复方氨基酸注射液(18AA)
- C: 复方氨基酸注射液(3AA)
- D: 精氨酸

**答案：A**

40. 可导致视神经炎的抗结核药

- A: 乙胺丁醇
- B: 利福喷丁
- C: 利福平
- D: 吡嗪酰胺

**答案：A**

41. 患者，男，62岁。高血压病史10年，既往有骨关节炎和血脂异常，轻度心功能不全。近期体检发现血压162/80mmHg，心率72次/分。该患者日前服用的药物除抗高血压药外有辛伐他汀、双氯芬酸、氨基葡萄糖、甲钴胺及碳酸钙D。

- A: 特拉唑嗪
- B: 美托洛尔
- C: 氢氯噻嗪

D: 双氯芬酸

**答案：C**

42. (2020 年真题) 患者，女，63 岁。急性心肌梗死行经皮冠状动脉介入 (PCI) 治疗，术后为预防支架内血栓形成，常与阿司匹林联合使用的药物是

A: 氯吡格雷

B: 双氯芬酸

C: 华法林

D: 奥美拉唑

**答案：A**

43. 不能阻滞钠通道的抗心律失常药物是()

A: 利多卡因

B: 普鲁卡因胺

C: 普萘洛尔

D: 普罗帕酮

**答案：C**

44. 对 G

A: 第三代头孢菌素

B: 第二代头孢菌素

C: 第四代头孢菌素

D: 第一代头孢菌素

**答案：D**

45. 奥司他韦对下列哪种病毒有效

A: 疱疹病毒

- B: 甲型肝炎病毒
- C: 巨细胞病毒
- D: 甲型、乙型流感病毒

**答案：D**

46. (2016 年真题) 可导致神经毒性（四肢麻木、腱反射消失）的抗肿瘤药是

- A: 柔红霉素
- B: 紫杉醇
- C: 长春新碱
- D: 博来霉素

**答案：C**

47. 肥胖糖尿病患者选用()

- A: 格列本脲
- B: 二甲双胍
- C: 胰岛素
- D: 丙硫氧嘧啶

**答案：B**

48. 阿托品用于全麻前给药的目的是()

- A: 增强麻醉效果
- B: 减少麻醉药的用量
- C: 减少呼吸道腺体分泌
- D: 预防心动过缓

**答案：C**

49. 可直接地抑制凝血因子 Xa，并与抗凝血酶 II 结合，形成构象改变，使凝血酶抗 Xa 因子活性增强 270 倍，阻碍凝血酶（凝血因子 IIa）产生的抗凝血药是（）。

- A: 磺达肝葵钠
- B: 依诺肝素
- C: 阿哌沙班
- D: 水蛭素

**答案：C**

50. 伊曲康唑与肝药酶的关系是

- A: 伊曲康唑主要经 CYP1A2 酶代谢
- B: CYP3A4 酶的诱导剂
- C: CYP3A4 酶的抑制剂
- D: 伊曲康唑主要经 CYP2C9 酶代谢

**答案：C**

51. 患者，男，67 岁，为葡萄糖-6 磷酸脱氢酶缺乏症患者，如果使用复方磺胺甲噁唑，可能引发的药源性疾病是

- A: 急性溶血性贫血
- B: 抗生素相关性腹泻
- C: 肌肉震颤
- D: 红人综合征

**答案：A**

52. 属于合成的麻醉性镇痛药的是

- A: 美沙酮
- B: 可待因
- C: 吗啡

D: 布洛芬

**答案：A**

53. 其缓释混悬液制剂应空腹服用的是

A: 克拉霉素

B: 红霉素

C: 氨曲南

D: 阿奇霉素

**答案：D**

54. 抗血小板药西洛他唑属于

A: 磷酸二酯酶抑制剂

B: 维生素 K 拮抗剂

C: 二磷酸腺苷 P2Y<sub>12</sub> 受体阻断剂

D: 整合素受体阻断剂

**答案：A**

55. 主要以原型经肾脏排泄，终末消除相的时间较长，滴注后 2~28 日内在血浆中仍保持较低浓度，终末消除半衰期为 146 小时的是

A: 阿仑膦酸钠

B: 依替膦酸二钠

C: 唑来膦酸

D: 帕米膦酸二钠

**答案：C**

56. 头孢唑林()

A: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于脑膜炎

B: 肾毒性较大

C: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注

D: 用于非典型致病原感染

**答案: B**

57. 氯吡格雷应避免与奥美拉唑联合应用，因为两者竞争共同的肝药酶，该肝药酶是()。

A: CYP2D6

B: CYP286

C: CYP2C19

D: CYP2E1

**答案: C**

58. 下列属于非选择性  $\beta$  受体阻断剂的是

A: 普萘洛尔

B: 阿替洛尔

C: 比索洛尔

D: 美托洛尔

**答案: A**

59. (2019 年真题) 长期使用可能导致血钾升高的降压药物是 ( )

A: 美托洛尔

B: 氨氯地平

C: 硝普钠

D: 贝那普利

**答案: D**

60. 美沙拉秦迟释制剂的释放具有 pH 依赖性，外层包衣溶解在回肠远端，此处需 pH

- A: 在 4~5
- B: 小于或等于 4
- C: 在 1~2
- D: 大于或等于 6

**答案：D**

61. (2021 年真题) 患者，女，70 岁，BMI $21\text{kg/m}^2$ ，45 岁时绝经，10 年前开始，经常出现腰背部疼痛，活动后加重，但未就诊，平日外出活动较少，近 5 年身高降低，驼背明显。10 天前患者不慎摔倒，上肢活动受限、疼痛，就诊后检查结果：血钙  $1.97\text{mmol/L}$ ，血磷  $1.7\text{mmol/L}$ ，右上肢 X 光检查提示：右桡骨远端骨折。骨密度检查结果：T 值 ( $-2.9$ )。

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 双醋瑞因
- C: 秋水仙碱
- D: 地塞米松

**答案：A**

62. 多烯磷脂酰胆碱作为保护肝细胞药的作用机制是

- A: 促进胆汁分泌，减轻胆汁淤滞
- B: 降低血清丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 水平
- C: 作为细胞膜的重要组分，特异性地与肝细胞膜结合，促进肝细胞膜再生，协调磷脂和细胞膜功能，降低脂肪浸润，增强细胞膜的防御能力，起到稳定、保护、修复细胞膜的作用
- D: 通过各种机制发挥抗炎作用，有类似激素的作用

**答案：C**

63. 治疗急慢性肾衰竭的首选药物是

- A: 氨苯蝶啶
- B: 呋塞米
- C: 氯噻酮类
- D: 氢氯噻嗪

**答案：B**

64. 患者，女，55 岁，临床诊断为 2 型糖尿病。目前药物治疗方案如下：

- A: 定期监测血清维生素 B12 水平
- B: 服药通常需 3-4 周的治疗才达降糖疗效
- C: 服药期间不要饮酒，以免引起低血糖
- D: 可能出现的不良反应有腹痛，腹泻，腹胀

**答案：B**

65. 可升高红细胞，用于肾性或非肾性贫血的药品是

- A: 人血白蛋白
- B: 硫酸亚铁
- C: 维生素 B12
- D: 重组人促红素

**答案：D**

66. 长期和较大剂量服用质子泵抑制剂后的潜在风险是

- A: 血小板减少症
- B: 动脉粥样硬化
- C: 应激性大出血
- D: 骨质疏松性骨折

**答案：D**

67. 可用于大面积烧伤、创伤、高分解代谢、蛋白丢失负氮平衡者()

- A: 精氨酸
- B: 复方氨基酸注射液(18AA)
- C: 赖氨酸
- D: 复方氨基酸注射液(3AA)

**答案：B**

68. (2015 年真题) 长期使用可使血钾水平升高的药品是 ( )。

- A: 乙酰唑胺
- B: 呋塞米
- C: 氨苯蝶啶
- D: 呋达帕胺

**答案：C**

69. 治疗银屑病药主要作用不包括

- A: 促进细胞有丝分裂
- B: 作用于皮肤表皮细胞
- C: 恢复其正常分化状态
- D: 改善表皮细胞增殖速率

**答案：A**

70. 中致吐性化疗药物所引起的恶心、呕吐,宜选用的止吐治疗方案是 ( )

- A: 化疗前使用昂丹司琼,化疗后不需要继续使用止吐药
- B: 化疗前联合使用昂丹司琼和地塞米松,化疗结束后给予 2 天的地塞米松或昂丹司琼
- C: 化疗前后联合使用地塞米松和甲氧氯普胺

D: 化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦,化疗结束后给予 2 天的阿瑞吡坦和 2~3 天的地塞米松

**答案: B**

71. 抑制磷酸二酯酶而加强心肌收缩力的药物是

A: 西地兰

B: 螺内酯

C: 地高辛

D: 米力农

**答案: D**

72. 茶碱属于

A: 白三烯调节剂

B:  $\beta$  肾上腺素受体激动剂

C: 黄嘌呤类药物

D: M 胆碱受体阻断剂

**答案: C**

73. 关于利伐沙班注意事项的描述, 不正确的是

A: 如伤口已止血, 首次用药应于术后立即给药

B: 对于不同的手术, 选择疗程不同

C: 用药期间需定期测定血红蛋白

D: 用药过量可导致出血并发症

**答案: A**

74. 抗酸作用较强, 有收敛、止血和引起便秘作用

A: 碳酸钙

B: 氢氧化镁

C: 氢氧化铝

D: 三硅酸镁

**答案: C**

75. 广谱肠道驱虫药，用于治疗钩虫（尤其是美洲钩虫）、蛔虫感染的药物是

A: 吡喹酮

B: 三苯双脒

C: 甲硝唑

D: 乙胺嘧啶

**答案: B**

76. 主要抑制凝血 IIa 和 Xa 因子的抗凝血药是()。

A: 磺达肝葵钠

B: 水蛭素

C: 依诺肝素

D: 阿哌沙班

**答案: B**

77. (2019 年真题) 患者，女，32 岁，孕 2 周，既往有癫痫病史，长期服用卡马西平治疗，为防止引起新生儿出血，该患者妊娠晚期应当补充的维生素是 ( )

A: 维生素 K

B: 叶酸

C: 维生素 B12

D: 维生素 D

**答案: A**

78. 阻碍体内睾酮转化为二氢睾酮及抑制白三烯、前列腺素合成，用来治疗良性前列腺增生症（BPH）的植物药是

- A: 普适泰
- B: 度他雄胺
- C: 依立雄胺
- D: 非那雄胺

**答案：A**

79. 可用于治疗青光眼的是

- A: 新斯的明
- B: 毛果芸香碱
- C: 哌替啶
- D: 阿托品

**答案：B**

80. 被还原后参与嘌呤和嘧啶形成的是()

- A: 链激酶
- B: 叶酸
- C: 重组人促红素
- D: 尿激酶

**答案：B**

81. 治疗立克次体感染选用

- A: 庆大霉素
- B: 多西环素
- C: 磺胺嘧啶
- D: 红霉素

**答案：B**

82. 可使尿酸浓度升高，引起关节痛的药物是

- A: 吡嗪酰胺
- B: 异烟肼
- C: 乙胺丁醇
- D: 红霉素

**答案：A**

83. 伊曲康唑属于

- A: 抗生素类
- B: 吗啉类
- C: 唑类
- D: 丙烯胺类

**答案：C**

84. 属于肝药酶诱导剂，与华法林合用会减弱后者抗凝作用的药物是

- A: 丙戊酸钠
- B: 唑吡坦
- C: 氯苯那敏
- D: 苯妥英钠

**答案：D**

85. (2019 年真题) 育龄女性在无防护的性生活或避孕失败 72 小时内，宜使用的口服紧急避孕药是 ( )

- A: 十一酸睾酮 (40mg)
- B: 左炔诺孕酮 (1
- C: 复方醋酸环内孕酮 (35  $\mu$ g/2mg)

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

D: 炔雌醇去氧孕烯 (30  $\mu$ g/150  $\mu$ g)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/568116054045007022>