

军队文职人员招聘护理学(试卷编号1172)

说明：答案和解析在试卷最后

1. [单选题]患者，女性，61岁，1年来常于餐后、睡觉前出现胸骨后烧灼样疼痛，口服奥美拉唑有效。最可能的诊断是( )。

- A) 心绞痛
- B) 胸膜炎
- C) 胃食管反流
- D) 胸骨骨折

2. [单选题]变形杆菌感染，首选：

- A) 青霉素
- B) 庆大霉素
- C) 万古霉素
- D) 甲硝唑

3. [单选题]A. 颅底骨折

- A) 内分泌疾患
- B) 两者均是
- C) 两者均否
- D) 鼻腔感染的主要原因是( )

4. [单选题]化脓性腱鞘炎切开引流时，切口应：

- A) 纵行切开手指侧面
- B) 沿指掌面中线切开
- C) 指掌面中线旁开约0.2cm
- D) 纵行切开中、近两指节侧面

5. [单选题]A. 化脓性细菌

- A) 螺旋体
- B) 两者均是
- C) 两者均否
- D) 鹅口疮的病原体是( )

6. [单选题]胃溃疡的临床手术标准不包括

- A) 复合溃疡
- B) 经4-6周正规内科治疗无效的溃疡
- C) 不能除外恶变的溃疡

- D) 有穿孔病史者
- E) 年龄超过45岁的溃疡病人

7. [单选题] 某患者多食、多饮、多尿，血糖浓度为200mg/dl，尿糖(+)。其尿量增加主要原因是()

- A) 肾小球滤过率增加
- B) 肾小管中溶质浓度增加
- C) 肾小管分泌增加
- D) 血浆晶体渗透压升高
- E) 醛固酮分泌增加

8. [单选题] 原发性免疫缺陷病的突出临床表现为：

- A) 反复感染
- B) 神经系统合并症
- C) 消瘦
- D) 贫血
- E) 肝脾大

9. [单选题] 患者男，50岁。确诊为慢性肾衰竭，出现酸中毒后给予5%碳酸氢钠100ml静脉滴注，护士发现患者突然手足搐搦，此时首要的抢救措施是

- A) 肌内注射苯妥英钠
- B) 肌内注射地西洋
- C) 稳定情绪
- D) 静脉注射10%葡萄糖酸钙
- E) 口服碳酸钙

10. [单选题] 提示急性腹膜炎病人病情恶化的重要指标是

- A) 腹胀加重
- B) 肠鸣音减弱
- C) 严重板状腹
- D) 腹部压痛明显
- E) 出现腹膜刺激征

11. [单选题] 食管癌根治术后应

- A) 避免排痰
- B) 鼓励排痰
- C) 鼓励咳嗽
- D) 鼓励咳嗽、排痰
- E) 避免咳嗽

12. [单选题] 肾性水肿首先出现的部位是 ( )

- A) 上肢
- B) 下肢

- C) 腹腔
- D) 眼睑
- E) 头面部

13. [单选题] 患者女，30岁。近日晨起呕吐，月经停止，疑为妊娠前期，为确诊需采集尿标本，留取标本时间宜为

- A) 饭前
- B) 饭后2小时
- C) 即刻
- D) 睡前
- E) 晨起

14. [单选题] 有关医德监督的方式，下列哪项是错误的（ ）

- A) 法律监督
- B) 舆论监督
- C) 群众监督
- D) 领导监督
- E) 自我监督

15. [单选题] 支气管哮喘典型的临床症状是

- A) 胸闷
- B) 胸痛
- C) 咯血
- D) 干咳
- E) 反复发作性伴有哮鸣音的呼气性呼吸困难

16. [单选题] 患儿，2岁。腹泻入院，给其测体温及记录，下述正确的是

- A) 口腔测量法：5分钟，用蓝 ？
- B) 直肠测量法：5分钟，用蓝 。
- C) 直肠测量法：3分钟，用蓝 ？
- D) 腋下测量法：5分钟，用蓝 。
- E) 腋下测量法：10分钟，用蓝 ×

17. [单选题] 患者，男，54岁，因肺结核并发咯血入院，给予垂体后叶素静脉注射，护士需观察该药物的不良反应，但不包括

- A) 血压升高
- B) 心悸
- C) 便意
- D) 恶心
- E) 面色潮红

18. [单选题] 女性，44岁，急性重症胆管炎，急诊入院，体温39.4℃，血压

90 / 50mmHg (12. 0 / 6. 7kPa)，脉搏100次 / min，右E腹压痛，反跳痛，肌紧张，意识不清，不能诉说其他不适当前有效的处理办法是

- A) 抢救休克
- B) 手术
- C) 禁忌手术
- D) 抢救休克与手术同时进行
- E) 以上都不对

19. [单选题]二尖瓣重度狭窄时的二尖瓣瓣口面积小于

A) 1cm

2

B) 1. 5cm

2

C) 2cm

2

D) 3cm

2

E) 4cm

2

20. [单选题]女，65岁，退休工人。右膝关节疼痛5年，上下楼梯时加重，休息后减轻。体格检查：一般情况好，右膝内翻畸形，股四头肌萎缩，皮温不高。膝关节周围压痛，浮髌实验(+)。有关该患者的保守治疗，下列说法错误的是：

- A) 尽量减少膝关节负重
- B) 加强股四头肌锻炼
- C) 服用非甾体类抗炎药
- D) 足量联合应用抗生素
- E) 必要时可采用细致支具

21. [单选题]患者，女性，34岁，甲状腺功能亢进症2年，择期手术入院。查体：血压150/90mmHg (20. 0/12. 0kPa)，脉搏100次/分。计算其基础代谢率是

A) +9%

B) +29%

C) +49%

D) +69%

E) +89%

22. [单选题]A. 从开始加压至减压完毕的时间

A) 从稳压结束至减压完毕时间

B) 从稳压开始至减压开始的时间

- C) 从开始加压至开始稳压的时间
- D) 从开始加压至减压的时间
- E) 加压时间为 ( )

23. [单选题]A. 剖胸探查

- A) 穿刺排气减压
- B) 加压包扎固定
- C) 牵引固定
- D) 迅速封闭胸壁伤口
- E) 开放性气胸的紧急处理

24. [单选题]遇高温或撞击有爆炸性的药物是()。

- A) 硝苯地平
- B) 硝酸异山梨酯
- C) 盐酸普萘洛尔
- D) 氯贝丁酯
- E) 卡托普利

25. [单选题]丁先生，35岁。右手臂严重损伤，急诊入院。医嘱为破伤风抗毒素注射，护士注射前询问患者是否用过破伤风抗毒素。患者曾用过破伤风抗毒素，超过多少天，需重做过敏试验。

- A) 3天
- B) 5天
- C) 7天
- D) 10天
- E) 12天

26. [单选题]网球肘时可出现：

- A) Mills征阳性
- B) Finkelstein征阳性
- C) Dugas征阳性
- D) Spurling征阳性
- E) Hoffmann征阳性

27. [单选题]A. 慢性支气管炎

- A) 支气管哮喘
- B) 肺结核
- C) 支气管扩张
- D) 肺癌
- E) 锁骨上下部位咳嗽后闻及湿啰音可见于

28. [单选题]患者，男性，48岁，因吞咽食物易哽噎，胸骨后有异物感和烧灼样痛2个月，经纤维食管镜检查证实为食管癌，准备入院手术治疗。既往吸烟15年。病人术后最常见和最严重的并发症是

- A) 深静脉血栓形成
- B) 肺不张
- C) 吻合口瘘
- D) 切口渗血
- E) 反流性食管炎

29. [单选题]关于肌肉等长练习的描述，下列哪项是正确的

- A) 等长练习又称动力练习
- B) 对抗一定的负荷作关节的活动锻炼
- C) 优点是有益于改善肌肉的神经控制
- D) 固定膝关节的股四头肌锻炼属于等长练习
- E) 可遵循大负荷、少重复次数的原则进行

30. [单选题]溃疡病穿孔非手术治疗期间哪项护理措施最重要

- A) 半卧位
- B) 应输液
- C) 胃肠减压
- D) 应用抗生素
- E) 做术前准备

31. [单选题]A. 肢体抽搐

- A) 示治疗有效
- B) 病理反射
- C) 大小便失禁
- D) 意识障碍
- E) 与癫痫大发作无关的是( )

32. [单选题]对沟通形式的认识正确的是

- A) 沟通的形式有语言性沟通和书面沟通两种形式
- B) 沟通的形式有语言性沟通和非语言性沟通两种形式
- C) 沟通的形式有口头沟通和非语言性沟通两种形式
- D) 沟通的形式有书面沟通和非语言性沟通两种形式
- E) 沟通的形式有口头沟通和书面沟通两种形式

33. [单选题]上面所列出的是一位创伤病人的有关诊断，请安排救治顺序：其次应处理

- A) 股骨折断端外露
- B) 休克
- C) 口腔鼻腔大量血凝块分泌物
- D) 鼻骨骨折
- E) 胸壁吸吮伤口

34. [单选题]吴先生，40岁。上腹部疼痛间歇发作6个月，多出现在夜间，进食后可缓解，诊断为十

十二指肠溃疡。其好发部位是十二指肠的

- A) 水平部
- B) 升部
- C) 球部
- D) 降部
- E) 末端

35. [单选题] 女，24岁，发热、咽痛7天。双下肢浮肿2天，血清补体下降，尿蛋白(+)，尿红细胞(++)，临床诊断急性肾炎。则下列哪种说法不正确：

- A) 下降的补体将于8周内恢复
- B) ASO阳性的可能性大
- C) 应以休息和对症治疗为主
- D) 应予泼尼松口服
- E) 可给予青霉素注射

36. [单选题] 女，24岁，发现尿蛋白3年，曾经有双膝关节、双腕关节等大关节疼痛，目前为了进一步明确诊断，最需要做哪一项检查？

- A) 肾功能检查
- B) ASO
- C) RF
- D) ESR
- E) 抗核抗体检查

37. [单选题] 关于大面积严重烧伤早期处理，不正确的是：

- A) 尽量避免长途转运
- B) 可用止痛剂
- C) 最好就近输液抗休克
- D) 大量口服盐水
- E) 必要时做气管切开

38. [单选题] 引起新生儿破伤风的细菌侵入部位是()

- A) 口腔黏膜
- B) 脐部
- C) 破溃的臀部皮肤伤口
- D) 呼吸道
- E) 尿道口

39. [单选题] 对一位正在鼻出血的病人首先采用的治疗方法是()

- A) 补液
- B) 局部止血
- C) 找出出血原因
- D) 输血

E) 全身用止血药

40. [单选题]病人因患有乳腺癌感到悲伤，护士安慰病人时所采取合适距离为

- A) 个人距离
- B) 亲密距离
- C) 社会距离
- D) 公众距离
- E) 社交距离

41. [单选题]脊柱手术的体位是

- A) 仰卧位
- B) 截石位
- C) 俯卧位
- D) 侧卧位
- E) 膝胸位

42. [单选题]一个蛛网膜下腔出血(SAH)女性患者，早期血管造影未找到出血原因，但发现有脑血管痉挛者，进行二次血管造影复查应与第一次造影间隔

- A) 2天
- B) 1周
- C) 2周
- D) 3月
- E) 半年

43. [单选题]最常出现专有体征的骨折类型是：

- A) 裂缝骨折
- B) 嵌插骨折
- C) 压缩骨折
- D) 青枝骨折
- E) 斜型骨折

44. [单选题]治疗失血性休克的关键是：

- A) 应用糖皮质激素
- B) 补充血容量和止血
- C) 纠正酸碱平衡失调
- D) 纠正电解质紊乱
- E) 血管活性药的应用

45. [单选题]患者男，54岁。因外伤致截瘫，护士告知家属应注意预防压疮，尤其是骶尾部更易发生，家属在进行局部皮肤按摩的时候，有一些不正确的做法，请指出

- A) 用手鱼际部分按摩
- B) 用手蘸50%乙醇少许



- C) 鱼际部分紧贴皮肤
- D) 由轻至重，由重至轻按摩
- E) 压力均匀，以皮肤紫红为度

46. [单选题] 母乳的抗感染作用应除外A. 含较高的SIgA，有抗感染和抗过敏作用B. 有少量的Ig

- A) IgM抗体和
- B) T淋巴细胞
- C) 双歧因子可抑制大肠杆菌生长
- D) 乳铁蛋白含量较牛乳高，不易发生缺铁性贫血
- E) 含有溶菌酶、过氧化氢酶、补体等

47. [单选题] 张女士，44岁。肝硬化多年，呕血200ml入院。下列哪项治疗是错误的

- A) 卧床休息，避免呕血时误吸引起窒息
- B) 禁食
- C) 建立有效静脉通道
- D) 快速补充血容量，保持血红蛋白80~90g / L
- E) 输新鲜血

48. [单选题] 食管癌病理分型，哪项是错误的

- A) 缩窄型
- B) 蕈伞型
- C) 梗阻型
- D) 髓质型
- E) 溃疡型

49. [单选题] 支气管哮喘患者经常呼吸困难，哮喘发作时满肺哮鸣音，何故

- A) 声带痉挛
- B) 支气管平滑肌痉挛
- C) 大气管异物
- D) 肺气肿
- E) 大量痰液聚集

50. [单选题] 关于酮症酸中毒的治疗，下列哪项不正确

- A) 迅速、积极补液
- B) 必要时可补钾
- C) 可用小剂量胰岛素治疗
- D) 积极补碱
- E) 抗炎治疗

51. [单选题] 女性，28岁，怀孕2个月，有怕热、心悸、多食、善饥。为确认该患者有无甲亢，下列试验中以何者为首选：

- A) TT3、TT4测定

- B) 甲状腺摄<sup>131</sup>I 率
- C) T<sub>3</sub>抑制试验
- D) TRH兴奋试验
- E) FT<sub>3</sub>、FT<sub>4</sub>、测定

52. [单选题]老年患者外伤致右Colles骨折。骨折对位对线良好，并有嵌插，该患者应选择哪项治疗：

- A) 牵引治疗
- B) 对症治疗
- C) 手术治疗
- D) 消肿治疗
- E) 夹板固定或石膏固定

53. [单选题]7岁患儿，跌倒后左手掌着地，感左肘部及前臂疼痛6小时。查体：左肘部肿胀明显，半曲位，肘部向后突出，肘后三角关系正常，桡动脉摸不到，末梢感觉减退，手指发凉，被动屈伸手指疼痛明显造成此并发症的原因不包括：

- A) 肱动脉受压
- B) 肱动脉被刺破
- C) 损伤后的局部反应
- D) 局部肿胀
- E) 淋巴回流受阻

54. [单选题]在扩张性心肌病诊断时，胸部X线和超声心动图检查哪项是错误的

- A) 两者都能显示心脏的大小
- B) X线不能显示心室运动减弱
- C) 超声能显示左室流出道增宽？
- D) X线可显示肺淤血
- E) 超声心动图可显示二尖瓣的情况

55. [单选题]不宜行保留灌肠的患者是

- A) 肠炎患者
- B) 长期失眠患者
- C) 慢性痢疾患者
- D) 直肠手术后患者
- E) 阿米巴痢疾患者

56. [单选题]尿频、尿急、尿痛常见于

- A) 情绪紧张
- B) 肾小球肾炎
- C) 妊娠压迫
- D) 尿道炎
- E) 膀胱造瘘

57. [单选题]患者男性，胫腓骨骨折，复位后石膏固定，肢体肿胀较明显，治疗中患者未能积极功能锻炼，2个月后去除石膏复查，见骨折已愈，经1个月关节活动练习，膝关节活动度仍很差，此现象称

- A) 损伤性骨折
- B) 创伤性关节炎
- C) 关节僵硬
- D) 缺血性骨坏死
- E) 缺血性肌挛缩

58. [单选题]肝Glisson纤维鞘内的管道有

- A) 门静脉、肝静脉、肝胆管
- B) 肝动脉、门静脉胆总管
- C) 肝动脉肝静脉门静脉
- D) 肝动脉肝胆管门静脉
- E) 肝动脉肝胆管肝静脉

59. [单选题]组织设计应遵循的原则是

- A) 双头指挥
- B) 多头指挥
- C) 越级指挥
- D) 统一指挥
- E) 交叉指挥

60. [单选题]下列哪些不是SLE分类标准中的抗体?

- A) 抗dsDNA抗体阳性
- B) 抗Sm抗体阳性
- C) 梅毒血清试验假阳性
- D) 抗核抗体
- E) 抗SSA抗体

61. [单选题]患者女性，入监护室当晚突然意识丧失，脉搏摸不到，心电监护仪示形状和振幅不同的不规则波动曲线，分不清QRS与T波。应考虑为

- A) 室性心动过速
- B) 房性期前收缩
- C) 交界区期前收缩
- D) 室性期前收缩
- E) 心室颤动

62. [单选题]观察呕吐物下列哪项可不需

- A) 粪便
- B) 是否新鲜

- C) 混有血液
- D) 胆汁
- E) 多少

63. [单选题] 治疗室性心律失常的有效药物

- A) 肾上腺素
- B) 氯化钙
- C) 电除颤
- D) 利多卡
- E) 碳酸氢钠

64. [单选题] A. 4°C

- A) 28~32°C
- B) 35~39°C
- C) 39~41°C
- D) 41~45°C
- E) 为高热患者降温，行大量不保留灌肠时，灌肠液温度为

65. [单选题] 高动力循环状态常见于

- A) 原发性高血压
- B) 慢性贫血
- C) 肺动脉高压
- D) 主动脉瓣关闭不全
- E) 肺动脉瓣关闭不全

66. [单选题] 血清甲胎蛋白 (AFP) 升高的是

- A) 肾癌
- B) 膀胱癌
- C) 睾丸肿瘤
- D) 前列腺癌
- E) 前列腺增生

67. [单选题] 为预防肺结核的发生和流行，在下列措施中最为关键的一环是

- A) 自出生后开始定期接种卡介苗
- B) 隔离排菌的结核患者
- C) 合理化疗，治愈排菌患者
- D) 加强营养、锻炼身体、增强抵抗力
- E) 为易感者及与排菌患者密切接触的人预防性用药

68. [单选题] 下列哪项是一氧化碳中毒最易受损的器官

- A) 脑和心脏
- B) 肝脏

- C) 肾脏
- D) 皮肤
- E) 眼睛

69. [单选题] A. 普通洗手

- A) 卫生手消毒
- B) 可不洗手
- C) 外科手消毒
- D) 可仅使用消毒液涂擦
- E) 与患者沟通，询问病史后

70. [单选题] 星状神经节阻滞的标志是 A、霍纳氏征

- A) 眼睑下垂
- B) B
- C) 11征
- D) 声嘶
- E) 瞳孔扩大

71. [单选题] 肥厚型梗阻性心肌病

- A) 心尖区舒张中晚期隆隆样杂音
- B) 心尖区全收缩期吹风样杂音
- C) 胸骨左缘3肋间舒张早期哈气样杂音
- D) 胸骨右缘2肋间3级以上喷射性收缩期杂音
- E) 胸骨左缘功能性收缩期杂音

72. [单选题] 体内哪种物质是不直接传递信息的 ( )

- A) 神经递质
- B) 调制物
- C) 内分泌激素
- D) 旁分泌物质
- E) 局部体液因素

73. [单选题] 成人引起肾性高血压最常见的疾病是 ( )

- A) 急性肾小球肾炎
- B) 肾动脉硬化
- C) 肾动脉缩窄
- D) 慢性肾炎
- E) 慢性肾盂肾炎

74. [单选题] 下列哪项是输入两袋血液之间应输入的溶液

- A) 5%葡萄糖溶液
- B) 10%葡萄糖溶液

- C) 0.9%氯化钠溶液
- D) 复方氯化钠溶液
- E) 碳酸氢钠溶液

75. [单选题]生育期妇女，月经不调，经期延长，淋漓不尽，BBT呈双相，为确定诊断，何时诊刮恰当：

- A) 月经前1周
- B) 月经来潮12小时内
- C) 月经来潮第5天
- D) 月经干净后3-7天
- E) 随时均可诊刮

76. [单选题]下列关于肾脏生理功能的描述不妥的是

- A) 肾小球具有滤过作用
- B) 远曲小管是重吸收的重要场所
- C) 肾小管上皮细胞具有分泌和排泄功能
- D) 浓缩和稀释功能可反映远端肾小管、集合管对水平衡的调节
- E) 肾脏可产生多种激素和生物活性物质

77. [单选题]患者女，40岁。反复发作尿路感染十年余，近一年夜尿增多，此次因尿频、尿急、尿痛就诊，尿检查白细胞8~10个/HP，X线肾盂变形，缩窄，中段尿培养为大肠埃希菌。本例的治疗方案应选用

- A) 单剂治疗
- B) 敏感抗生素治疗2周
- C) 长期抑菌治疗
- D) 系统联合用药，疗程稍长
- E) 抗生素治疗作用

78. [单选题]使瞳孔缩小的原因是（ ）

- A) 有机磷农药中毒
- B) 暗光刺激
- C) 交感神经兴奋
- D) 去氧肾上腺素
- E) 动眼神经麻痹

79. [单选题]PEM并发贫血最常见为

- A) 营养性缺铁性贫血
- B) 营养性巨幼红细胞性贫血（缺乏维生素B12所致）
- C) 营养性巨幼红细胞性贫血（缺乏叶酸所致）
- D) 溶血性贫血
- E) 长期少量失血所致贫血

80. [单选题]手足口病的多发年龄是 ( )

- A) 5岁以下
- B) 2岁以下
- C) 学龄前
- D) 18岁以下
- E) 各种年龄

81. [单选题]患者女，23岁。患慢性粒细胞白血病，在化疗过程中拒绝治疗。护士针对其不合作行为采取的下列哪项措施是错误的

- A) 评估患者的心理状态
- B) 联系同样疾病的患者与其多沟通
- C) 向患者说明药物治疗的效果、副作用及其必要性
- D) 与患者讨论修订治疗措施，指导患者遵从新的治疗方案
- E) 严格执行医嘱，不必患者同意

82. [单选题]男性，41岁，不规则发热3个月，右肋下胀痛，颈肩部见蜘蛛痣，肝肋下4cm，质硬轻触痛，脾肋下一指，血白细胞数 $4.8 \times 10^9/L$ ，中性60%，GPT60U， $\gamma$ -GT为400U，AKP350U（正常35~150），最大可能是

- A) 肝炎后肝硬化
- B) 肝脓肿
- C) 慢性活动性肝炎
- D) 肝硬化并肝细胞癌
- E) 慢性胆囊炎

83. [单选题]下列哪项属于传染病区中的半污染区

- A) 配餐间、医务人员更衣室
- B) 医务人员办公室、护士站
- C) 病人浴室、洗漱间
- D) 值班室、库房
- E) 病室、入院处理室

84. [单选题]高先生，40岁。既往有胆结石病史，今日进餐后突然上腹刀割样疼痛，恶心、呕吐。应给予的饮食护理为

- A) 禁食
- B) 流食
- C) 少量多餐
- D) 低蛋白饮食
- E) 低纤维饮食

85. [单选题]在沟通中，以下做法正确的是

- A) 表达自己对事情的看法
- B) 为使病人高兴讲肤浅的安慰话

- C) 不引用与之无关的事实
- D) 对病人的问题迅速做出结论
- E) 采用说教式的语言

86. [单选题] 抗幽门螺杆菌的根除方案哪项不正确

- A) 质子泵抑制剂+克拉霉素+阿莫西林
- B) 质子泵抑制剂+克拉霉素+甲硝唑
- C) 质子泵抑制剂+阿莫西林+甲硝唑
- D) 胶体铋+阿莫西林+甲硝唑
- E) 胶体铋+质子泵抑制剂+甲硝唑

87. [单选题] 下列哪项是溃疡性结肠炎的护理措施

- A) 生活规律，保持心情舒畅，增大运动量以促进病人胃肠蠕动
- B) 观察肠鸣音，肠鸣音消失，腹痛加剧等，考虑结肠出血，及时报告医生
- C) 应给予高热量，富营养，高纤维素，易消化软食
- D) 告知灌肠病人左侧卧位以延长药物在肠道内停留时间
- E) 指导病人排便后用温水清洗肛周皮肤，必要时给予护肤软膏涂擦

88. [单选题] 吴先生，55岁。因患肺癌晚期，服安眠药中毒，家人发现后将其送入医院抢救。护士对患者洗胃后，可采用下列哪种药物导泻

- A) 硫酸钠
- B) 硫酸锌
- C) 醋酸
- D) 硫酸铜
- E) 过氧化氢

89. [单选题] 患者男，28岁。反复右下腹部疼痛、腹泻3个月，大便成糊状、无黏液及脓血，每日约2~5次。X线钡餐检查发现回盲部有跳跃征。首先考虑该患者的情况是

- A) 溃疡性结肠炎
- B) 结肠癌
- C) 上消化道出血
- D) 肠结核
- E) 急性胃肠炎

90. [单选题] 患者男，10岁。全身水肿，尿少半个月，BP:100/80mmHg，Hb:140g/L。尿蛋白(+++)，24小时定量8.0g，血BUN6mmol/L，血Cr正常，诊断为肾病综合征，基层医院给呋塞米后尿量增加。1周后突发腰痛，尿量明显减少，血BUN升至18mmol/L，尿镜检红细胞满视野。最可能的诊断为

- A) 肾病综合征并泌尿系统感染
- B) 肾病综合征并原发性腹膜炎
- C) 肾病综合征并肾静脉血栓
- D) 肾病综合征并肾前性氮质血症



E) 肾病综合征并Fanconi综合征

91. [单选题]A. 布鲁津斯基征阳性

A) 巴宾斯基征阳性

B) 前囟饱满

C) 嗜睡、昏迷

D) 双侧瞳孔不等大

E) 属于意识障碍的表现是

92. [单选题]急性胆囊炎最严重的并发症是

A) 胆囊坏疽穿孔引起胆汁性腹膜炎

B) 并发急性胰腺炎

C) 胆囊、十二指肠内瘘

D) 胆囊积液

E) 细菌性肝脓肿

93. [单选题]脊髓型颈椎病患者，拟行前路手术，护士在术前协助患者进行的最重要的练习是

A) 床上大小便

B) 上下肢功能锻炼方法

C) 手术体位训练

D) 推移气管

E) 深呼吸、有效咳嗽、排痰

94. [单选题]白血病静脉注药时为何先输生理盐水

A) 可无胃刺激

B) 可不影响食欲

C) 避免药物刺激血管

D) 避免药物渗入组织

E) 可不发生头痛

95. [单选题]布鲁津斯基征(Brudzinski征)阳性提示病人可能有

A) 锥体束受损

B) 脑膜炎

C) 精神分裂症

D) 多发性神经根炎

E) 癫痫大发作

96. [单选题]不符合枕骨大孔疝表现的是

A) 剧烈头痛

B) 反复呕吐

C) 意识改变出现早

D) 没有瞳孔改变

E)呼吸骤停发生早

97. [单选题]孙先生，42岁。车祸后大出血急诊入院。此时患者应选用何种溶液维持血压

- A) 0.9%氯化钠
- B) 低分子右旋糖酐
- C) 11.2%乳酸钠
- D) 5%碳酸氢钠
- E) 10%葡萄糖

98. [单选题]患者女，67岁。肺心病病史20年，此次患肺炎2周来，咳嗽、咳痰，今晨呼吸困难加重，烦躁不安，神志恍惚。查体：体温37.3℃，心率112次/分，呼吸35次/分，节律不整，口唇发绀，两肺底布满湿啰音，血压正常。何种卧位可以减轻患者的呼吸困难

- A) 右侧卧位
- B) 半卧位
- C) 平卧位
- D) 头高足低位
- E) 左侧卧位

99. [单选题]闭合性气胸，肺萎陷不超过百分之几，患者可无自觉症状，不需处理

- A) 10%
- B) 20%
- C) 30%
- D) 40%
- E) 50%

100. [单选题]女性，44岁活动后心悸气喘2年余，查体轻度贫血，心率快，律整，胸骨右缘第2肋间闻及响亮而粗糙的收缩期杂音，3/6级，首先应想到的疾病为

- A) 动脉导管未闭
- B) 主动脉瓣关闭不全
- C) 二尖瓣关闭不全
- D) 室间隔缺损
- E) 主动脉瓣狭窄

101. [单选题]手术室用于双手消毒的0.1%苯扎溴铵溶液，每桶最多可泡手的人次是

- A) 20人次
- B) 35人次
- C) 50人次
- D) 40人次
- E) 55人次

102. [单选题]肛门检查了解临产后胎头下降程度时，用作骨性标记的是：

- A) 骶岬

- B) 坐骨棘
- C) 坐骨结节
- D) 耻骨联合后面
- E) 骶窝

103. [单选题] 32岁男性患者，突发寒战、高热、咳嗽、右下胸痛1天余，随后体温迅速下降，出现恶心、呕吐、意识模糊。体检见病人脸色苍白，口唇发绀，右下肺叩诊音稍浊，听到少量湿啰音，血压10.7 / 6.7kPa。除按医嘱正确使用抗菌药物外，首要的护理措施为

- A) 注意观察生命体征、神志、瞳孔、尿量等变化
- B) 给予止咳祛痰药物
- C) 预防肺水肿、尿路感染、褥疮等并发症的发生
- D) 鼻饲高热量富含维生素的流质饮食
- E) 按休克原则处理好体位、保暖、吸氧、静脉输液等问题

104. [单选题] 女性，23岁。因月经过多反复鼻衄1年入院。体查发现全身皮肤有散在瘀点瘀斑，肝脾未见肿大。血常规：WBC  $6.5 \times 10^9 / L$ , Hb 68g / L, RBC  $3.1 \times 10^{12} / L$ , PLT  $32 \times 10^9 / L$ ；KPTT、PT正常，束臂试验阳性；Coomb's (一)。该患者最适合的诊断是：

- A) 特发性血小板减少性紫癜并缺铁性贫血
- B) 血友病
- C) Evans综合征
- D) 单纯性紫癜
- E) 过敏性紫癜

105. [单选题] 下列哪项是体外循环后最常见的电解质失衡

- A) 高钾
- B) 低钾
- C) 高钠
- D) 低钠
- E) 低氯

106. [单选题] 与慢性胃炎的发病关系最密切的细菌是

- A) 沙门菌
- B) 大肠杆菌
- C)  $\alpha$ 链球菌
- D) 幽门螺杆菌
- E) 嗜血杆菌

107. [单选题] 妊娠期对孕妇的健康指导错误的是()

- A) 正常胎动数约3次 / 小时~5次 / 小时
- B) 28周末官底高度26cm左右
- C) 妊娠试验主要检测孕妇血清中的孕激素
- D) 产前系列检查应从妊娠20周开始

E) 腹部四部触诊、骨盆外测量是产科检查的部分内容

108. [单选题] 一般认为，颈脊髓损伤的患者不应做气管切开的是：

- A) 上颈椎损伤
- B) 下颈椎损伤
- C) 呼吸衰竭
- D) 呼吸道感染，痰液粘稠
- E) 伴有窒息

109. [单选题] 水肿患者如出现腹大如鼓，呼吸困难，不能平卧，二便不利，此时宜( )

- A) 塞因塞用
- B) 标本同治
- C) 通因通用
- D) 急则治标
- E) 缓则治本

110. [单选题] 做胆管造影检查的患者，应采取的体位是

- A) 胸膝卧位
- B) 去枕仰卧位
- C) 头低足高位
- D) 截石位
- E) 俯卧位

111. [单选题] 女性，42岁，主因“活动后气短半年，加重1个月”进院。查体：双肺部可闻及细小湿性啰音，胸部X线可见肺内多发浸润影，胸膜下小叶间隔增厚为明确诊断，需做的最佳检查为

- A) 支气管肺泡灌洗
- B) 经支气管肺活检
- C) 开胸肺活检
- D) 检查血中免疫指标有无异常
- E) 薄层CT检查

112. [单选题] 女性，35岁，黄疸伴关节酸痛3个月，体检巩膜黄染，脾大肋下2厘米，血红蛋白58g/L，白细胞 $5 \times 10^9/L$ ，血小板 $110 \times 10^9/L$ ，网织红细胞计数0.25，外周血涂片成熟红细胞形态正常，尿隐血试验阴性，无家族史。最可能的诊断是

- A) 急性白血病
- B) 急性黄疸型肝炎
- C) 肝癌骨髓转移
- D) 溶血性贫血
- E) 风湿性关节炎

113. [单选题] 下列哪项检查是诊断早期肝癌的重要指标

- A) AST
- B) 超声
- C) X线
- D) 肝血管造影
- E) AFP

114. [单选题] 患者女，50岁。因胰腺癌入院，经中心静脉导管接受胃肠外营养支持，下列对导管护理正确的是

- A) 可经中心静脉导管抽血
- B) 每周消毒穿刺部位一次
- C) 可经中心静脉途径应用抗生素
- D) 输液结束后用肝素稀释液封管
- E) 可经中心静脉途径输血

115. [单选题] 男性，34岁，会阴部骑跨伤不能排尿，当时在基层医院行耻骨上膀胱穿刺造瘘3天后出现发热，体温 $38.5^{\circ}$ 来就诊。查体血压110/75mmHg，心率78次/分，会阴部及阴囊肿胀明显，皮肤暗红，局部触痛明显下列的治疗选择哪一项是正确的

- A) 再次试行留置导尿管
- B) 尿道会师术
- C) 抗生素治疗的同时行经会阴尿道修补术
- D) 会阴部切开引流术
- E) 抗生素治疗的密切观察病情变化

116. [单选题] 儿童灌肠时肛管插入的深度为

- A) 1~2.5cm
- B) 3.5~4.5cm
- C) 5~7.5cm
- D) 8~9.5cm
- E) 10.5~11cm

117. [单选题] 下列哪项不是急性心肌梗死的一般护理措施

- A) 急性期卧床休息
- B) 吸氧至少3天
- C) 饮食要限制钠盐
- D) 灌肠解除便秘
- E) 翻身不宜过勤

118. [单选题] 肝癌患者行肝叶切除手术后24小时活动的原则是

- A) 绝对制动
- B) 卧床休息，不鼓励早期活动
- C) 早期活动以利于胃肠功能恢复
- D) 禁止咳嗽

E) 平卧，以利于减轻腹痛

119. [单选题]长期应用皮质激素者需紧急手术，患者应作：

- A) 继续用药至应激期过后
- B) 停用激素
- C) 根据病情决定是否给予
- D) 减量给予
- E) 术前给，术后不需给

120. [单选题]下列哪项是临终患者最早出现的心理反应期

- A) 忧郁期
- B) 愤怒期
- C) 否认期
- D) 接受期
- E) 协议期

121. [单选题]呼吸功能障碍者的术前准备，下列哪项不正确

- A) 术前停止吸烟2周
- B) 对阻塞性肺功能不全者应给予支气管扩张剂
- C) 常发哮喘者，可口服地塞米松
- D) 麻醉前用药可按一般患者要求进行
- E) 有肺部感染者，需积极控制感染

122. [单选题]男性，56岁，入院前2个月无明显诱因出现咳嗽，痰量少；进而出现发热，咳嗽加重，伴胸闷及活动后气促，呼吸困难进行性加剧。无咯血、盗汗，否认既往其他疾病。体检：半卧位，口唇轻度紫绀。双肺底吸气相高调湿啰音，杵状指。血沉73mm/h，BP100/70mmHg。R28~30次/分；血气分析：PaO<sub>2</sub>53mmHg，PaCO<sub>2</sub>32mmHg，pH7.43。正侧位胸片：双肺网状、小结节及小片状阴影，双下肺明显。嗜酸性粒细胞1%，肺功能示限制性通气障碍，DLco占预计值60.4%。关于本病，正确的治疗方针是

- A) 如果激素有效，只需短期治疗即可停用
- B) 如果应用激素，减量后患者症状加剧，可加用硫唑嘌呤
- C) 无需预防治疗过程中出现的继发感染
- D) 激素可导致结核复发，所以应合用三联抗结核化疗
- E) 马上给予机械通气治疗

123. [单选题]患者男，41岁。于饱餐、饮酒后突然出现中上腹持久剧烈疼痛，伴有反复恶心，呕吐出胆汁，查体：上腹壁压痛，腹壁轻度紧张，测血清淀粉酶明显增高，诊断为急性胰腺炎，对该患者首选的处理措施为

- A) 禁食、胃肠减压
- B) 适当补钙、补钾
- C) 外科手术准备
- D) 屈膝侧卧位

E)应用吗啡

124. [单选题]女，30岁，劳力性心悸气促有5年多。体查：心尖区有舒张期震颤，并可听到舒张期隆隆样杂音，S1↑，胸骨左缘有II/IV级收缩期吹风样杂音。EKG示右心室肥大、房颤，超声心动图示左心室内径正常，左心房、右心室内径扩大，二尖瓣口面积0.8cm<sup>2</sup>。该病人的诊断是：

- A) 风湿性二尖瓣狭窄
- B) 风湿性二尖瓣狭窄伴相对性三尖瓣关闭不全
- C) 风湿性二尖瓣狭窄合并主动脉瓣关闭不全
- D) 风湿性二尖瓣狭窄及关闭不全
- E) 风湿性心脏病，二尖瓣关闭不全

125. [单选题]23岁男性患者，平素体健，发现浮肿、血尿、大量蛋白尿1年余，血压165 / 95mmHg。下列哪种检查对该患者的诊断和治疗最有帮助：

- A) 尿蛋白电泳
- B) CT
- C) B超
- D) 肾活检
- E) 1h白细胞计数

126. [单选题]患者男，80岁。平素体健，社区医生为其查体测量血压结果为140/60mmHg，心率59次 / 分，律齐，心尖部偶可闻及第三心音，呼吸18次 / 分。请问该检查结果中哪项的病理意义最大

- A) 呼吸频率加快
- B) 收缩压升高
- C) 出现异常心音
- D) 心率低于正常
- E) 脉压增大

127. [单选题]王女士，64岁。糖尿病15年，常规用药胰岛素6U，餐前30分钟，H， tid。医嘱中“H”的中文译意是

- A) 皮内注射
- B) 皮下注射
- C) 肌肉注射
- D) 舌下含服
- E) 静脉注射

128. [单选题]下列属于家庭内部资源的是

- A) 经济资源
- B) 教育资源
- C) 文化资源
- D) 经济支持
- E) 环境资源

129. [单选题] 支气管扩张行胸透时可见何特征

- A) 厚壁空洞
- B) 肺透明度增加
- C) 云絮样阴影
- D) 球形阴影
- E) 卷发状阴影

130. [单选题] 肝病病人摄入过量蛋白诱发肝性脑病的主要机制是 ( )

- A) 血浆芳香族氨基酸增多
- B) 增加肝脏代谢负担
- C) 肠道产氨增多
- D) 脑组织中假性神经递质增多
- E) 脑组织中  $\gamma$ -氨基丁酸增多

131. [单选题] 男性，20岁，3小时前从6m高处跌下。腰疼，血尿，神清合作。血压10 / 6kPa (75 / 45mmHg)，脉搏120次 / 分，左腰皮擦伤，局部稍隆，触痛阳性，右上腹可触及包块，轻度肌紧张。B超左肾周见3.0cm×3.0cm×2.0cm性暗区，肝、脾被膜完整，腹腔穿刺阴性。最重要的处理应是

- A) 抗生素应用
- B) 止血药应用
- C) 止痛药应用
- D) 输血补液
- E) 立即手术探查

132. [单选题] 体外冲击波碎石的禁忌证应除外

- A) 妊娠
- B) 过于肥胖，影响聚焦
- C) 严重尿路感染
- D) 结石以下有梗阻
- E) 鹿角形结石

133. [单选题] 李先生，69岁。诊断为左肺癌，行左肺上叶切除、纵隔淋巴结清扫术后第7天，出现支气管胸膜瘘。下列哪项处理是正确的

- A) 患者左侧卧位
- B) 禁食水
- C) 无需放置胸腔闭式引流管
- D) 怀疑有支气管胸膜瘘时，应患者口服美兰
- E) 呼吸机辅助通气

134. [单选题] 正常止血取决于以下哪项因素 ( )

- A) 血小板的质和量及血管壁的正常
- B) 血小板的质和量及凝血因子的正常



- C) 机体正常免疫功能
- D) 皮肤的完整性和凝血因素的正常
- E) 血小板的质和量、血管壁及凝血因素的正常

135. [单选题] 骨巨细胞瘤的好发年龄:

- A) 5-9岁
- B) 10-19岁
- C) 20-40岁
- D) 41-60岁
- E) 61-80岁

136. [单选题] 患者女, 34岁。肺炎, 医嘱青霉素治疗。患者在青霉素皮试后1分钟突然出现休克, 护士首先应

- A) 观察生命体征
- B) 应用升压药
- C) 让患者平卧
- D) 通知医生
- E) 给患者吸氧

137. [单选题] 女性, 68岁。因咳嗽咯血1月余就诊。X线检查拟诊右下叶中心性肺癌, 痰病理细胞检查阴性。进一步检查首选

- A) 经皮穿刺肺活检
- B) 磁共振检查
- C) 纤维支气管镜检查
- D) CT扫描
- E) 核素扫描

138. [单选题] 男, 10岁, 右足底被铁锈钉刺伤10天, 突然出现张口困难, 继之出现苦笑面容, 角弓反张, 声响及触碰病人可诱发上述症状, 病人神志清楚, 不发热。该病致病菌属于

- A) 革兰染色阴性大肠杆菌
- B) 革兰染色阴性厌氧拟杆菌
- C) 革兰染色阴性变形杆菌
- D) 革兰染色阳性梭形芽孢杆菌
- E) 革兰染色阳性厌氧芽孢杆菌

139. [单选题] 患者男性, 20岁。有哮喘史, 半小时前突发心悸, 心率180次/分, 律齐, 无杂音, 胸透正常, 心电图为阵发性室上性心动过速, 治疗首选

- A) 普萘洛尔静注
- B) 氨茶碱静注
- C) 维拉帕米静注
- D) 利多卡因静注
- E) 美西律静注

140. [单选题] 颅脑外伤病人刺痛时睁眼，只能发音和屈肢，其GCS昏迷分级计分为（ ）

- A) 10分
- B) 9分
- C) 8分
- D) 7分
- E) 6分

141. [单选题] 患者，男性，43岁，股骨干骨折。患者烦躁不安，脉快，收缩压正常、脉压差减小，面色苍白，考虑是

- A) 疼痛引起
- B) 休克早期
- C) 休克晚期
- D) DIC
- E) 精神紧张引起

142. [单选题] 单纯性肥胖症

- A) 长期摄入不足
- B) 遗传因素参与
- C) 患甲状腺功能低下病
- D) 长期食用精加工谷类
- E) 甲状旁腺参与

143. [单选题] 应在治疗性沟通的准备与计划阶段进行的工作是

- A) 介绍自己
- B) 向病人说明交谈的目的
- C) 帮助病人采取舒适卧位
- D) 列出提纲
- E) 向病人说明交谈所需的时间

144. [单选题] 患者女性，45岁。准备手术患者，因心脏病发作，出现心力衰竭而入外科ICU，以下不必要的处理是

- A) 连续测血压
- B) 脉搏描记仪监测
- C) 心电示波监测
- D) 中心静脉压监测
- E) 肢体活动功能监测

145. [单选题] 男性，30岁，主诉乏力3个月，伴左上腹饱胀感。体检：浅表淋巴结未触及，肝未触及，脾大肋下5厘米。血红蛋白90g/L，白细胞 $170 \times 10^9/L$ ，血小板 $300 \times 10^9/L$ ，原粒细胞0.01，晚幼粒0.4，杆状核0.34，分叶核0.1，嗜碱细胞0.02，NAP（阴）。如需明确诊断，应先做的检查是

- A) 肝脾B超

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/568135113017007001>