北京住院医师儿内科Ⅰ阶段：儿童保健

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：下列哪一项是错误的（　）A.平均出生体重 3kg

B.出生时平均身长 50cm

C.出生时平均头围 40cm

D.出生时胸围 32cm

E.出生时前囟约 1.5～2cm

2、单项选择题：1 岁患儿，重度营养不良，突然发生棉色灰白，神志不清，脉搏减慢，呼吸暂停等。应先考虑（　）A.心力衰竭

B.低血钠症

C.低血糖症

D.低血钙症

E.继发感染

3、单项选择题：矮身材伴四肢短小，面容特殊且智力低下者是（　）A.先天性甲状腺功能减低症

B.严重的营养不良

C.软骨发育不良

D.苯丙酮尿症

E.佝偻病

4、单项选择题：哪项是维生素 D 缺乏性手足搐搦症的表现（　）A.惊厥

B.昏迷

C.手足徐动

D.前囟张力增高

E.肌阵挛

5、单项选择题：乳牙出齐的最晚年龄是（　）A.1 岁

B.1.5 岁

C.2 岁

D.2.5 岁

E.3 岁

6、单项选择题：营养不良的最初症状是（　）A.智力发育呆滞

B.肌肉张力低下

C.运动功能发育迟缓

D.身长低于正常

E.体重不增或下降

7、单项选择题：不属于脂溶性维生素的是（　）A.维生素 A

B.维生素 B

C.维生素 D

D.维生素 E

E.维生素 K

8、单项选择题：儿童保健，应从何时做起（　）A.父母婚前做起

B.妊娠期做起

C.围生期做起

D.新生儿期做起

E.婴儿期做起

9、单项选择题：维生素 D 治疗佝偻病的剂量应为（　）A.依病情不同而剂量不同

B.不同病情，剂量相同

C.先用小剂量逐渐加大剂量

D.剂量越大越好

E.剂量越小越安全

10、单项选择题：病儿，男，7 个月。牛乳喂养，突起惊厥 3～5 次，每次发作约半分钟，确诊为婴儿手足搐搦症。病儿在急诊室中又出现全身性抽搐。合理的急救处理是（　）。A.20％甘露醇静脉推人

B.50％葡萄糖静脉推入

C.10％葡萄糖酸钙 5～10ml 稀释后静脉缓注

D.维生素 D30 万 U 静脉注射

E.苯巴比妥钠肌内注射或水合氯醛灌肠

11、单项选择题：1 岁婴儿，2 个月前多汗、惊厥，出牙 3 颗就诊。查体前囟 2cm×2cm，方颅，有肋骨串珠，血钙 2mmol／L（8mg/dl），钙磷乘积 28，注射维生素 D330 万 IU，口服钙剂治疗 1 个月后睡眠安静，出汗减少，出牙 5 颗。继续采用何种治疗方案最合理（　）A.继续使用钙剂

B.继续使用钙剂，每日给维生素 D4001U 口服

C.继续使用钙剂，2 个月后再给 1 次维生素 D3 肌注

D.继续使用钙剂，2 个月后再给每日维生素 D4001U 口服

E.停用维生素 D 及钙剂

12、单项选择题：7 个月女婴，因咳嗽 3～4 天入院，以完往曾多次患”肺炎、肠炎”，查体：体重 5.2kg，身长 62cm，心（-），肺有干啰音，肌肉松弛。不可能出现那种情况（　）A.皮下脂肪 0.3cm

B.皮下脂肪 0.8m

C.结膜毕脱氏板

D.肌张力减低

E.皮肤黏膜苍白

13、单项选择题：营养不良患儿皮下脂肪消失的顺序是（　）A.面颊胸背腹部臀部四肢

B.胸背腹部臀部四肢面颊

C.腹部胸背臀部四肢面颊

D.臀部四肢面颊胸背腹部

E.腹部胸背四肢面颊臀部

14、单项选择题：维生素 D 缺乏性手足抽搐症，下列检查正确的是（　）。A.血钙降低

B.血钠降低

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/575002102023011201