

习 题 五

（一）填空题

1. 造血干细胞可以分化为_____和_____两大系列的干细胞。
2. 血液病常见的症状与体征有_____、_____和_____。
3. 当有出血倾向的血液病病人出现_____和_____时，要警惕其发生颅内出血的可能。
4. 血液病病人出现骨关节疼痛，常见于_____、_____和_____等恶性血液病。
5. 有助于血液病诊断的最基本实验检查项目是_____；具有明确诊断和（或）鉴别诊断意义的实验检查项目是_____。
6. 根据病因可将贫血分为_____、_____和_____三大类。
7. 临床上最常见的贫血是_____。
8. 再障的典型表现主要有_____、_____和_____，一般无_____。根据起病与病情进展情况，可将再障分为_____和一_____。
9. 任何原因若可造成_____、_____和_____，均有可能导致出血性疾病的发生。
10. _____是白血病髓外复发的主要根源。
11. 急性白血病化疗过程分为两个阶段，即_____和_____。
12. 急性白血病达到完全缓解后体内尚有_____白血病细胞。
13. 多数化疗药物抑制骨髓至最低点的时间为_____天，恢复时间为之后的_____天。
14. 鞘内注射化疗药物者宜取去枕平卧位_____h。
15. 用环磷酰胺化疗，应鼓励病人多饮水，保证每天摄入液体总量不少于_____ml。
16. 静滴有心脏毒性的化疗药时，滴速宜小于_____滴/分，并注意观察病人面色和心率，以病人无_____为宜。
17. 慢粒自然病程可分为_____、_____、_____3期。
18. 慢粒病人血细胞中常出现_____染色体。
19. 慢淋就诊多以_____为首发症状。

20. 约 8%慢淋病人可并发_____贫血。

21. 淋巴瘤可发生于身体的任何部位，其中以_____及_____、脾脏、骨髓等部位最易受累。

22. 霍奇金病以肿瘤组织中存在_____为特征。

23. 淋巴瘤病人多以_____性_____性的颈部或锁骨上淋巴结肿大为首发症状。

24. 骨髓瘤病人若活动或扭伤后出现剧烈疼痛，可能为_____，多发生在_____和_____。

（二）名词解释

1. 血液病

2. 贫血

3. 缺铁性贫血

4. 巨幼细胞贫血

5. 再生障碍性贫血

6. 溶血性贫血

7. 出血性疾病

8. 特发性血小板减少性紫癜

9. 过敏性紫癜

10. 血友病

11. 弥散性血管内凝血(DIC)

12. 外周血象

13. 骨髓象

14. 慢性病性贫血

15. 血管内溶血

16. 血管外溶血

17. 造血干细胞

18. 白血病

19. 白血病诱导缓解治疗

20. 慢性粒细胞白血病

21. 白细胞淤滞症

22. 慢性淋巴细胞白血病

23. 淋巴瘤

24. 多发性骨髓瘤

25. POEMS综合征

26. 造血干细胞移植

27. 预处理

(三) 选择题

A型题

- 导致血液病病人发热最主要的原因是()
A. 贫血 B. . 继发感染
C. 肿瘤细胞过度增生 D. . 出血
E. 骨关节痛
- 诊断贫血最为重要的依据是()
A. 皮肤黏膜苍白 B. . 红细胞计数减少
C. 血红蛋白浓度下降 D. . 疲乏无力
E. 红细胞比积下降
- 下列哪项因素与血液病病人的出血无关()
A. 白细胞总数减少 B. . 血小板数目减少
C. 血管壁通透性增加 D. . 凝血因子缺乏
E. 血小板功能异常
- 贫血病人最早和最常见的症状是()
A. 皮肤黏膜苍白 B. . 疲乏无力
C. 活动后心悸气促 D. . 头晕头痛
E. 注意力不集中
- 贫血病人最突出的体征是()
A. 皮肤黏膜苍白 B. . 心率加快
C. 活动后心悸气促 D. . 肝脾肿大
E. 注意力不集中
- 一般贫血的临床表现不包括()
A. 呼吸困难 B. . 全心衰 C. . 食欲下降
D. 低热 E. . 脉压缩小

7. 贫血病人临床表现与下列哪项因素无关()
- A. 血红蛋白的浓度 B. 贫血进展的速度
- C. 是否合并心肺疾病 D. 患病的年龄大小
- E. 白细胞的数量
8. 贫血病人皮肤黏膜苍白最可靠的检查部位是()
- A. 口唇黏膜 B. 面部皮肤
- C. 睑结膜 D. 指甲
- E. 肢端皮肤
9. 关于贫血的定义, 下列哪项是正确的()
- A. 单位容积外周血中红细胞低于正常低限
- B. 单位容积外周血中血细胞比容低于正常低限
- C. 单位容积外周血中红细胞及血红蛋白低于正常低限
- D. 单位容积外周血中红细胞、血红蛋白及血细胞比容低于正常低限
- E. 单位容积外周血中红细胞、血红蛋白及白细胞低于正常低限
10. 临床上最常用于贫血严重程度判断的指标是()
- A. 红细胞计数 B. 皮肤黏膜的苍白程度
- C. 血红蛋白的浓度 D. 白细胞计数
- E. 心率
11. 以贫血的病因为依据, 下列哪项组合是错误的()
- A. 巨幼细胞贫血—造血原料不足
- B. 再障—红细胞生成减少
- C. 慢性病性贫血—红细胞破坏过多
- D. 缺铁性贫血—红细胞慢性丢失过多
- E. 白血病病人的贫血—骨髓被肿瘤细胞所浸润
12. 下列哪项组合是错误的()
- A. 大细胞性贫血—巨幼细胞贫血
- B. 正常细胞性贫血—急性失血性贫血
- C. 小细胞低色素性贫血—缺铁性贫血
- D. 小细胞低色素性贫血—再生障碍性贫血
- E. 正常细胞性贫血—溶血性贫血,

13. 下列哪项指标有助于贫血的鉴别和（或）疗效的观察与评价（ ）

- A. 血红蛋白 B. 红细胞计数
- C. 白细胞计数 D. 网织红细胞
- E. 血小板计数

14. 下列哪项检查最有助于血液病的诊断与鉴别诊断（ ）

- A. 血红蛋白与红细胞计数 B. 白细胞计数及其分类
- C. 血小板计数 D. 网织红细胞
- E. 骨髓检查

15. 贫血治疗的首要原则是（ ）

- A. 及时补充造血物质 B. 反复多次输血
- C. 积极寻找和去除病因 D. 休息与吸氧
- E. 刺激骨髓再生药物的应用

16. 针对发热伴出血的病人的护理，下列哪项是错误的（ ）

- A. 鼓励病人多喝水 B. 适当增加液体的输入量
- C. 必要时遵医嘱药物降温 D. 酒精擦浴
- E. 冰敷

17. 伴有出血倾向的血液病病人出现下列哪项，要高度警惕颅内出血（ ）

- A. 高热 B. 突发头痛 C. 心悸气促
- D. 恶心呕吐 E. 血压下降

18. 贫血最常见的临床类型是（ ）

- A. 巨幼细胞贫血 B. 再障
- C. 缺铁性贫血 D. 溶血性贫血
- E. 急性失血性贫血

19. 下列哪项不是导致成人缺铁性贫血最常见的原因（ ）

- A. 食物中铁的摄入少 B. 痔疮出血
- C. 消化性溃疡出血 D. 女性月经量过多
- E. 钩虫病

20. 人体铁剂吸收的主要部位是（ ）

- A. 胃窦部 B. 胃体部
- C. 十二指肠球部 D. 十二指肠及空肠上部

E. 空肠与回肠

21. 富含易吸收铁剂的食物不包括()

A. 动物内脏 B. . 动物血

C. 黑木耳 D. . 海带

E. 大豆类及其制品

22. 下列哪项最有助于缺铁性贫血的临床判断()

A. 疲乏无力 B. . 心悸气促

C. 皮肤黏膜苍白 D. . 毛发干枯

E. 异食癖

23. 下列哪项实验室检查结果对于缺铁性贫血的诊断最有意义()

A. 红细胞平均体积减少

B. 红细胞平均血红蛋白浓度降低

C. 红细胞计数下降

D. 骨髓幼红细胞增生活跃

E. 血清铁减少

24. 下列哪种食物或饮料有利铁剂的吸收()

A. 咖啡 B. . 茶 C. . 皮蛋

D. 牛奶 E. . 桔子

25. 有效纠正缺铁性贫血和（或）防止病情复发的关键是()

A. 迅速补充铁剂 B. . 有效而彻底的病因治疗

C. 首选口服铁剂 D. . 首选静注铁剂

E. 足够疗程的铁剂治疗.

26. 铁剂治疗有效最早的变化指标是()

A. 血红蛋白浓度升高 B. . 红细胞计数增加

C. 红细胞体积增大 D. . 血清铁水平升高

E. 网织红细胞数增加

27. 关于口服铁剂治疗的护理指导下列哪项是错误的()

A. 从小剂量开始，饭后服用

B. 不宜与牛奶同服

C. 可加服维生素 C

- D. 遵医嘱定期复查血象
- E. 血红蛋白恢复正常后则可停药

28. 关于缺铁性贫血的治疗下列哪项是正确的()

- A. 有胃肠道疾病者可采用注射铁剂疗法
- B. 铁剂治疗有效者最先出现血红蛋白浓度升高
- C. 注射铁剂最常见的不良反应是过敏性休克
- D. 为加速药物的疗效，一般病人应首选注射铁剂治疗后改口服
- E. 注射用铁剂起效迅速，不良反应小

29. 下列实验室检查中哪项最有助于缺铁性贫血的诊断()

- A. 血红蛋白浓度下降 B. 血清铁减少
- C. 总铁结合力增高 D. 血清铁蛋白降低
- E. 红细胞体积减少

30. 慢性再障病人最突出的临床表现是()

- A. 轻~中度贫血 B. 继发感染
- C. 严重出血 D. 肝脾淋巴结肿大
- E. 全血细胞明显减少

31. 关于出血病人的护理，下列哪项是错误的()

- A. 避免皮肤的外伤或挤压
- B. 避免过度疲劳或情绪激动
- C. 尽量减少注射或各种穿刺
- D. 注射部位拔针后局部要延长加压时间
- E. 为了减少皮下出血，不宜经常更换注射部位

32. 急性再障最突出的表现是()

- A. 感染与出血 B. 贫血 C. 出血
- D. 感染 E. 肝脾肿大

33. 雄激素治疗再障的主要机制是()

- A. 提高机体免疫力 B. 改善骨髓微环境
- C. 直接刺激骨髓干细胞增生 D. 减少出血
- E. 提高神经细胞的兴奋性

34. 目前重型再障非移植治疗的一线用药是()

- A. 雄激素 B . 抗胸腺细胞球蛋白
C. 抗淋巴细胞球蛋白 D . 环孢素
E. B+D或 C+D

35. 导致再障最常见的因素是()

- A. 药物及化学物质 B . 肝炎病毒
C. 放射性物质 D . 遗传因素
E. 系统性红斑狼疮

36. 关于再障的发病机制，不包括()

- A. 造血干细胞缺陷 B . 骨髓微循环障碍
C. 骨髓基质被破坏 D . 造血原料不足
E. 自身免疫反应异常

37. 再障的临床表现不包括()

- A. 进行性贫血 B . 肝脾肿大
C. 感染 D. 内脏出血
E. 皮下紫癜及牙龈出血

38. 目前针对造血干细胞缺陷引起的再障，最佳的治疗方法是()

- A. 雄激素治疗 B . 免疫抑制剂的应用
C. 造血干细胞移植 D . 反复多次和少量的成分输血
E. 中医中药治疗

39. 关于溶血性贫血的定义，正确的是()

- A. 红细胞寿命缩短
B. 贫血+黄疸
C. 红细胞破坏增加
D. 骨髓造血功能亢进
E. 红细胞破坏增加超过骨髓代偿能力

40. 慢性溶血性贫血的主要表现是()

- A. 贫血+黄疸 B . 贫血+黄疸+脾大
C. 贫血+酱油样尿 D . 贫血+寒颤高热+酱油样尿
E. 贫血+黄疸+酱油样尿

41. 生理性止血过程中作用最重要的物质是()

- B . 血管
- C. 组织因子 D . 抗凝物质
- E. 维生素 K

42. 正常止血过程参与完成的因素是()

- A.凝血因子及血小板的正常
- B. 血小板、凝血因子及血管壁的正常
- C. 血小板、凝血因子及骨髓的正常
- D. 凝血因子及血管壁的正常
- E. 血管壁及血小板的正常

43. 特发性血小板减少性紫癜(ITP) 的主要发病机制是()

- A.骨髓巨核细胞成熟障碍 B . 骨髓巨核细胞生成减少
- C. 脾脏对血小板的破坏增多 D . 自身免疫反应异常
- E. 雌激素水平过高

44.ITP 与过敏性紫癜最大的区别点在于有()

- A. 皮下出血 B . 胃肠道出血.
- C. 束臂试验阳性 D . 血小板数目减少
- E. 血尿

45. 关于慢性型 ITP 的临床特点错误的是()

- A. 多见于成年女性
- B. 发病前多有病毒感染
- C. 以皮肤紫癜或瘀斑为主
- D. 月经量过多可为女性病人惟一症状
- E. 病情反复而迁徙

46.ITP 治疗的首选措施是()

- A. 定期输注浓缩血小板悬液
- B. 输注大剂量的丙种球蛋白
- C. 应用糖皮质激素
- D. 脾切除
- E. 应用长春新碱

47. 关于过敏性紫癜下列哪项是错误的()

- B.最常见的原因是感染
- C. 主要表现是皮肤黏膜的瘀点或紫癜
- D. 多伴有血小板数目的减少和（或）功能异常
- E. 多见于儿童和青少年

48. 引起过敏性紫癜的主要原因，除外()

- A. 感染因素 B. 食物因素
- C. 药物因素 D. 昆虫叮咬
- E. 外伤因素

49. 过敏性紫癜最常见的临床类型是()

- A. 紫癜型 B. 腹型 C. 关节型
- D. 肾型 E. 混合型

50. 过敏性紫癜治疗的关键在于()

- A. 消除病因 B. 抗组胺类药物的应用
- C. 糖皮质激素的应用 D. 免疫抑制剂的应用
- E. 止血药的应用

51. 下列哪种化疗药能引起出血性膀胱炎()

- A. 柔红霉素 B. 长春新碱
- C. 环胞苷 D. 羟基脲
- E. 环磷酰胺

52. 下列哪种化疗药会引起周围神经炎()

- A. 柔红霉素 B. 长春新碱
- C. 羟基脲 D. 全反式维甲酸
- E. 阿糖胞苷

53. 应用下列哪种化疗药必需做皮试()

- A. 柔红霉素 B. 阿克拉
- C. 左旋门冬酰胺酶 D. 全反式维甲酸
- E. 阿糖胞苷

54. 下列哪种化疗药会引起心脏损害()

- A. 柔红霉素 B. 依托泊苷

D . 全反式维甲酸

E. 甲氨蝶呤

55. 下列哪一型白血病最常引起中枢神经系统白血病()

A. 急性淋巴细胞白血病 B . 慢性淋巴细胞白血病

C. 急性单核细胞白血病 D . 急性粒细胞白血病

E. 慢性粒细胞白血病

56. 下列哪一型白血病最易并发 DIC()

A-慢性粒细胞白血病 B . 急性早幼粒细胞白血病

C. 急性粒单核细胞白血病 D . 急性单核细胞白血病

E. 急性淋巴细胞白血病

57. 下列哪一型白血病最易引起皮肤黏膜浸润()

A. 急性淋巴细胞白血病 B . 急性早幼粒细胞白血病

C. 急性单核细胞白血病 D . 急性红白血病

E. 急性巨核细胞白血病

58. 下列哪种药物可以拮抗甲氨蝶呤()

A. 鱼精蛋白 B . 全反式维甲酸

C. 四氢叶酸钙 D . 亚砷酸

E. 泼尼松

59. 急性早幼粒细胞白血病的首选治疗药物是()

A. 全反式维甲酸 B . 伊马替尼

C. 雄激素 D . 氟达拉滨

E. ATG/ALG

60. 急性与慢性白血病的主要鉴别依据是()

A. 病程长短 B . 贫血程度

C. 有无肝脾淋巴结肿大 D . 血白细胞数剧增程度

E. 骨髓幼稚白细胞的成熟程度

61. 下列哪一型白血病最常引起巨脾()

A. 急性粒细胞白血病 B . 急性淋巴细胞白血病

C. 急性单核细胞白血病 D . 慢性粒细胞白血病

E. 慢性淋巴细胞白血病

()

- A. 全血细胞的减少
- B. 红细胞与血红蛋白量的增加
- C. 原始和早幼粒细胞显著增多
- D. 中性杆状核和晚幼粒细胞显著增多
- E. 骨髓巨核细胞数显著增多

63. 慢淋的首选治疗药物是()

- A. 全反式维甲酸 B. 伊马替尼
- C. 雄激素 D. 氟达拉滨
- E. ATG/ ALG

64. 白血病患者高热时，不宜采取的护理措施是()

- A. 酒精擦浴 B. 温水擦浴
- C. 头颈部放置冰袋 D. 应用解热镇痛剂
- E. 腋下及腹股沟处放置冰袋

65. 急淋的基本化疗方案是()

- A.VDP B. VAP C. VMP
- D. VP E. VOP

66. 慢粒一般不引起下列哪项临床表现()

- A. 肝脾肿大 B. 出血 C. 溶血
- D. 贫血 E. 发热

67. 下列哪一型霍奇金病预后最差()

- A. 淋巴细胞为主型 B. 结节硬化型
- C. 混合细胞型 D. 淋巴细胞削减型
- E. 小淋巴细胞型

68. 里-斯细胞在下列哪一型霍奇金病最多见()

- A. 淋巴细胞为主型 B. 结节硬化型
- C. 混合细胞型 D. 淋巴细胞削减型
- E. 小淋巴细胞型

69. 淋巴瘤病人常以何部位淋巴结肿大为首发症状()

- A. 腹股沟 B. 腋窝 C. 颈部

E. 腹膜后

70. 进展性骨髓瘤病人骨髓中常见下列哪种细胞因子异常升高()

- A. 白细胞介素 1 B. 白细胞介素 2
C. 白细胞介素 3 D. 白细胞介素 5
E. 白细胞介素 6

71. 多发性骨髓瘤最常见的早期症状是()

- A. 骨痛 B. 骨骼变形 C. 病理性骨折
D. 肝脾肿大 E. 淋巴结肿大

72. 多发性骨髓瘤病人最多见的骨痛部位是()

- A. 颈部 B. 胸廓 C. 腰骶部
D. 上肢 E. 下肢

73. 异基因 HSCT术后最严重的并发症是()

- A. 感染 B. 出血
C. GVHD D. 输血后肝炎
E. 肝静脉闭塞病

74. 骨髓涂片需抽取骨髓液()

- A. 0.1 ~0.2ml B. 0.2 ~0.5ml
C. 0.5 ~1ml D. 1 ~2ml
E. 2 ~5ml

75. 行髂后上棘骨髓穿刺，应选择的体位是()

- A. 仰卧位 B. 俯卧位 C. 坐位
D. 中凹位 E. 头低脚高位

76. 一再障病人，血常规结果显示红细胞 $3.0 \times 10^{12}/L$ ，血红蛋白 60g/L，白细胞 $2.8 \times 10^9/L$ ，血小板 $80 \times 10^9/L$ 。目前该病人最大的危险是()

- A. 贫血 B. 继发感染
C. 颅内出血 D. 贫血性心衰
E. 牙龈出血

77. 一 ITP 病人，血常规结果显示红细胞 $3.6 \times 10^{12}/L$ ，血红蛋白 90g/L，白细胞 $6.8 \times 10^9/L$ ，血小板 $15 \times 10^9/L$ 。目前该病人最大的危险是()

- A. 贫血 B. 继发感染

D . 贫血性心衰

E. 牙龈出血

78. 病人，女。因持续高热伴皮下出血 1 周，查血常规结果红细胞 $3.0 \times 10^{12}/L$ ，血红蛋白 $75g/L$ ，白细胞 $3.2 \times 10^9/L$ ，血小板 $15 \times 10^9/L$ ，拟为再障而收住入院。在入院病人评估的过程中，此病人突然诉说头痛，烦躁不安，此时要警惕病人()

A. 急性焦虑发作 B . 癔病发作

C. 颅内出血 D . 并发脑膜脑炎

E. 高热状态下的精神错乱

79. 一天午夜，某 ITP 病人呼叫主诉头痛，为明确病人是否并发颅内出血，作为当班护士，除了观察病人神志的变化外，下列哪项检查最有助于你的临床判断()

A. 血压 B . 脉搏 C . 呼吸

D. 脑膜刺激征 E . 瞳孔

80. 病人，男，60 岁。持续高热伴皮下出血 1 周，咳黄色脓痰。查体温 $39^{\circ}C$ ，呼吸 25 次 / 分，脉搏 100 次 / 分，血压 $100/62mmHg$ 双下肺可闻及局限性湿啰音；全身皮肤散在性紫癜。血常规结果：红细胞 $3.0 \times 10^{12}/L$ ，血红蛋白 $51g/L$ ，白细胞 $3.0 \times 10^9 / L$ ，血小板 $21 \times 10^9 / L$ 。针对该病人的护理，下列哪项措施是错误的()

A. 首选冰敷降温

B. 鼓励病人多喝水

C. 加快补液速度，以利降温及细菌毒素的排泄

D. 协助排痰，必要时可遵医嘱行雾化吸入

E. 禁止使用酒精拭浴

81. -新收住院再障病人，女，32 岁。查四肢皮肤散在性瘀点与瘀斑；右颊部可见一约 $1.5cm \times 0.5cm$ 的口腔溃疡，牙龈渗血，口腔黏膜未见血泡形成；咽无充血，双扁桃体无肿大；双肺未闻干湿性啰音。为有效预防感染，目前该病人首要采取的护理措施是()

A. 保持皮肤的干燥与清洁 B . 加强口腔护理

C. 定期进行会阴冲洗 D . 避免外出到人群聚集的地方

E. 加强营养

82. 病人女，26 岁，疲乏无力伴脸色苍白半年余。查血红蛋白 $72g/L$ ，白细胞及血小板均正常；血清铁减少，骨髓铁阴性，临床诊断为缺铁性贫血。经口服铁剂治疗 3 周后无效，下列哪项不是治疗无效的可能原因()

- A. 胃肠吸收不良 B. . 未遵医嘱合理用药
C. 月经量过多 D. . 诊断错误
E. 存在铁剂利用的干扰因素

83. 病人女，26 岁，疲乏无力伴脸色苍白半年余，临床诊断为缺铁性贫血。经口服铁剂治疗 2 周后无效，其最主要的判断依据是()

- A. 自觉症状无改善 B. . 血红蛋白无升高
C. 红细胞无增加 D. . 网织红细胞无增加
E. 脸色无改善

84. 病人男，18 岁。3 天前无明显诱因出现双下肢伸侧面对称性皮下出血点，少有融合，颜色鲜红，略高出皮肤，无痛无痒；近日还出现腹痛，但无发热及其他自觉不适。拟为“过敏性紫癜”而收入院。为及时发现病情变化，主管护士首先应了解和观察该病人的()

- A. 红细胞、血红蛋白、白细胞及血小板的检查结果及其变化
B. 血小板检查结果及其变化
C. 骨髓检查结果
D. 肢体皮肤出血的情况及其变化
E. 生命体征、腹部症状及体征的变化

85. 病人女，39 岁。因散在性皮肤紫癜半月余而收住入院。查血小板为 $70 \times 10^9/L$ ，你认为下列哪项不是导致该病人血小板减少的可能原因()

- A. 病毒感染 B. . 电离辐射
C. 长期接触油漆或天那水 D. . 月经量过多
E. 因感染而服用了氯霉素

86. 雷先生，53 岁，诊断为急性早幼粒细胞白血病。于维甲酸诱导化疗第 9 天突然出现头痛，喷射状呕吐，视物模糊，烦躁。体检：体温 37.2°C ，脉搏 95 次 / 分，血压 $155/85\text{mmHg}$ 呼吸 18/次 / 分；血象：白细胞 $31 \times 10^9/L$ ，血红蛋白 65g/L ，血小板 $10 \times 10^9 / L$ 。请问此病人最可能发生了何种并发症()

- A. 维 A 酸综合征 B. . 中枢神经系统白血病
C. 颅内出血 D. . 高血压危象
E. 高血压脑病

87. 马先生，32 岁，2 年前诊断为慢性粒细胞白血病。因工作忙，不规则使用羟基脲、干扰素治疗。1 周前出现发热，体温最高达 39.2°C ，伴全身骨骼酸痛。体检：体温 39°C ，贫血外观，胸骨下段明显

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/575300100021011330>