

# 2024年四川成都市第三人民医院招聘笔试参考题库含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、下面各项不属于性格特征的为（ ）。

- A. 意识倾向性
- B. 遗传特征
- C. 理智特征
- D. 情绪特征
- E. 意志特征

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

2、下述组合哪一项正确？（ ）

- A. 急性粒细胞白血病——特异性皮肤损害多见
- B. 急性淋巴细胞白血病——儿童病例绿色瘤常见
- C. M3——多伴DIC
- D. 慢性淋巴细胞白血病——多见急变
- E. 慢性粒细胞白血病——多伴中枢神经系统白血病

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

3、智力发展的关键期在（ ）。

- A. 3岁前
- B. 4岁前
- C. 5岁前
- D. 6岁前
- E. 7岁前

【正确答案】

E

【答案解析】

7岁前小儿脑的发育基本完成，智力发育很快，早期教育智力开发至关重要，可塑性很强。

4、肺通气 / 血流比值反映了肺部气体交换时的匹配情况。通气 / 血流比值增大表明（ ）。

- A. 肺内气体交换正常
- B. 解剖无效腔增大
- C. 解剖性动—静脉短路
- D. 功能性动—静脉短路
- E. 肺泡无效腔增大

【正确答案】

E

## 【答案解析】

每分钟肺泡通气量与肺血流量的比值称为通气/血流比值。正常成年人安静时约为0.84。通气/血流比值增大，意味着通气过剩，血流相对不足，缺少与通气量相应的血流，使部分肺泡气体不能与血液气体进行充分交换，造成肺泡无效腔增大。通气/血流比值减小可能由于肺通气不良，致使部分血液得不到充分的气体交换，出现了功能性动静脉短路。

5、Killip分级，心功能Ⅲ级指下列哪一项？（ ）

- A. 肺部有啰音，且啰音的范围大于1/2肺野（肺水肿）
- B. 肺部可闻及散在的哮鸣音
- C. 未闻及肺部啰音和第三心音
- D. 肺部有啰音，但啰音的范围小于1/2肺野
- E. 血压<70/40mmHg

## 【正确答案】

A

## 【答案解析】

Killip分级常用于评估急性心肌梗死患者的心功能状态，其分级标准为：Ⅰ级：无肺部啰音和第三心音；Ⅱ级：肺部有啰音，但啰音的范围小于1/2肺野；Ⅲ级：肺部啰音的范围大于1/2肺野（肺水肿）；Ⅳ级：心源性休克。

6、先天性心脏病最重要的无创性诊断方法是（ ）。

- A. 心脏三位X线片
- B. 心电图检查
- C. 心导管检查和心血管造影
- D. 超声心动图
- E. 色素稀释曲线

## 【正确答案】

D

## 【答案解析】

超声心动图是一种无创检查技术，不仅可以提供详细的心脏解剖结构信息，而且还能提供心脏功能及部分血流动力学信息；心脏三位X线片可测量心胸比值，观察肺血管阴影，心脏的形态、位置及各房室有无增大，肺动脉、主动脉段变化；心电图检查对心室肥厚、心房扩大、心脏位置有重要参考价值；心导管检查和心血管造影是先天性心脏病进一步明确诊断和决定手术前的一项重要的重要的有创检查方法之一。

7、室间隔缺损伴明显肺动脉高压时可有以下临床表现，但应除外（ ）。

- A. 右心室显著增大
- B. 原有心脏杂音明显增强
- C. P<sub>2</sub>亢进
- D. 肺动脉段明显突出
- E. 右心室压力明显升高

## 【正确答案】

B

## 【答案解析】

暂无解析。

8、新生儿溶血病最常见的是（ ）。

- A. 葡萄糖6-磷酸脱氢酶缺乏症
- B. 球形红细胞增多症
- C. MN血型不合
- D. Rh血型不合
- E. ABO血型不合

## 【正确答案】

E

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/575341321340011112>