

2023-2024 年山西省阳曲县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题 通关秘籍题库带答案（综合卷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2015 年真题）使用前应用原药进行皮试的药物是（ ）。

- A: 阿奇霉素片
- B: 左氧氟沙星片
- C: 阿莫西林胶囊
- D: 注射用头孢曲松钠

答案：D

2. 患者，男，70 岁，2 周前因缺血性脑卒中入院治疗，经积极治疗，病情显著缓解后出院，目前无其他伴随疾病，为进行心脑血管事件的二级预防，应首选的药物是（ ）

- A: 巴曲酶
- B: 利伐沙班
- C: 肝素
- D: 阿司匹林

答案：D

3. 药名词干为“-cillin”的药品是

- A: #NAME?
- B: #NAME?
- C: #NAME?
- D: #NAME?

答案：D

4. 下列药物中服用后可在乳汁中分泌较多的是

- A: 华法林
- B: 青霉素 G
- C: 头孢呋辛
- D: 地西泮

答案：D

5. 目前推荐治疗失眠的一线药物为（）

- A: 艾司唑仑
- B: 多塞平
- C: 佐匹克隆
- D: 硝西泮

答案：C

6. 适用于 L-dopa 治疗伴发疗效减退、症状波动患者的是

- A: 苯海索
- B: 左旋多巴
- C: 恩托卡朋
- D: 司来吉兰

答案：C

7. 患者，女，51 岁，体检时发现血压 160 / 105mmHg，糖耐量试验餐后 2 小时血糖为 9.56mmol / L(正常参考范围 <7.8mmol / L)，甘油三酯 1.52mmol / L(正常参考范围 0.56~1.70mmol / L)，总胆固醇 6.26mmol / L(正常参考范围 <5.2mmol / L)，低密度脂蛋白胆固醇 4.18mmol / L(正常参考范围 2.1~3.1mmol / L)，高密度脂蛋白胆固醇 1.20mmol / L(正常参考范围 1.2~1.65mmol / L)，血肌酐 50 μ mol / L(正常参考范围 45~84 μ mol / L)，尿蛋白(++)。临床诊断为高血压病、高脂血症、糖耐量异常。

- A: 复方利血平
- B: 依那普利
- C: 特拉唑嗪
- D: 氢氯噻嗪

答案：B

8. ADR 与用药时间相关性不密切。反应表现与已知该药 ADR 不相吻合，原患疾病发展同样可能有类似的临床表现：该 ADR 因果关系可评价为

- A: 可能
- B: 待评价
- C: 很可能
- D: 可能无关

答案：D

9. 房颤合并支气管哮喘患者，适用于控制心室率的药物为

- A: 利伐沙班
- B: 胺碘酮
- C: 地尔硫卓
- D: 硝苯地平

答案：C

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

10. 在考虑患者意愿、偏好和生命质量的基础上，比较不同治疗方案的经济合理性，应选用的药物经济学研究方法是

A: 最小成本分析

B: 成本-效果分析

C: 成本-效益分析

D: 成本-效用分析

答案: D

11. 甲状腺功能亢进症患者服用丙硫氧嘧啶，可引起的典型药源性疾病是

A: 粒细胞减少症

B: 消化性溃疡

C: 慢性肾衰竭

D: 溶血性贫血

答案: A

12. 大剂量或连续使用顺铂可导致

A: 不可逆性肾小管坏死

B: 肾小管阻塞

C: 直接肾毒性

D: 肾间质纤维化

答案: A

13. 消化不良很常见，半数以上人群在生命过程中曾因此病症而就诊，其主要症状有上腹饱胀、食欲缺乏等表现。

A: 胰酶片

B: 维生素 B1

C: 莫沙必利

D: 复方阿嗪米特肠溶片

答案: B

14. 低危患者

A: 立即使用抗高血压药物

B: 先观察（血压及危险因素）数周，然后决定是否进行药物治疗

C: 立即进行抢救治疗

D: 观察相当一段时间，再决定是否进行药物治疗

答案：D

15. 峰值一般在清晨 7~8 时，谷值则在午夜 0 时，是

A: 胰岛 B 细胞

B: 糖皮质激素的分泌

C: 肝脏合成胆固醇

D: 胃酸的分泌

答案：B

16. 在脑卒中各亚型中发病率最高的疾病为（）

A: 原发性蛛网膜下腔出血

B: 缺血性脑卒中

C: 脑梗死

D: 脑出血

答案：B

17. 患者，女性，50 岁，因咳嗽时漏尿明显就诊，患者既往生育史为剖宫产 2 胎，既往有咳嗽，漏尿症状，现症状明显加重，负重后均有尿液流出，每日需用卫生巾 1~2 片。经相关检查确诊为压力性尿失禁，给予米多君治疗。药师应告知患者药物的主要不良反应是

A: 鼻咽炎和尿路感染

B: 直立性低血压

C: 口干、便秘、尿潴留

D: 卧位和坐位时高血压

答案：D

18. 以最低的药物成本，实现最好的治疗效果体现

- A: 规范性
- B: 有效性
- C: 经济性
- D: 安全性

答案：C

19. 口服避孕药可能导致

- A: 血清总胆固醇升高
- B: 血清血红蛋白升高
- C: 血清碱性磷酸酶升高
- D: 血白细胞减少

答案：A

20. 患者，男，45 岁，患有高血压，因感冒发热，咽痛，流鼻涕到药店买药，药师不应推荐其使用的药物是()

- A: 复方酚咖伪麻胶囊
- B: 速克感冒片
- C: 维 C 银翘片
- D: 速感宁胶囊

答案：A

21. 患者，男，18 岁，因鼻塞症状就诊，医生处方 1%盐酸麻黄碱滴鼻液。下列关于该滴鼻液用药指导的说法，错误的是()

- A: 滴鼻后，要静卧 3~5 分钟
- B: 用药前要将鼻腔分泌物清理干净

C: 萎缩性鼻炎患者可增加给药次数

D: 滴管头不要碰到鼻部，以避免污染药液

答案：C

22. 除胰岛素分泌过多外，主要引起血糖低于正常参考区间低限的疾患是

A: 肝功能亢进

B: 激素分泌功能亢进

C: 颅内压增高、颅脑外伤

D: 激素分泌功能衰退

答案：D

23. 影响人类寿命的因素中，社会因素占

A: 0.07

B: 0.15

C: 0.1

D: 0.08

答案：C

24. (2018 年真题) 临床上将酚妥拉明 20mg、多巴胺 20mg、呋塞米 20mg 加入到 5%葡萄糖注射液 250ml 后，出现黑色沉淀。出现沉淀的原因是 ()

A: 酚妥拉明和多巴胺发生反应

B: 酚妥拉明在葡萄糖溶液中分解

C: 酚妥拉明和呋塞米发生反应

D: 多巴胺和呋塞米发生反应

答案：D

25. 在体外无抗凝作用，在体内有凝血作用的是

- A: 噻氯匹定
- B: 华法林
- C: 尿激酶
- D: 肝素

答案：B

26. 适用于阿司匹林哮喘伴过敏性鼻炎的预防和维持治疗的药物是

- A: 茶碱片
- B: 异丙托溴铵气雾剂
- C: 沙丁胺醇气雾剂
- D: 孟鲁司特钠咀嚼片

答案：D

27. 下列说法错误的

- A: 噻嘧啶与枸橼酸哌嗪合用可增强疗效
- B: 抗蠕虫药对妊娠及哺乳期妇女不宜应用
- C: 空腹服用抗蠕虫药可增强疗效
- D: 急性化脓性或弥漫性皮炎禁用抗蠕虫药

答案：A

28. 某男性患者，57 岁，既往高血压病史 10 年，与儿子吵架后突然起病，言语不清，左侧肢体无力，意识不清，查体：BP220/120mmHg，中度昏迷，瞳孔不等大，对光反射消失，强痛刺激，左侧肢体不活动，左侧巴宾斯基征阳性。

- A: 扩容
- B: 脱水
- C: 降血压

D: 止血

答案：B

29. 以下对于高血压患者的健康教育说法，错误的是

A: 高血压患者需要控制体重，BMI 尽可能控制在 $<24\text{kg/m}^2$

B: 减少食用油摄入 ($<25\text{g/d}$)，鼓励摄入单不饱和脂肪酸（橄榄油等）

C: 每日吃新鲜蔬菜和水果

D: 减少烹调用盐，每人每日食盐量不超过 0.5g

答案：D

30. 吩噻嗪类抗精神病药中毒癫痫发作时给予（）

A: 阿托品

B: 去甲肾上腺素

C: 苯妥英钠

D: 有机硫类

答案：C

31. 消化性溃疡抗 Hp 的四联疗法使用疗程为

A: 4~6 周

B: 6~8 周

C: 8~12 周

D: 1~2 周

答案：D

32. 以下药品中，归属妊娠毒性药物 X 级的是

A: 他汀类降脂药

B: 链霉素

C: 甲巯咪唑

D: 更昔洛韦

答案: A

33. 一新生儿确诊感染乙型肝炎病毒，提示其生母妊娠期间血清免疫学检查结果应为

A: HBsAg 为阳性

B: HBeAg 为阳性

C: HBsAg, HBeAg 均为阳性

D: HBsAb, HBeAg 均为阳性

答案: C

34. 属于羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂的药物是

A: 辛伐他汀

B: 非诺贝特

C: 依折麦布

D: 甲基多巴

答案: A

35. 每日分泌量相近，清晨始升高，午后达高峰，凌晨跌低谷，是

A: 胃酸的分泌

B: 胰岛 B 细胞

C: 糖皮质激素的分泌

D: 肝脏合成胆固醇

答案: B

36. 患者，男，26 岁，自述头痛、咽喉痛、全身乏力、畏寒，偶尔咳嗽，并有鼻塞、流鼻涕、打喷嚏等症状。经检查后，测量口腔体温 37.8℃，脉搏 72 次/分，白细胞计数 $3.7 \times 10^9/L$ 。医生为患者开具的处方如下：

- A: 2 次
- B: 1 次
- C: 4 次
- D: 3 次

答案：C

37. 关于 TIA 的药物治疗说法不正确的是

- A: 对反复发生 TIA 的患者应首先考虑选用抗血小板药物
- B: 小剂量肠溶阿司匹林能一定程度上降低卒中再发
- C: 对伴发房颤、风湿性二尖瓣病变的患者建议选用华法林抗凝治疗
- D: 抗凝治疗为非心源性 TIA 的常规治疗

答案：D

38. 患者，女，32 岁，2 天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛。查体：T38℃，肾区叩击痛。血常规见 WBC $15 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 85%。尿常规见尿液浑浊，尿蛋白阳性，镜检白细胞满视野。

- A: 急性肾小球肾炎
- B: 急性肾盂肾炎
- C: 急性膀胱炎
- D: 慢性肾盂肾炎

答案：B

39. 心力衰竭的支气管哮喘禁用

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

A: 利尿剂

B: 强心苷

C: RAAS 抑制剂

D: β 受体阻断剂

答案: D

40. 下列哪种药物是血液透析和腹膜透析均可清除的药物

A: 氯霉素

B: 苯巴比妥、阿司匹林

C: 卡托普利

D: 茶碱、普鲁卡因胺

答案: B

41. 以下药物中，可影响华法林吸收的为（）

A: 硫糖铝

B: 胶体果胶铋

C: 奥美拉唑

D: 雷尼替丁

答案: A

42. 属于过敏介质阻释剂的是

A: 孟鲁司特

B: 曲尼司特

C: 多索茶碱

D: 氨茶碱

答案: B

43. 患者，男性，45 岁，无痛性肉眼血尿 6 个月来诊，患者于 6 个月前无意中发现排尿全程尿色发深，呈酱油色，无腰痛，尿频，排尿困难，排尿后尿不尽，结合尿常规检查，诊断为良性前列腺增生。

- A: 非那雄胺
- B: 奥昔布宁
- C: 特拉唑嗪
- D: 坦索罗辛

答案：A

44. 患者，女，31 岁，1 个月前顺一健康男婴。近 2 周出现心境低落、乏力纳差、失眠焦虑，有自杀倾向，无法哺乳。诊断为产后抑郁症，给予氟西汀片 20mgqd。关于该患者用药教育的说法，错误的是（）

- A: 为尽快恢复哺乳，患者应在症状改善 1 个月后逐渐减量，直至停药
- B: 氟西汀应于每日早餐后服用
- C: 应足量和足疗程用药，疗效不佳可考虑换药
- D: 向患者解释“剂量滴定原则”，提示其用药剂量可能需要逐渐增加

答案：A

45. 患者，48 岁，胸痛部位在心前区，为压迫性疼痛，发作数秒钟，含服硝酸甘油 1~2 秒疼痛即消失。

- A: 不可吞服，应舌下含服
- B: 用药时应取坐位或蹲位
- C: 可能会出现头痛、面部潮红、心率反射性加快等不良反应
- D: 可出现干咳症状

答案：D

46. 患者男性，45 岁，反复发作夜间呼吸困难 1 个月，加重 1 天就诊。体格检查：血压 180 / 110mmHg，呼吸急促，双肺散在哮鸣音，双肺底细湿啰音，心率 130 次 / 分。

- A: 氨溴索
- B: 氨茶碱

C: 吗啡

D: 速尿

答案: C

47. 铁剂与维生素 C 联用增效的机制是

A: 竞争性拮抗作用

B: 促进机体的利用

C: 作用于不同的靶点

D: 延缓或降低抗药性

答案: B

48. 轻度冻疮患者可以选用的非处方药是

A: 杆菌肽软膏

B: 维 A 酸软膏

C: 樟脑软膏

D: 红霉素软膏

答案: C

49. 抗高血压药物属于血管紧张素 II 受体阻断剂的是 ()

A: 缬沙坦

B: 依那普利

C: 氢氯噻嗪

D: 氨氯地平

答案: A

50. 患者,男,80 岁,临床诊断为前列腺增生,给予多沙唑嗪治疗。药师对该患者的用药指导正确的是 ()

A: 睡前服用,起床站立时应缓慢,预防体位性低血压

B: 睡前服用,定期监测肝功能

C: 每日服用一次,定期监测血糖,防止发生低血糖反应

D: 睡前服用,注意监测肾功能

答案: A

51. 属于药师参与临床药物治疗、提供药学服务的重要方式和途径的是

A: 药物信息服务

B: 治疗药物监测

C: 参与健康教育

D: 处方调剂

答案: B

52. 铅严重中毒患者出现的最难救治的临床症状是 ()

A: 铅毒性脑病

B: 中毒性肾炎

C: 贫血

D: 中毒性肝炎

答案: A

53. 主要检查均匀度、细腻度、有无异臭酸败的是

A: 片剂

B: 糖浆剂

C: 软膏剂

D: 胶囊剂

答案: C

54. 抗抑郁药物的合理使用既无兴奋、镇静作用,又无抗胆碱、抗组胺作用的药物是

- A: 帕罗西汀
- B: 丙米嗪
- C: 氟伏沙明
- D: 阿米替林

答案：C

55. 相互作用延缓或降低抗药性的联合用药是

- A: 普萘洛尔联用硝苯地平
- B: 青蒿素联用乙胺嘧啶
- C: 阿托品联用氯磷定
- D: 阿托品联用普萘洛尔

答案：B

56. 急性化脓性中耳炎局部治疗，鼓膜穿孔后可使用

- A: 3%过氧化氢溶液
- B: 2%酚甘油滴耳液
- C: 3%酚甘油滴耳液
- D: 2%过氧化氢溶液

答案：A

57. 利血平+氢氯噻嗪

- A: 抑制氧化代谢反应
- B: 抑制乙醛脱氢酶
- C: 造成听神经和肾功能不可逆性损害
- D: 产生有利的药物相互作用

答案：D

58. 影响氟胞嘧啶药效的 PK / PD 参数是

A: $AUC_{0\sim 24} / MIC$

B: $\%T > MI$

C: C_{max}

D: C_{max} / MIC

答案：B

59. 高血压治疗药物选择噻嗪类利尿剂慎用于()

A: 胃溃疡患者

B: 痛风患者

C: 双侧肾动脉狭窄患者

D: 心力衰竭患者

答案：B

60. 患儿，男，3岁半，身高95cm，体重16kg一天前开始发热，20h左右出现腹泻，约3h一次大便，量少，黄色黏液便，呕吐1次。检查结果：体温38.8℃，脉搏118次/分，呼吸28次/分，出现轻微脱水症状，白细胞计数 $18.5 \times 10^9/L$ （参考值 $4.0 \times 10^9/L$ ~ $10.0 \times 10^9/L$ ），粪便镜检可见红、白细胞。

A: 鞣酸蛋白

B: 洛哌丁胺

C: 小檗碱

D: 药用炭

答案：B

61. 2型儿童糖尿病者宜首选()。

A: 胰岛素

B: 瑞格美脲

C: 格列喹酮

D: 二甲双胍

答案: D

62. 实施静脉注射给药时，不宜选用 0.9% (g / ml) 氯化钠注射液做溶媒溶解的药品是

A: 阿昔洛韦

B: 头孢菌素

C: 苯妥英钠

D: 氟罗沙星

答案: D

63. 泡腾片的注意事项是

A: 不宜在口中久含，以免影响其掩盖药物味道、控制药物在一定部位释放的目的

B: 用后应漱口

C: 宜用温开水送服，直接服用会黏附在咽喉和食管壁上引起刺激、恶心等不适

D: 不宜直接给患者服用，应溶解在水中服用，以免引起窒息

答案: D

64. 同时使用 2 种药物，药物不良事件的发生率为

A: 0.5

B: 0.38

C: 0.68

D: 0.13

答案: D

65. 不宜直接给患者服用，应溶解在水中服用，以免呛入气管

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 粉剂
- B: 糖浆剂
- C: 泡腾片
- D: 胶囊剂

答案：A

66. 雌二醇的适应症

- A: 子宫颈癌
- B: 子宫内膜癌
- C: 前列腺癌
- D: 绝经期前乳腺癌

答案：C

67. 亚硝酸盐中毒的解救药物是

- A: 纳洛酮
- B: 亚甲蓝
- C: 氯解磷定
- D: 青霉胺

答案：B

68. (2017 年真题) 根据《中国成人超重和肥胖预防控制指南》体重指数 (BMI) 判断为肥胖的标准是 ()

- A: $BMI \geq 24.0$
- B: $BMI \leq 18.5$
- C: $BMI \geq 28.0$
- D: $BMI < 21.5$

答案：C

69. 服用药物对粪外观的影响，保泰松

- A: 红至黑色
- B: 橘红至红色
- C: 黄色
- D: 变红或黑色

答案：D

70. 轻度支气管哮喘疾病的临床表现为

- A: 步行或上楼时气短，可有焦虑，呼吸频率轻度增加，闻及散在哮鸣音，肺通气功能和血气检查正常
- B: 稍事活动感气短，可有焦虑，呼吸频率增加，可有三凹征，闻及响亮、弥漫的哮鸣音，心率增快，可出现奇脉
- C: 不能讲话，嗜睡、意识模糊，胸腹矛盾运动等，喘鸣音减低或消失
- D: 休息时感气短，端坐呼吸，只能发单字表达，常有焦虑和烦躁，大汗淋漓，呼吸频率 >30 次 / 分，可有三凹征，闻及响亮、弥漫的哮鸣音，心率增快常 >120 次 / 分，奇脉， PaO_2

答案：A

71. 6 个月~2 岁婴幼儿白细胞计数正常参考区间是

- A: $(100 \sim 300) \times 10^9 / L$
- B: $(4.0 \sim 10.0) \times 10^9 / L$
- C: $(200 \sim 300) \times 10^9 / L$
- D: $(11.0 \sim 12.0) \times 10^9 / L$

答案：D

72. (2019 年真题) 患者，男，78 岁，因心房颤动服用华法林治疗 2 年余。后因真菌感染使用氟康唑，用药后 INR 升高并出现咳血症状。出现该症状的主要原因是

- A: 氟康唑抑制华法林的肾脏排泄，导致华法林血药浓度升高
B: 氟康唑可抑制 CYP2C9，导致华法林血药浓度升高
C: 氟康唑可增加华法林的吸收，导致华法林血药浓度升高
D: 氟康唑具有较强的血浆蛋白结合力，导致血中游离的华法林浓度升高

答案：B

73. 患者，女，50 岁，体重 60kg，因咳嗽、咳痰伴发热就诊，查体：体温 38.5℃、双肺可闻及湿性啰音，查血常规提示：WBC $12.4 \times 10^9/L$

- A: 1 片半 qd
B: 半片 qd
C: 首剂 1 片，此后每 24 小时半片
D: 1 片 qd

答案：C

74. 最可能引起血小板计数减少的药物是

- A: 氯丙嗪
B: 乳酸钠
C: 阿莫西林
D: 阿司匹林

答案：D

75. 拉米夫定的适应证是

- A: 足癣
B: 带状疱疹
C: 流感
D: 乙型病毒性肝炎

答案：D

76. 钙制剂

- A: 促进骨矿化剂
- B: 骨吸收抑制剂
- C: 骨形成刺激剂
- D: 激素替代剂

答案：A

77. 在骨性关节炎治疗中，为减轻胃肠道反应，可选用的选择性 COX-2 抑制剂是

- A: 塞来昔布
- B: 吲哚美辛
- C: 双氯芬酸
- D: 萘普生

答案：A

78. 男性，72 岁。高血压病 3 年，血压 165/95mmHg，伴 2 型糖尿病。首选降压药物是

- A: 心痛定
- B: β -受体阻滞剂
- C: ACEI 类
- D: 利尿剂

答案：C

79. (2017 年真题) 治疗急性腹泻可选用 ()

- A: 双八面体蒙脱石散
- B: 阿苯达唑
- C: 莫沙必利

D: 聚乙醇 4000

答案：A

80. 胃食管反流病患者应避免使用的药物是（）

A: 特拉唑嗪

B: 美托洛尔

C: 阿仑膦酸钠

D: 维生素 C

答案：C

81. 消化不良很常见，半数以上人群在生命过程中曾因此病症而就诊，其主要症状有上腹饱胀、食欲缺乏等表现。

A: 微生态制剂不可用于消化不良的治疗

B: 乳腺癌、机械性肠梗阻患者禁用多潘立酮

C: 过量的干酵母和乳酶生可以引起腹泻

D: 胰酶片必须用肠溶衣片，口服时不可嚼碎，应整片吞下

答案：A

82. 为减少和预防差错的发生，逐一核对药品与处方的相符性，检查药品剂型、规格、剂量、数量、包装，并签字属于（）。

A: 药品储存环节

B: 接待投诉环节

C: 调配处方环节

D: 发药环节

答案：D

83. II 期临床试验很难发现“低于 1% 发生频率”的不良反应，缘于查看材料

- A: 观察时间短
- B: 病例数目少
- C: 管理漏洞
- D: 考察不全面

答案：B

84. 乳汁中药物的浓度与下列哪种因素无关

- A: 药物与母体血浆蛋白结合率
- B: 脂溶性
- C: 母体中的药物浓度
- D: 药物剂型

答案：D

85. 患者，男，72 岁，因“冠心病、高血压、2 型糖尿病”长期用药治疗，服用药物包括阿司匹林肠溶片、马来酸依那普利片、辛伐他汀片、富马酸比索洛尔片、盐酸二甲双胍缓释片、格列美脲片、硝酸甘油片。近日患者出现一些药物不良反应症状，前来药店咨询药师。

- A: 辛伐他汀
- B: 盐酸二甲双胍
- C: 富马酸比索洛尔
- D: 阿司匹林

答案：D

86. 冠心病患者如不能耐受 ACEI，可考虑给予

- A: β 受体激动剂
- B: 地高辛
- C: α 受体拮抗剂

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

D: AR

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/576200024122011030>