

SOLD

@备考首选

通关无忧 轻松拿下考试

-  基础阶段—专业知识
-  刷题阶段—重点题库
-  冲刺阶段—押题点睛
-  考点覆盖—精编习题
-  紧扣考纲—直击考点
-  历年真题—押题抢分

本封面内容仅供参考，实际内容请认真预览本电子文本

祝您考试顺利

全科主治医师考试真题及答案解析

——《专业知识》

一、A1

1. 考核抗结核治疗疗效的主要指标是

- A. 临床症状减轻
- B. 胸部 X 线病变吸收
- C. 体温正常
- D. 痰菌转阴
- E. 咯血停止

【正确答案】 D

【答案解析】 痰排结核菌由阳性转为阴性，说明抗结核治疗有疗效，而其他选项在其他肺部疾病中亦可出现，无特异性。

2. 下列检查中除哪项外均可用于霍乱的诊断

- A. 大便涂片革兰染色
- B. 大便碱性蛋白胨水培养
- C. 大便悬滴法检查
- D. 霍乱血清凝集试验找特异性抗体
- E. 血培养找霍乱弧菌

【正确答案】 E

【答案解析】 霍乱是经消化道传播的传染病。霍乱弧菌进入小肠，黏附于肠黏膜表面繁殖，不进入血液。

3. 霍乱处理要点不正确的是

- A. 在地方性流行或疫区内，凡有典型临床表现者，即应按霍乱患者处理
- B. 在地方性流行期间，腹泻不严重，但有密切接触史，按高度疑似患者处理
- C. 症状消失 6 日后，大便连续培养，每日 1 次，连续 2 次阴性，可解除隔离出院
- D. 对患者的排泄物、呕吐物用干漂白粉按排泄量的 1/8 比例进行消毒
- E. 轻、中型患者可采取口服补液，重症患者要先静脉补液

【正确答案】 D

【答案解析】 对患者的排泄物、呕吐物用干漂白粉按排泄量的 1/5 比例进行消毒。

4.关于痢疾杆菌不正确的是

- A. 痢疾杆菌可引起一种常见肠道传染性疾病
- B. 为革兰氏阴性杆菌
- C. 属志贺菌属，该菌属分四群
- D. 外毒素可引起肠黏膜细胞坏死，主要与全身症状有关
- E. 内毒素所致肠道病变主要在结肠，以乙状结肠和直肠病变最显著

【正确答案】 D

【答案解析】 内毒素主要与全身症状有关。外毒素可引起肠黏膜细胞坏死，而内毒素所致肠道病变主要在结肠，以乙状结肠和直肠病变最显著。

5.在下列软组织损伤中，哪项不属于开放性损伤

- A. 擦伤
- B. 挫伤
- C. 切伤
- D. 裂伤
- E. 皮肤撕脱伤

【正确答案】 B

【答案解析】 开放性创伤是指体腔或骨与伤口相通，故软组织损伤中，挫伤不属于开放性损伤。

6.急性胆囊炎的常见症状不包括

- A. 右上腹痛
- B. 右肩背痛
- C. 脐周痛
- D. 畏寒、高热
- E. 恶心、呕吐

【正确答案】 C

【答案解析】 急性胆囊炎腹痛部位位于右上腹，可放射至右肩背。

7.腹股沟直疝环的底边为

- A. 腹股沟韧带
- B. 耻骨梳韧带
- C. 陷窝韧带
- D. 腹壁下动脉

【正确答案】 A

【答案解析】 直疝三角由腹壁下动脉构成外侧边，腹直肌外缘构成内侧边，腹股沟韧带构成底边。

8.急性阑尾炎的主要病因是

- A. 急性腹膜炎扩散
- B. 机体抵抗力下降
- C. 全身感染
- D. 阑尾腔机械性梗阻
- E. 阑尾损伤

【正确答案】 D

【答案解析】 由于阑尾的解剖学特点，如管腔细窄、开口狭小等，阑尾管腔易于阻塞。管腔阻塞后，阑尾黏膜分泌黏液增多，腔内压力上升，血运发生障碍，致使阑尾发炎。

9.无菌切口消毒顺序是

- A. 以切口为中心，自上而下
- B. 以切口为中心，自下而上
- C. 以切口为中心，向四周
- D. 不可牵拉衣袖
- E. 不可用手折叠袖口

【正确答案】 C

【答案解析】 无菌切口消毒顺序是以切口为中心，向四周。

10. 下列对急性细菌性前列腺炎的概述中，不正确的是

- A. 突然发病，会阴坠胀痛
- B. 前列腺按摩或穿刺有助于炎症消退
- C. 致病菌多为杆菌或假单胞菌
- D. 直肠指检前列腺肿胀、压痛，形成脓肿有波动感
- E. 可并发尿潴留

【正确答案】 B

【答案解析】 直肠指检前列腺肿胀、压痛、局部发热，禁忌做前列腺按摩。

11. 破伤风较早出现的症状是

- A. 苦笑面容
- B. 怕听水声
- C. 张口困难
- D. 颈项强直
- E. 四肢强烈痉挛

【正确答案】 C

【答案解析】 早期症状为全身不适，肌肉酸痛等，嚼肌痉挛所致的张口困难是最早的典型症状。

12. 关于癫痫治疗原则的叙述下列哪项错误

- A. 在全面评价患者后才开始长时间的抗癫痫治疗
- B. 依据发作类型选择用药
- C. 尽量小剂量联合用药
- D. 从小剂量开始，逐渐增加至能有效控制发作又不产生毒性反应为止
- E. 如需换药，应递减旧药，递增新药

【正确答案】 C

【答案解析】 抗癫痫药物治疗，以单药治疗为宜，多种药物联合应用可增加药物的慢性中毒，而且由于药物间的相互作用，可能互相降低疗效，因此应尽量单药治疗。

16. 以下狗咬伤后伤口急救处理措施中错误的是

- A. 伤口应立即处理
- B. 20%肥皂水彻底冲洗伤口
- C. 0.1%新洁尔灭彻底冲洗伤口
- D. 冲洗后用烧酒或 70%酒精涂擦
- E. 做上述处理后，将伤口包扎或缝合

【正确答案】 E

【答案解析】 狗咬伤后，伤口应尽快处理，以免毒素进入全身。伤口可用肥皂水冲洗，因肥皂水属碱性，能中和酸性的毒素，新洁尔灭、酒精可进一步起消毒作用。为了有利于毒素排出，不应包扎、缝合伤口。

17. 对于发生淹溺但是没有心搏的患者应首先使用的现场急救措施是

- A. 控水
- B. 保暖
- C. 心肺复苏术
- D. 气管插管
- E. 面罩吸氧

【正确答案】 C

【答案解析】 无心搏患者的现场急救：应立即进行心肺复苏术，2015 年国际心肺复苏和心血管急救指南指出：“没有证据表明呼吸道的水和其他堵塞物相同，因此不要浪费时间去清楚它”，不需要先控水。

18. 在颅脑损伤病人的转诊过程中，错误的处理措施是

- A. 保持气道通畅，吸氧
- B. 头皮裂伤时，加压包扎
- C. 使用脱水剂，防止脑疝
- D. 时刻注意双侧瞳孔变化
- E. 将伤员头部偏向一侧，防止误吸

【正确答案】 B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/577134165132006115>