

2024 年河北省行唐县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试附参考答案（培优 B 卷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 与硫酸亚铁合用，可减少铁吸收的药物是

- A: 叶酸
- B: 奥美拉唑
- C: 克拉维酸钾
- D: 苜丝肼

答案：B

2. （2017 年真题）患者，男 52 岁，身高 168cm，体重 85kg，痛风病史 6 年。近日因多饮、多尿就诊。实验室检查空腹血糖 7.8mmol/L（正常值：3.9~6.1mmol/L），餐后血糖 14.8mmol/L（正常值：<7.8mmol/L），血尿酸 580 μmol/L（正常值：男性 180~440 μmol/L），LDL-c 3.7mmol/L（正常值：2.1~3.1mmol/L）肌酐清除率 100ml/min。颈动脉彩超提示：动脉粥样硬化有混合性脂质斑块。临床诊断 2 型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症。

- A: ALT 升高
- B: 心律失常
- C: 腹胀
- D: 低血糖

答案：C

3. (透析患者常用药物)可消除便秘，避免腹腔感染和腹膜透析液引流不畅的药物是

- A: 乳果糖
- B: 阿法骨化醇
- C: 铁剂
- D: 对乙酰氨基酚

答案：A

4. 患者，48 岁，胸痛部位在心前区，为压迫性疼痛，发作数秒钟，含服硝酸甘油 1~2 秒疼痛即消失。

- A: 左旋氨氯地平
- B: 普伐他汀
- C: 曲美他嗪
- D: 哌唑嗪

答案：A

5. 长期精神紧张性头痛，推荐应用的药物是

- A: 罗通定
- B: 谷维素
- C: 阿司匹林
- D: 地西泮

答案：D

6. 蒽环类药物

- A: 心脏毒性
- B: 肺纤维化
- C: 出血性膀胱炎
- D: 溶血性尿毒症

答案：A

7. 长期大量用药时，可出现流感样症状的抗结核药是

- A: 乙胺丁醇
- B: 链霉素
- C: 异烟肼
- D: 利福平

答案：D

8. 患者，男，46 岁，因心绞痛伴房颤，给予维拉帕米治疗。维拉帕米的禁忌证是（）

- A: 痛风
- B: 心力衰竭
- C: 冠心病
- D: 双侧肾动脉狭窄

答案：B

9. 给予(透析患者)非甾体类抗炎药的依据是

- A: 透析患者会出现骨和关节疼痛或头痛
- B: 肾脏功能发生衰竭时缺乏活性形式的维生素 D
- C: 有助于机体合成红细胞
- D: 腹膜透析容易丢失水溶性维生素

答案：A

10. 患者，女，52 岁，患骨质疏松症伴静脉血栓，该患者避免使用的治疗药是

- A: 特立帕肽
- B: 雷洛昔芬

C: 阿仑膦酸钠

D: 鲑鱼降钙素

答案: B

11. 《国家非处方药目录》收载的缓泻药不包括

A: 比沙可啶

B: 替加色罗

C: 硫酸镁

D: 聚乙二醇粉剂

答案: B

12. (2021 年真题) 吉法酯片治疗消化性溃疡，正确的用药方法是 ()

A: 清晨空腹整片吞服，并保持上身直立至少 30 分钟

B: 餐后半小时服用

C: 睡前服用

D: 餐前 1/小时嚼碎服用

答案: B

13. 对严重药品滥用和用药失误的处方，处置的方式是

A: 应拒绝调配，并按有关规定报告

B: 准予调配

C: 经改正并签字确认后，方可调配

D: 拒绝调配

答案: A

14. 下列药物中，驾驶员服用后可能出现定向力障碍的是

A: 金刚烷胺

B: 双氯芬酸

C: 氟桂利嗪

D: 哌替啶

答案: D

15. 属于 5 α 还原酶抑制剂的是 ()

A: 普适泰

B: 度他雄胺

C: 雌三醇

D: 氟他胺

答案: B

16. 洗胃液 1:5000 高锰酸钾溶液可用于解救哪类药物中毒

A: 乐果中毒

B: 巴比妥类中毒

C: 1605 中毒

D: 3911 中毒

答案: B

17. 透析患者宜在两餐中间服用的药物是

A: 铁剂

B: 磷结合剂

C: 促红细胞生成素

D: 维生素 D

答案: A

18. 肺结核的临床表现是

A: 多发生于儿童，为阵发性剧烈痉挛性咳嗽伴有鸡鸣样吸气吼声，病程可达 2~3 个月

B: 多为轻咳或干咳，偶见少量薄白痰，并伴有背痛、发热、头痛、咽喉痛

C: 可有低热或高热，清瘦、轻咳、盗汗，有黄绿色痰

D: 有慢性咳嗽，伴有大量脓痰及反复咯血

答案：C

19. 患者，女，50 岁，体重 60kg，因咳嗽、咳痰伴发热就诊，查体：体温 38.5℃、双肺可闻及湿性啰音，查血常规提示：WBC 12.4×10

A: 65ml/min

B: 47ml/min

C: 70ml/min

D: 55ml/min

答案：B

20. 非霍奇金淋巴瘤的 CHOP 方案中不包括的治疗药物是

A: 阿霉素

B: 利妥昔单抗

C: 长春新碱

D: 环磷酰胺

答案：B

21. 胃食管反流病患者应避免使用的药物是（）

A: 阿仑膦酸钠

B: 美托洛尔

C: 特拉唑嗪

D: 维生素 C

答案：A

22. 在《中国药典临床用药须知》以外的权威性文献中记载的应该做皮肤敏感试验的品种是

- A: 鱼肝油酸钠
- B: 降纤酶
- C: 肉毒抗毒素
- D: 右旋糖酐

答案：D

23. 下列属于二级文献的是

- A: 《中国药学文摘》
- B: 《中国药学杂志》
- C: 《中国药学年鉴》
- D: 《化学名词》

答案：A

24. 规范处方行为与操作流程，归属

- A: 科学发展
- B: 知识培训
- C: 环境与流程的优化与持续改进
- D: 管理规范到位

答案：D

25. 可引起驾驶员嗜睡的药物是

- A: 双嘧达莫
- B: 抗过敏药
- C: 东莨菪碱
- D: 阿米洛利

答案：B

26. 脂溶性中等，作用持续 3~6h 的是

- A: 苯巴比妥
- B: 巴比妥
- C: 戊巴比妥
- D: 硫喷妥

答案: C

27. 乙醇+呋喃唑酮

- A: 抑制乙醛脱氢酶
- B: 产生有利的药物相互作用
- C: 抑制氧化代谢反应
- D: 造成听神经和肾功能不可逆性损害

答案: A

28. 不宜咀嚼或吞服，以免影响药物剂型设计目的的是

- A: 舌下片
- B: 糖浆剂
- C: 胶囊剂
- D: 粉剂

答案: A

29. 治疗严重先兆子痫的首选药物为

- A: 依那普利
- B: 硫酸镁
- C: 美托洛尔
- D: 氢氯噻嗪

答案: C

30. 患者，男，28 岁。咳嗽、咳痰，血常规提示白细胞及中性粒细胞正常，予阿奇霉素抗感染为

- A: 无适应证用药
- B: 联合用药不适宜
- C: 过度治疗用药
- D: 有禁忌证用药

答案：A

31. (用药与尿液检查异常) 甲氨蝶呤可能引起

- A: 尿液 pH 增高
- B: 尿液隐血
- C: 尿胆红素
- D: 尿蛋白

答案：D

32. 接种乙肝疫苗后，血清免疫学检查可呈现阳性反应的指标是

- A: 乙型肝炎病毒表面抗体?
- B: 乙型肝炎病毒表面抗原?
- C: 乙型肝炎病毒 e 抗原?
- D: 乙型肝炎病毒 e 抗体?

答案：A

33. 以下所列药品中，进餐时服用可减少脂肪吸收的药品是

- A: 吉非贝齐
- B: 苯扎贝特
- C: 阿昔莫司
- D: 奥利司他（减肥药）

答案：D

34. 下列药物中，解救三唑仑中毒的特效药是

- A: 碳酸氢钠
- B: 维生素 C
- C: 氟马西尼
- D: 维生素 K

答案：C

35. 主要对成本进行量化分析、也同时考虑效果，用于两种或多种药物治疗方案的选择是指

- A: 最小成本分析
- B: 成本-效用分析
- C: 成本-效益分析
- D: 最大效果分析

答案：A

36. (2015 年真题) 妊娠期使用某些药物可能导致胎儿发育异常，其中最易受到药物影响，可能产生形态或者功能上异常而造成胎儿畸形的阶段是 ()。

- A: 妊娠 3~12 周
- B: 妊娠 13~27 周
- C: 妊娠 28~32 周
- D: 妊娠 1~2 周

答案：A

37. 下列组合中，属于联合化疗的是 ()

- A: MTX 方案 (甲氨蝶呤小剂量鞘内注射+甲氨蝶呤大剂量静脉输注)

B: CTX+美司钠（环磷酰胺+美司钠）

C: CHOP 方案（环磷酰胺+阿霉素+长春新碱+泼尼松）

D: VEGF 抑制剂+ALK 抑制剂（贝伐珠单抗+奥希替尼）

答案：C

38. 患者，男，50 岁，高血压病史 3 年，期间先后使用硝苯地平片和硝苯地平控释片控制血压，近日出差曾饮酒和饮用多种饮料，出现血压波动情况。

A: 控释片比普通片起效快，作用时间长

B: 控释片一般一日三次给药，与普通片给药次数相同

C: 控释片比普通片含剂量高，不易嚼碎服用，不然会导致低血压

D: 控释片与普通片含量相同，可以固定时间，间替换服用

答案：C

39. 适用于有完整子宫、绝经后期不希望有月经样出血的妇女()

A: 单纯雌激素补充治疗

B: 单纯孕激素补充治疗

C: 雌孕激素序贯用药

D: 雌孕激素连续联合用药

答案：D

40. 药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素、药物因素。

A: 药动学相互作用

B: 药物制剂因素

C: 药理作用

D: 药物的使用

答案: D

41. 胃食管反流病患者应避免使用的药物是

A: 阿仑膦酸钠

B: 阿司匹林

C: 特拉唑嗪

D: 美托洛尔

答案: A

42. 甲氨蝶呤归属

A: B 级

B: X 级

C: D 级

D: C 级

答案: B

43. 左心衰竭最早出现的症状是

A: 夜间阵发性呼吸困难

B: 劳力性呼吸困难

C: 粉红色泡沫样痰

D: 端坐呼吸

答案: B

44. (2018 年真题) 某口服避孕药复方制剂，其成分为：每片含屈螺酮 3mg 和炔雌醇 0.03mg。说明书部分内容节选如下，请回答问题。

A: 到 21 日 20:00 再同时服用两片药，然后在常规时间继续服药

B: 不再继续服用此周期药物,经过一个 7 天的停药期,再开始继续服用下一周期的药物

C: 尽快补服一片,然后在常规时间继续服药

D: 尽快同时服用两片药,然后在常规时间继续服药,在以后的 7 天内要加用屏障避孕法

答案: C

45. (2018 年真题) 射击运动员使用后,可减慢心率,减少心肌耗氧量,消除比赛前紧张心理,因此被列入兴奋剂管理的药物是 ()

A: 普萘洛尔

B: 缬沙坦

C: 硝苯地平

D: 呋塞米

答案: A

46. 患者,男,65 岁因咳嗽、咳大量脓痰、呼吸困难入院,诊断为慢性阻塞性肺病急性加重。该患者临床治疗不应选用的药物是 ()

A: 羧甲司坦

B: 乙酰半胱氨酸

C: 氨溴索

D: 右美沙芬

答案: D

47. 米索前列醇所致的主要不良反应是

A: 皮炎

B: 腹痛

C: 神经毒性

D: 性功能减退

答案：B

48. 以下治疗沙眼的药物中，属于处方药的是

- A: 2%硝酸银
- B: 硫酸锌滴眼剂
- C: 红霉素眼膏
- D: 酞丁安滴眼剂

答案：A

49. 患儿，男，10个月，1天前出现腹泻，大便7次/日，黄色水样便，量多，未见黏液脓血便，伴发热，体温38~39℃，时有呕吐/3次，日。大便常规：WBC1-3/HP。

- A: 2~3小时
- B: 3~4小时
- C: 0.5~2小时
- D: 24小时

答案：A

50. 患者，男，72岁，常年酗酒导致体内叶酸缺乏，诊断为巨幼细胞性贫血。该患者同时患有慢性胃肠道功能紊乱性疾病，应给予患者的治疗方式是

- A: 口服甲氨蝶呤 5mg，qd
- B: 口服叶酸 5mg，tid
- C: 肌注亚叶酸钙 1mg，qd
- D: 静脉注射硫酸亚铁 200mg，qd

答案：C

51. 药物相互作用包括发生在体内的药动学、药效学方面的作用；以及发生在体外的配伍变化，如引起理化反应使药品出现混浊、沉淀、变色和活性降低。

- A: 异烟肼
- B: 伊曲康唑
- C: 利福平
- D: 红霉素

答案：C

52. 宜于睡前服用的药品是

- A: 洛伐他汀
- B: 阿卡波糖
- C: 糖皮质激素
- D: 甲氧氯普胺

答案：A

53. 用于循证医学评价证据强弱分级的是()

- A: CLHD 公式
- B: CoCkroft-GAut 公式
- C: CoChrAnE 分级
- D: NCEMERP 标准

答案：C

54. 用于治疗溃疡性结肠炎，应晨起服用，达到症状完全缓解后开始减量，减药速度不宜太快的药物是

- A: 阿卡波糖
- B: 格列吡嗪
- C: 二甲双胍

D: 西格列汀

答案: C

55. 痛风患者的尿液常见

A: 草酸盐结晶

B: 磷酸盐结晶

C: 酪氨酸和亮氨酸结晶

D: 尿酸盐结晶

答案: D

56. 患者，女，20岁，1天前淋雨后受凉，初始感咽痒、咽干，随后感咽部疼痛，吞咽时更为明显，伴刺激性咳嗽，无发热、畏寒、寒战。

查体：T36.5℃，P70次/分，R18次/分，BP135/80mmHg。鼻咽黏膜光滑，咽隐窝无异常分泌物；双侧扁桃体Ⅰ度肿大，表面光滑，未见脓性分泌物；颈部未及肿大淋巴结。采用改良Centor评分：患者，20岁，无发热，伴咳嗽，无扁桃体渗出或肿胀，无颈前淋巴结肿痛；改良Centor评分为0分。药师对该患者的建议，错误的是

A: 建议口服阿莫西林胶囊 500mgbid，疗程 10d

B: 告知患者不要强行发声

C: 可服用布洛芬混悬液止痛

D: 避免环境温度突然变化

答案: A

57. 布洛芬作为非处方药主要用于治疗

A: 感冒

B: 抑郁

C: 发热

D: 鼻炎

答案：C

58. 患者，男，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

- A: 抗菌药物
- B: 阿司匹林
- C: 布洛芬
- D: 糖皮质激素

答案：D

59. 宜于餐中服用的药品是

- A: 甲氧氯普胺
- B: 洛伐他汀
- C: 阿卡波糖
- D: 糖皮质激素

答案：C

60. 沿静脉出现迂回线状色素沉着

- A: 博来霉素
- B: 氟尿嘧啶
- C: 白消安
- D: 柔红霉素

答案：B

61. KDIGO 推荐的 CKD 分期方法主要依据指标是

- A: 肾小球滤过率（GFR）
- B: 尿微量白蛋白排泄率（AER）
- C: 肌酐清除率（CrCl）

D: 尿微量白蛋白肌酐比值 (ACR)

答案: A

62. 女性，59 岁，间断咳嗽、咳痰 5 年，加重伴咯血 2 个月。患者表现为低热、乏力、食欲减退、咳白色黏痰、体重逐渐下降。

A: 布地奈德?

B: 异烟肼?

C: 青霉素?

D: 特布他林?

答案: B

63. 药学服务的对象涉及面广，其服务中心是()。

A: 以药师为中心的药学服务

B: 以患者为中心的药学服务

C: 以医师为中心的药学服务

D: 以医院为中心的药学服务

答案: B

64. (2017 年真题) 患者女，68 岁体重 54kg，因慢性阻塞性肺病急性加重再次入院，入院后生化检查 ALT20IU/L，血肌酐 (Cr) 1.8mg/dL，痰培养为铜绿假单胞菌。临床选用头孢他啶。头孢他啶药品说明书成人常用剂量为 1 日 1.5~6g，分 2~3 次给药肌酐清除率为

31~50ml/min 时剂量为每 12 小时 1g；肌酐清除率为 16~30ml/min 时剂量为每 24 小时 1g；肌酐清除率为 6~15ml/min 时量为每 24 小时

0.5g；肌酐清除率≤5ml/min 时剂量为每 48 小时 0.5g。

A: 40ml/min

B: 30ml/min

C: 25.5ml/min

D: 34ml/min

答案：C

65. 适用于阿司匹林哮喘伴过敏性鼻炎的预防和维持治疗的药物是

- A: 茶碱片
- B: 沙丁胺醇气雾剂
- C: 异丙托溴铵气雾剂
- D: 孟鲁司特钠咀嚼片

答案：D

66. (2019 年真题) 患者，女，56 岁，诊断为高血压伴快速型心律失常，首选的药物是

- A: 氯沙坦
- B: 螺内酯
- C: 维拉帕米
- D: 美托洛尔

答案：D

67. 下列关于甲状腺功能亢进症患者教育的说法错误的是()

- A: 避免饮用咖啡等兴奋性饮料
- B: 避免使用含碘药物
- C: 妊娠伴甲状腺功能亢进症患者宜选甲巯咪唑
- D: 禁食富含碘的食物

答案：C

68. 下列治疗痤疮的药物中，患者在治疗期间及治疗结束后 1 个月应避免献血的是：

- A: 过氧甲苯酰

- B: 红霉素
- C: 克林霉素
- D: 异维 A 酸

答案：D

69. (2015 年真题) 患者，女。62 岁，医师处方如下：

- A: 氨氯地平
- B: 二甲双胍
- C: 阿卡波糖
- D: 氯吡格雷

答案：D

70. 抑酸剂泮托拉唑长期应用可引起的典型不良反应是

- A: 血糖升高
- B: 定向力障碍、意识混乱
- C: 高钾血症
- D: 低镁血症

答案：D

71. 肾脏的功能主要是分泌和排泄尿液、废物、毒物和药物，调节和维持体内环境的平衡。变态反应、感染、肾血管病变、代谢异常、先天性疾病、全身循环和代谢性疾病、药物、毒素对肾脏的损害均可影响肾功能。

- A: 45~84 $\mu\text{mol/L}$
- B: 53~97 $\mu\text{mol/L}$
- C: 27~62 $\mu\text{mol/L}$
- D: 18~35 $\mu\text{mol/L}$

答案：D

72. 高血压合并糖尿病、肾功能不全，宜选用的药物是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 美托洛尔
- C: 缬沙坦
- D: 非洛地平

答案：C

73. (2015 年真题) 治疗抗肿瘤药引起的恶心、呕吐等不良反应，可选用的止吐药是 ()。

- A: 奥美拉唑
- B: 雷尼替丁
- C: 昂丹司琼
- D: 维生素 B6

答案：C

74. 患者，男，67 岁，慢性咳喘 20 余年，现因哮喘急性发作就诊，首选的药物是 ()

- A: 异丙托溴铵气雾剂
- B: 氨茶碱片
- C: 沙丁胺醇气雾剂
- D: 二羟丙茶碱片

答案：C

75. 钙制剂属于

- A: 骨形成刺激剂
- B: 促进骨矿化剂
- C: 骨吸收抑制剂

D: 激素替代剂

答案：B

76. (2019 年真题) 患者，女，25 岁，两天前淋雨后开始发热体温 39.0℃，咳嗽，咳铁锈色黏痰，化验结果提示白细胞计数及中性粒细胞比例升高，诊断为肺炎，经验性抗感染治疗时适宜选用的药物

A: 头孢唑林

B: 阿米卡星

C: 头孢他啶

D: 阿奇霉素

答案：A

77. 以下哪项不是药物流产的适应证 ()

A: 妊娠≤49 日

B: 本人自愿、年龄>40 岁的健康女性

C: B 超确诊为宫内妊娠

D: 多次人工流产术史

答案：B

78. 指明其资料来源通过超链接指向其材料来源

A: 合理性

B: 新颖性

C: 权威性

D: 归因性

答案：D

79. 热应激时液体丢失所致的以有效循环血容量不足为特征的临床综合征是

- A: 热痉挛
- B: 休克
- C: 热衰竭
- D: 热射病

答案：C

80. 儿童 2 型糖尿病患者宜选用的药物是

- A: 格列喹酮
- B: 格列苯脲
- C: 胰岛素
- D: 二甲双胍

答案：D

81. 适用于急性疼痛、骨关节炎的处方药是

- A: 塞来昔布
- B: 硫酸氨基葡萄糖
- C: 可待因
- D: 阿托品

答案：A

82. 以维生素 C 注射液作溶剂溶解后注射的是

- A: 谷胱甘肽
- B: 亚硝酸钠
- C: 双解磷
- D: 盐酸烯丙吗啡

答案：A

83. 阿卡波糖片的适宜服药时间是

A: 餐前

B: 餐中

C: 清晨

D: 餐后

答案: B

84. 用于轻度内痔属风热及湿热下注所致的少量便血、肛门肿痛、下坠感的药物是

A: 痔康片

B: 草木犀流浸液片

C: 九味痔疮胶囊

D: 金玄痔科熏洗散

答案: A

85. 吸附力强、可阻止毒物吸收，但是对氰化物无效的洗胃液是

A: 1%硫酸镁溶液

B: 牛奶-水混合液

C: 鸡蛋白

D: 药用炭混悬液

答案: D

86. 不宜选用静脉滴注 5%碳酸氢钠注射液碱化尿液的情况是

A: 苯巴比妥中毒

B: 苯妥英钠中毒

C: 异戊巴比妥中毒

D: 司可巴比妥中毒

答案: C

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/577140163051010024>