

(新) 急救相关知识考试题库

第一部分 单选题(200 题)

1、左心衰时呼吸困难的特点，不包括 0

- A、活动时加重
- B、休息时减轻
- C、仰卧时加重
- D、常伴淤血性肝大
- E、常采取端坐呼吸体位

【答案】： D

2、头颈部创伤的伤者开通气道的方法为 0

- A、仰头举颞法
- B、抬颌法
- C、仰头抬颈法
- D、压额抬颌法

【答案】： B

3、休克早期微循环灌注的特点是 0

- A、少灌少流
- B、多灌少流
- C、不灌不流
- D、少灌多流
- E、多灌多流

【答案】： A

4、成年人颅内压的正常值为 0

A、70-200mmH₂O

B、80-210mmH₂O

C、90-190mmH₂O

D、60-180mmHg

E、70-150mmHg

【答案】： A

5、进行 CPR 的前提条件是 0

A、无反应、无呼吸

B、无反应、有呼吸

C、无意识

D、无反应

【答案】： A

6、一次性出血量超过()时可引起全身症状。()

A、250ml

B、800ml

C、400-500ml

D、600ml

E、1000ml

【答案】： C

7、胸外伤后，出现胸壁软化(连枷胸)的原因是 0

A、2 根以上肋骨骨折

B、多根多段肋骨骨折

C、胸骨骨折

D、反常呼吸

E、纵隔摆

【答案】： B

8、高钾时心电图的变化正确的是 0

A、S-T 段下降

B、T波高尖，PR间期延长

C、出现U波

D、QRS间缩短，QT时间延长

E、T波宽而低平，重者T波倒置

【答案】： B

9、女性，49岁，多年胃溃疡，近1个月胃区疼痛，发病前饱食并饮酒，饭后12分钟突然腹痛，剧如刀割，腹呈板状，来源急诊下一步简单有效的检查方法是0

- A、腹部X线检查
- B、纤维胃镜
- C、腹腔冲洗
- D、磁共振
- E、B超

【答案】： A

10、男性，22岁，右胸刺伤2小时，创口与胸腔相通，患者极度呼吸困难，首要的急救措施是)

- A、迅速封闭胸壁伤口
- B、立即手术
- C、输血，输液
- D、胸腔闭式引流
- E、给氧，气管插管

【答案】： A

11、属于闭合性创伤的是0

- A、擦伤
- B、震荡伤
- C、切削伤
- D、撕脱伤
- E、火器伤

【答案】： B

12、发生火灾逃生时，错误的选项是 0

- A、走安全通道
- B、用湿毛巾捂住口鼻
- C、最低姿势匍匐前进
- D、乘坐电梯

【答案】： D

13、患者，男，70 岁。胸痛心悸伴晕厥 1 次。体检示： BP140/80mmHg
HR72 次/分，

早搏 2—3 次/分。收入 ICU 后，心电监护见室颤。拟使用电除颤，下
列那一项是首

次双向波除颤最常用的能量 0

- A、100J
- B、200J
- C、300J
- D、150J
- E、360J

【答案】： B

14、非同步电复律用于治疗 0

- A、心室扑动
- B、室性心动过速
- C、心房扑动
- D、室上性心动过速
- E、心房颤动

【答案】： A

15、患者，男性，49 岁。既往有高血压、脑出血史，现脑出血术后 16
天出院，突发

高热，由家人送至急诊科。患者神志不清，在对患者进行气道及呼吸评估时，患者突然面色青紫。如果你是分诊护士，首先要做的是 0

- A、立即将患者送入抢救室
- B、给予人工呼吸
- C、呼叫医生
- D、尽快结束初级评估
- E、测量血氧饱和度

【答案】： A

16、四肢小动脉、中小静脉或毛细血管出血应采用加压包扎止血法 0

- A、加压包扎止血法
- B、按压止血法
- C、指压止血法
- D、止血带止血法
- E、用止血钳直接夹闭血管的断端

【答案】： A

17、患者，女，28岁，看电视时突觉右侧上下肢不能活动，不能言语，无呕吐，无抽搐，有风湿性心脏病十年。最可能的诊断是 0

- A、脑出血
- B、TIA
- C、脑血栓形成
- D、脑栓塞
- E、蛛网膜下腔出血

【答案】： D

18、患者，男性，49岁。冠心病史5年，以“胸闷、剧烈胸痛半小时，伴大汗”为主诉来诊，进入抢救室后，心电监护示波显示“RS

波群消失，代之以大小不等、形态各异的颤动波，频率为 300 次/分”。此时应立即采取的最恰当的急救措施是

)

- A、按压人中，同时立即给予气管插管
- B、应用单相波除颤器连续除颤 3 次
- C、应用双相波除颤器进行除颤，能量 150J
- D、立即给予气管插管，胸外按压
- E、立即建立静脉通路，给予肾上腺素 0.5~1mg 静脉注射

【答案】： C

19、患者，女，23 岁。因路人发现晕倒在地而送来急诊，体检：神志恍惚，瞳孔缩小，呼出气无特殊气味，心率 120 次/分，律齐，BP90/60mmHg，上臂可见多处注射针眼、该患者最有可能的诊断是 0

- A、有机磷中毒
- B、鸦片类中毒
- C、乙醇中毒
- D、口服地西洋中毒
- E、以上都不是

【答案】： B

20、电除颤的并发症不包括 0

- A、心律失常
- B、高血压
- C、肺和体循环栓塞
- D、急性肺水肿

【答案】： B

21、急性有机磷农药中毒机制是 0

- A、抑制酶活性
- B、缺氧

C、局部腐蚀刺激作用

D、竞争受体

E、麻醉作用

【答案】： A

22、腹部检查下列哪项错误 0

- A、振水音见于幽门梗阻
- B、肋下扪及肝脏提示肝大
- C、脾脏正常时不能扪及
- D、肠鸣音消失可见于肠麻痹
- E、腹主动脉搏动正常人可触到

【答案】： B

23、男性，30岁。车祸伤现场发现左股部伤口有大量鲜血涌出，此时最先应检查

的是 0

- A、触诊足背和胫后动脉
- B、检查肢体感觉
- C、检查膝腱或跟腱反射
- D、足部主动活动有无缺失
- E、左下肢主动活动有无缺失

【答案】： A

24、气道异物梗阻患者胸部冲击法用力的部位在患者的 0

- A、胸骨上部
- B、胸骨中部
- C、胸骨下部
- D、剑突部

【答案】： B

25、短时间内出血量超过()时可出现周围循环衰竭。0

- A、500ml
- B、800ml
- C、1200ml
- D、1000ml
- E、2000ml

【答案】： D

26、对火灾抢救出来的伤员，应首先 0

- A、给予充足的饮食再送医院
- B、询问火灾原因
- C、采取各种适当的方法进行现场救护再送医院
- D、得到亲友的陪伴在进行抢救治疗

【答案】： C

27、抢救口服有机磷农药中毒病人洗胃时最常用的洗胃液是 0

- A、0.9%氯化钠注射液、温开水
- B、热开水
- C、2%碳酸氢钠
- D、1:5000 高锰酸钾溶液
- E、5%葡萄糖注射液

【答案】： A

28、危重症患者家属病情保障方面的需求，家属最关心的是 0

- A、患者安全
- B、患者饮食
- C、患者舒适
- D、患者心理
- E、患者支持

【答案】： A

29、家庭环境中的创伤和擦伤，哪种清洗伤口的效果更好 0

- A、用自来水冲洗效果好
- B、用生理盐水冲洗效果好
- C、肥皂水冲洗效果好
- D、用苏打水冲洗效果好
- E、A 和 B 效果一样好

【答案】： E

30、急性肠梗阻易导致 0

- A、高血钙
- B、低血钙
- C、高血钾
- D、低血钾
- E、高渗性脱水

【答案】： D

31、以上哪种情况应禁忌洗胃 0

- A、急性有机磷农药中毒
- B、急性安定中毒
- C、飘药中毒
- D、强酸、强碱中毒
- E、食物中毒

【答案】： D

32、对成人行胸外心脏按压，正确的按压频率为 0

- A、50 次/分
- B、60 次/分
- C、70 次/分
- D、80 次/分
- E、90 次/分

【答案】： B

33、中年女性，45 岁。炎热夏天，天气闷热，在外面连续工作 5 小时，由于大量出汗

导致失水、失钠等引起的周围循环灌注不足属于 0

- A、热衰竭
- B、热射病
- C、热痉挛
- D、日射病

【答案】： A

34、王女士，30岁，颅脑损伤住院治疗行冬眠降温疗法错误的护理是
0

- A、用药前量体温、脉搏、呼吸、血压
- B、物理降温后用冬眠药物
- C、病人在注射冬眠药物后半小时内不宜翻身或搬运
- D、维持直肠内温度在 32-34℃
- E、维持、电解质及酸碱平衡

【答案】： D

35、一旦心搏骤停患者恢复自主循环，理想的目标是以最低的 FiO_2 将血氧饱和度水平维持在 0

- A、80%以下
- B、85%~100%
- C、90%~100%
- D、94%~100%
- E、100%以上

【答案】： D

36、患者，男性，3岁，因呕血黑便来院就诊，神志清楚，面色苍白，血压 80/50mmHg。

考虑病人血容量不足，应输入的溶液是 0

- A、10%葡萄糖
- B、脂肪乳
- C、20%甘露醇
- D、中分子右旋糖酐
- E、浓缩白蛋白

【答案】： D

37、空气栓塞时应采取的卧位是 0

- A、半卧位
- B、端坐位

C、右侧卧位，头低足高位

D、左侧卧位，头低足高位

E、左侧卧位，头高足低位

【答案】： D

38、左侧心力衰竭患者的脉象改变 0

- A、奇脉
- B、洪脉
- C、交替脉
- D、水冲脉
- E、细脉

【答案】： C

39、II型呼吸衰竭是指动脉血气显示 0

- A、仅有缺氧
- B、仅有二氧化碳潴留
- C、仅有二氧化碳降低
- D、既有缺氧，又有二氧化碳降低
- E、既有缺氧，又有二氧化碳潴留

【答案】： E

40、危重症患者家属最主要的心理需求为 0

- A、病情保障与获取信息
- B、照顾患者
- C、接近患者
- D、获得支持
- E、自身舒适

【答案】： A

41、中毒时最首要的处理是 0

- A、对症治疗
- B、使用抗生素
- C、立即终止接触毒药
- D、使用特效解毒药
- E、清除进入人体的毒药

【答案】： C

42、终止室颤最迅速、最有效的措施是 0

- A、立即胸外心脏按压
- B、立即给予除颤
- C、尽快给予气管插管
- D、立即给予球囊-面罩通气
- E、立即给予肾上腺素 1mg 静脉注射

【答案】： B

43、休克早期血压的变化 0

- A、收缩压下降，脉压差小
- B、收缩压升高，脉压差大
- C、收缩压正常，脉压差小
- D、收缩压下降，脉压差大
- E、血压无变化

【答案】： C

44、急性 CO 中度中毒时，血液 HbCo 浓度为)

- A、10-30%
- B、30-50%
- C、>50%
- D、50-70%
- E、70%以上

【答案】： B

45、腹部空腔脏器破裂最主要的临床表现是 0

- A、肠麻痹
- B、休克症状
- C、弥漫性腹膜炎症状
- D、内出血征像
- E、感染性休克症状

【答案】： C

46、男，50岁，高血压病多年，近日活动后出现呼吸困难伴左胸痛，咳嗽频繁，咳出为粉红色泡沫样血痰，可能疾病为0

- A、大叶性肺炎
- B、急性左心衰
- C、右心衰竭
- D、支气管扩张
- E、自发性气胸

【答案】： B

47、2010年10月-美国心脏协会(AHA)公布最新心肺复苏(CPR)指南。重新安排了CPR传统的三个步骤，最新三步骤是)

- A、A-B-C
- B、C-A-B
- C、B-CA
- D、B-A-C

【答案】： B

48、高血压脑出血的主要发病机制是0

- A、小动脉壁受损出血
- B、微动脉瘤的形成与破裂
- C、脑淀粉样血管病
- D、脑软化后出血
- E、脑动脉结构异常

【答案】： B

49、常用的晶体溶液，不包括下列哪项 0

- A、0.9%NaCl
- B、50%葡萄糖溶液
- C、4%NaHCO₃
- D、林格氏液

【答案】： B

50、插胃管时，患者出现呛咳、紫绀应 0

- A、嘱患者深呼吸
- B、嘱患者作吞咽动作
- C、立即拔出胃管重插
- D、托起患者头部再插管
- E、稍停片刻继续插

【答案】： C

51、属于骨折早期并发症的是 0

- A、血管神经损伤
- B、关节僵硬
- C、创伤性关节炎
- D、缺血性肌挛缩
- E、延迟愈合

【答案】： A

52、患者，男性，55岁。参加2小时会议后，到洗手间返回会议室途中突然晕倒，

意识不清。如果有3人在现场，其最佳分工是)

- A、1人拨打“120”电话，第2人按压人中，第3人高声呼喊患者
- B、1人判断患者心搏骤停，第2人拨打“120”电话，第3人立即进行胸外按压
- C、1人拨打“120”电话，第2人判断患者意识，第3人置患者于舒适体位
- D、1人拨打“120”电话，第2人判断患者意识，第3人给患者人工

呼吸

E、1 人呼喊患者、判断呼吸和脉搏，第 2 人拨打“120”电话，第 3 人呼救

【答案】： B

- 53、补充液体
B、治疗原发病
C、改善通气
D、使用激素
E、提高吸氧浓度

【答案】： C

- 54、左下 LL 导连位于哪个位置?0
A、左锁骨中线与脐水平交汇处
B、左锁骨中线剑突水平处
C、胸骨左缘第四肋间
D、胸骨左缘锁骨中线第一肋间

【答案】： B

- 55、风湿性心瓣膜病最易累及的是 0
A、二尖瓣
B、主动脉瓣
C、三尖瓣
D、二尖瓣+三尖瓣
E、主动脉+肺动脉瓣

【答案】： A

- 56、下列哪项不是高危药品 0
A、10%氯化钾
B、10%葡萄糖酸钙
C、胰岛素
D、肾上腺素

【答案】： B

57、无脉性心脏停跳息者两次心跳检查之间应 0

- A、先给予约 5 组(或者约 2 分钟)心肺复苏
- B、行 12 导心电图检查
- C、建立深静脉通道
- D、准备电除颤
- E、持续胸外心脏按压

【答案】： A

58、抢救溺水病人的第一步是 0

- A、倒出呼吸道内及胃内的积水
- B、立即进行口对口人工呼吸
- C、胸外心脏
- D、迅速清除口鼻内泥沙污泥
- E、应用抗生素预防感染

【答案】： D

59、胸部多根多处肋骨骨折的治疗要点 0

- A、保持呼吸道通畅
- B、鼓励患者咳嗽排痰
- C、卧床休息
- D、给精神安慰
- E、制止胸壁的浮动，纠正呼吸障碍预防外伤性湿肺发生

【答案】： E

60、地震被埋时如果一时不能脱险，应如何自救?0

- A、设法将手脚挣脱出来，推开压在身上的物体，使呼吸通畅
- B、不管是否受伤，都要用力向外抽拉身体
- C、使用明火求救
- D、搬开身边杂物，扩大活动空间

【答案】： A

61、严重创伤性休克后，首先应预防的是 0

- A、感染
- B、输血并发症
- C、急性心力衰竭
- D、肠麻痹
- E、急性呼吸窘迫综合征

【答案】： A

62、室颤患者，单相波电除颤时选择的能量为 0

- A、340J
- B、350J
- C、200J
- D、36J

【答案】： D

63、应该首先急救的损伤是 0

- A、包膜下脾破裂
- B、开放性气胸
- C、脑震荡
- D、下肢开放性骨折
- E、单根双处肋骨骨折

【答案】： B

64、关于急性应激障碍的陈述，正确的是 0

- A、一般在刺激后 1 天内发病
- B、以急剧、严重的精神打击为直接原因
- C、表现平静
- D、应激消除者症状历时 20 天左右
- E、通常 6 个月内症状缓解

【答案】： B

65、气管插管留置的时间一般最多为 ()h

- A、48

B、12

C、72

D、24

【答案】： C

66、医护人员到达现场，可用哪几种颜色对伤员进行分类 0

- A、白、黄、绿、黑
- B、红、黄、绿、黑
- C、红、黄、蓝、黑
- D、红、白、绿、黑

【答案】： B

67、下列哪一项是多发伤的临床特点)

- A、创伤后全身反应较轻，死亡率不高
- B、较少发生休克
- C、低氧血症发生率高
- D、多发伤等同于多处伤
- E、不易发生漏诊和误诊

【答案】： C

68、地震发生现场，某患者出现大量肠管脱出，此时首先要做的是 0

- A、进行保护性包扎
- B、把肠管回纳腹腔
- C、暂时不予处理
- D、马上紧急处理
- E、给予止痛药

【答案】： A

69、下列不属于院前急救原则的是 0

- A、先施救后排险
- B、先重伤后轻伤
- C、先固定后搬运
- D、急救与呼救并重

【答案】： A

70、作为一名跳楼致高处坠落伤患者的现场目击者，以下哪种做法是最正确及时的？()

- A、立刻拨打 120 急救电话，等待救援人员的到来
- B、立刻离开现场，以免惹祸上身
- C、立刻给患者行心电图，宣布患者死亡
- D、围观患者，议论纷纷，摇头叹息
- E、迅速判断患者意识和伤情，呼吁现场群众协助救治，同时拨打急救电话呼叫急救措施，必要时立刻进行 CPR 或止血、固定等处理

【答案】： E

71、患者心脏骤停，开始抢救时间为心脏骤停 4-6 分钟进行，心肺复苏成功率是多少。()

- A、60%
- B、10%
- C、4%
- D、50%

【答案】： B

72、糖尿病酮症酸中毒的表现错误的是 0

- A、酮体生成过多
- B、水肿
- C、治疗前，血钾偏高或正常
- D、携氧功能障碍

【答案】： B

73、以下影像学检查结果需报告危急值，除外的是 0

- A、自发性气胸
- B、外伤性膈疝
- C、纵隔摆动

D、宫外孕破裂大出血

E、大量心包积液合并心包填塞

【答案】： A

74、急性镇静安眠药中毒时，可选用)药物促进苏醒，同时还有拮抗呼吸抑制作用。

()

- A、美蓝
- B、VK1
- C、解碘定
- D、阿托品
- E、纳络酮

【答案】： E

75、以下均属于致命性心律失常，除外的是 0

- A、心室扑动
- B、室性心动过速
- C、心室颤动
- D、心房颤动
- E、心室率小于 45 次/分的心动过缓

【答案】： D

76、张力性气胸紧急处理是 0

- A、行胸膜腔闭式引流术
- B、开胸缝合气管裂伤
- C、用大号针头在锁骨中线第 2~第 3 肋间胸穿放气
- D、给氧 E. 做人工呼吸

【答案】： C

77、心律失常中最严重的是 0

- A、室上性心动过速
- B、心房颤动
- C、心室颤动
- D、一度房室传导阻滞
- E、室性心动过速

【答案】： C

78、高渗昏迷患者输液 4h 应输入总量的()

A、1/3

B、1/2

C、2/3

D、1/4

E、3/4

【答案】： A

79、急性颅内压增高病人典型的生命体征表现是 0

A、脉快，呼吸急促

B、脉快，血压降低

C、脉快，血压高

D、脉慢，呼吸慢

E、脉慢，血压低

【答案】： D

80、艾滋病的主要传播途径是 0

A、饮食传播

B、母婴传播

C、蚊虫叮咬

D、血液传播

E、性接触传播

【答案】： E

81、患者，男，50岁。某日在烈日下劳动4小时后感到头昏乏力，随后昏倒在地，神志不清，急送医院，头颅CT

检查未见异常。查体：体温 41℃，心率 135 次/分，律齐，血压 90/60mmHg，深昏迷，双下肢阵发性抽搐，大、小便失禁。该患者属于中暑的哪一类型（）

- A、热射病
- B、热痉挛
- C、热衰竭
- D、先兆中暑
- E、轻度中暑

【答案】： A

82、胸膜腔穿刺抽出不凝血常因为（）

- A、肋骨骨折
- B、张力性气胸
- C、心脏损伤
- D、开放性气胸
- E、血胸

【答案】： E

83、患者，男性，70 岁，突发急性广泛心肌梗死，经治疗疼痛有所好转，继而出现呼吸困难、咳嗽、发绀、咳大量粉红色泡沫痰，其咳嗽病因是（）

- A、急性肺淤血
- B、急性肺不张
- C、急性肺水肿
- D、急性肺炎
- E、急性胸膜炎

【答案】： C

84、血红蛋白低于或等于？时，应嘱患者卧床休息，活动时动作要缓慢，避免突然体位改变（）

- A、 30g/L
- B、 40g/L
- C、 60g/L
- D、 80g/L
- E、 100g/L

【答案】： C

85、患者女性，43岁。中午饱餐后出现上腹部绞痛，同时向腰背部呈带状放射，已持续6小时。怀疑为急性胰腺炎，此时最具诊断意义的实验室检查为0

- A、白细胞计数
- B、血清淀粉酶测定
- C、尿液淀粉酶测定
- D、血清脂肪酶测定
- E、血清谷丙转氨酶

【答案】： B

86、患者男性，46岁。诊断为“上消化道出血”收住院，为明确出血原因，首选的检查方法是)

- A、大便隐血试验
- B、X线钡剂造影
- C、内镜检查
- D、血常规检查
- E、B超检查

【答案】： C

87、用氧安全的重点是做好“四防”，其内容不包括0

- A、防震
- B、防火
- C、防热
- D、防油
- E、防移动

【答案】： E

88、最简单、有效的临时止血方法为 0

- A、加压包扎止血法
- B、指压止血法
- C、屈肢加垫止血法
- D、填塞止血法

【答案】： A

89、下列哪项是多发伤初级评估的目的 0

- A、明确诊断
- B、判定处理伤员的优先次序
- C、确认是否需要手术
- D、明确收治的科室
- E、决定后续的治疗方案及优先次序

【答案】： B

90、急性敌百虫中毒禁用 0 溶液洗胃。 0

- A、清水、生理盐水
- B、1:5000 高锰酸钾溶液
- C、2%重曹溶液
- D、牛奶、蛋清水
- E、活性炭

【答案】： C

91、心绞痛发作的主要原因 0

- A、主动脉狭窄
- B、主动脉关闭不全
- C、全身小动脉痉挛
- D、冠状动脉狭窄或畸形
- E、肺动脉痉挛

【答案】： D

92、患者，男性，23岁，踝关节扭伤6小时，局部肿胀、疼痛明显，需进行冷敷，其目的是()

- A、促进末梢循环
- B、促进炎症的消散
- C、促进炎症的局限
- D、减轻局部出血、疼痛
- E、使血管扩张，减轻深部组织充血

【答案】： D

93、患者，男性，52岁。因车祸致胸腹联合伤，左侧多发性肋骨骨折(连枷)伴大量血气胸；脾破裂伴腹腔内出血。神志清，BP75/46mmHg R38次/分，心率126次/分，

律齐，医护人员到达现场后首先要对患者进行哪一项伤情评估()

- A、意识状态
- B、气道和呼吸情况
- C、进行化验检查
- D、循环情况
- E、仔细的胸部检查

【答案】： B

94、在车祸伤现场，作为奔向伤员的现场急救人员，应如何正确向伤员喊话?

- A、大声呼喊伤员的名字，确定其是否能活动和反应
- B、大声喊出自己是来营救的急救人员，让伤员放心
- C、大声普告伤员不可随意活动，等待急救的处理
- D、大声报出自己名字，让伤员放心
- E、不向伤员喊话，该处理什么就做什么措施

【答案】： C

95、心肺复苏指南中胸外按压的部位为是()

- A、双乳头之间胸骨正中部

- B、心尖部
- C、胸骨中段
- D、胸骨左缘第五肋间
- E、胸骨上部

【答案】： A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/577145063016006121>