

2022年（中级）护理资格习题 150 道题(试题+答案)

考试时间：90 分钟

命题人：护士资格考试教研组

1、某再生障碍性贫血病人，出现高热，伴抽搐，此时，最适宜的降温措施是()

- A 、温水擦浴
- B 、酒精擦浴
- C 、冰水灌肠
- D 、口服退热剂
- E 、头部及大血管处放置冰袋

2、抢救病人中护士进展的工作以下哪项不正确()

- A 、口头医嘱复诵后再执行
- B 、用完的空安瓿应及时处理
- C 、抢救后应及时请医生补写医嘱
- D 、抢救记录字迹清晰及时准确
- E 、医生未到时可先建立静脉通道

3、新生儿可从母体获得，但 3-5 个月后逐渐消失的抗体是()

- A 、免疫细胞
- B 、补体
- C 、IgG
- D 、IgM
- E 、IgA

4、由血行感染而引起的急性肾盂肾炎，最常见的致病菌是()

- A 、大肠杆菌
- B 、变形杆菌
- C 、葡萄球菌
- D 、产碱杆菌
- E 、粪链球菌

5、癫痫持续状态首选的药物是()

- A 、卡马西平

- B 、 乙琥胺
- C 、 苯巴比妥
- D 、 地西洋
- E 、 扑米酮

6、患者，女，30岁，突发心跳骤停，当时只有一名护士在场进行抢救，此时人工呼吸和心脏按压正确的比例是()

- A 、 1次人工呼吸，5次心脏按压
- B 、 1次人工呼吸，15次心脏按压
- C 、 1次人工呼吸，30次心脏按压
- D 、 2次人工呼吸，15次心脏按压
- E 、 2次人工呼吸，30次心脏按压

7、原发性高血压危险度分层的主要依据是()

- A 、 血脂水平
- B 、 病程长短
- C 、 症状轻重
- D 、 降压效果
- E 、 靶器官受损情况

8、一个七十八岁的男子近日来他出门找不到家的地方，把衣服当裤子穿，把裤子当衣服穿，丢三落四，老忘记当前发生的事情，请问该患者是什么病()

- A 、 精神分裂症
- B 、 抑郁症
- C 、 阿尔兹海默症
- D 、 恐惧症
- E 、 遗忘症

9、张某，14岁，中毒性肺炎，休克，经抢救病情稳定，为维持血压，医嘱10%葡萄糖400ml加多巴胺20mg 20滴/min，请计算液体可维持多长时间(每ml按15滴计算)()

- A 、 2小时
- B 、 3小时
- C 、 4小时
- D 、 5小时

E、6小时

10、正确测量胃管插入长度的方法是()

- A、从鼻尖至剑突
- B、从眉心至剑突
- C、从眉心至胸骨柄
- D、从前发际至剑突
- E、从前发际至胸骨柄

11、患者，女性，42岁。诊断为“甲型肝炎”。对她所用的票证和钱币进行消毒，合适的方法是()

- A、过氧乙酸擦拭
- B、压力蒸汽灭菌
- C、过滤除菌
- D、微波消毒
- E、液氯喷洒

12、当个体发生疾病时采取的第三线防卫是()

- A、正确对待问题
- B、正确对待情感
- C、朋友寻求帮助
- D、减少压力的生理性影响
- E、求医护人员的帮助

13、患者女性，45岁，因高血压入院，护士收集到以下资料，属于患者客观资料的内容是()

- A、咽喉部充血
- B、头晕头痛
- C、不想吃饭
- D、感到恶心
- E、全身无力

14、原发性肾病综合征的最主要病理生理改变是()

- A、高胆固醇血症

- B、低蛋白血症
- C、全身性水肿
- D、大量蛋白尿
- E、高血压

15、患者，女，30岁，G2P2 孕30周，合并心脏病，心功能I级，护士给予健康指导不正确的是()

- A、充分休息
- B、保持大便通畅
- C、防止呼吸道感染
- D、酌情增加产前、内科检查
- E、如有产兆即住院终止妊娠

16、属于糖尿病微血管病变的是()

- A、脑血管意外
- B、冠心病
- C、糖尿病肾病
- D、肾动脉狭窄
- E、下肢坏疽

17、男性，63岁。良性前列腺增生术后返回病房，将尿道内气囊导尿管()

- A、拔除
- B、定时4小时开放一次
- C、定时6小时开放一次
- D、接密闭式冲洗装置
- E、接无菌瓶

18、产妇，27岁。阴道分娩后30小时，诉下腹部阵发性疼痛，助产士解释是产后宫缩痛，可自然消失，消失时间约需要()

- A、1~2天
- B、2~3天
- C、3~4天
- D、4~5天
- E、5~6天

19、患者，女，28岁，停经7个月。给予孕激素试验无撤药性出血，再行2次雌-孕激素序贯试验均无撤药性出血，其闭经原因在()

- A、卵巢
- B、子宫
- C、垂体
- D、下丘脑
- E、肾上腺

20、男，30岁，因车祸引起右胸部损伤，极度呼吸困难，紫绀，肺呼吸音消失，并有严重的皮下气肿，判断为张力性气胸，急救应立即()

- A、吸氧
- B、快速静脉输液
- C、输血
- D、气管切开
- E、胸腔穿刺排气

21、以下哪项不是促进病人休息的护理措施()

- A、做好心理护理，解除病人焦虑
- B、尊重病人休息习惯
- C、各种诊疗护理活动相对集中
- D、满足病人一切要求
- E、协助病人自我放松

22、患者女，20岁，重症肝炎。护士应该指导患者摄入:()

- A、无盐饮食
- B、少渣饮食
- C、低脂肪饮食
- D、高蛋白饮食
- E、高膳食纤维饮食

23、患者，女，35岁，误服农药，但药名及剂量不详，神志不清送医院急救，立即予生理盐水洗胃，每次灌入550ml，连续10次，认为该处理不当的理由是()

- A、灌入总量太少，洗胃不彻底。
- B、灌入总量太多，导致胃黏膜水肿
- C、每次灌入量太少，排毒不够

- D、每次灌入量太多，加速毒物进入肠内吸收
- E、毒物种类不明，不该洗胃

24、引起学龄期儿童心力衰竭的常见原因是()

- A、中毒性心肌炎
- B、病毒性心肌炎
- C、风湿性心脏病
- D、心律失常
- E、心包炎

25、下列有关饮食护理的说法，错误的是()

- A、对禁食或限制饮食的病人，应讲解原因，取得配合
- B、为病人创造清洁、整齐、安静、空气清新、舒适的就餐环境
- C、帮助病人纠正错误的饮食习惯和饮食行为
- D、对食管胃底静脉曲张病人插胃管提供胃肠内营养
- E、按医嘱确定饮食种类，向病人指导可选择的食物和不可选择的食物

26、王女士因行剖宫产需进行术前准备。护士准备给她插入导尿管，但患者不同意，此时护士应()

- A、耐心解释，讲清导尿的重要性，并用屏风遮挡
- B、请示护士长改用其他办法
- C、让患者自行排尿，解除膀胱压力
- D、请家属协助劝说
- E、报告医生择期手术

27、患者男，45岁。因冠心病住院治疗，住院期间突然发生室颤，责任护士立即赶到床边，确认患者心脏骤停后立即电除颤，患者意识未恢复，此时抢救的首选药物是()

- A、利多卡因
- B、卡拉明
- C、阿托品
- D、碳酸氢钠
- E、肾上腺素

28、酮症酸中毒患者经治疗后，意识恢复时间内突然感到心悸、饥饿、出汗，随即又意识不清，应立即()

- A、加大胰岛素剂量
- B、加用优降糖
- C、静脉滴注碳酸氢钠
- D、静脉注射 50%葡萄糖
- E、应用呼吸兴奋剂

29、新生儿颅内出血典型病症是()

- A、呼吸困难不能吸吮
- B、先表现兴奋后出现抑制
- C、全身硬肿
- D、体温不升
- E、拒乳

30、分泌胰岛素的细胞是()

- A、A 细胞
- B、B 细胞
- C、D 细胞
- D、G 细胞
- E、K 细胞

31、属于甲类传染病的是()

- A、疟疾
- B、炭疽
- C、艾滋病
- D、黑热病
- E、鼠疫

32、下列有关体温的描述正确的选项是()

- A、长时间从事夜间工作者，在 24h 内其体温一般在下午 2-8 点最高
- B、老年人体温有下降趋势，高龄者体温会更低
- C、女性在月经前期，体温轻度降低
- D、婴幼儿体温较稳定

E、女性体温较男性体温稍高

33、张女士，30岁，高热，腹泻，诊断为细菌性痢疾，应对其实施()

- A、严密隔离
- B、消化道隔离
- C、昆虫隔离
- D、接触隔离
- E、保护性隔离

34、关于鼻饲的操作方法，错误的是()

- A、每次鼻饲量不超过200ml
- B、每次灌注前应检查胃管是否通畅
- C、每次鼻饲前注入少量温开水，证实胃管是否在胃内
- D、药品研碎溶解后灌入
- E、拔管应夹紧胃管末端快速拔出

35、患者70岁，咳嗽咳痰，痰液黏稠不易咳出，下列措施错误的是()

- A、给予化痰药
- B、多饮水
- C、拍背
- D、雾化吸入
- E、体位引流

36、冠状动脉粥样硬化最常累及的动脉分支是()

- A、后室间支
- B、右冠状动脉旋支
- C、右冠状动脉主干
- D、左冠状动脉主干
- E、左冠状动脉前降支

37、患者，女，32岁，葡萄胎清宫术后，责任护士向其进行健康宣教，指出随访期间必须严格避孕，最好的避孕方法是()

- A、避孕药
- B、安全期

- C、绝育手术
- D、宫内节育器
- E、避孕套或避孕隔膜

38、患者，男性，因服毒而昏迷不醒，被送入急诊室抢救，了解到患者服用大量安眠药，此时护士应选用哪种洗胃液()

- A、生理盐水
- B、2%~4%碳酸氢钠溶液
- C、牛奶
- D、1:5000高锰酸钾溶液
- E、蛋清水

39、乙型病毒性肝炎最主要的传播途径是()

- A、粪一口传播
- B、血行传播
- C、母婴传播
- D、呼吸道传播
- E、蚊虫叮咬

40、胸骨上窝，锁骨上窝，肋间隙，有凹陷，问该病人是什么样的呼吸形态()

- A、吸气性呼吸困难
- B、劳力性呼吸困难
- C、呼气性呼吸困难
- D、呼吸衰竭
- E、心力衰竭

41、病区良好的社会环境不包括()

- A、建立良好的护患关系
- B、病室环境清洁，整齐
- C、老病人对新病人的关心
- D、保护病人的隐私权
- E、家属对病人的关心

- 、外科感染的特点()
- A 、外科感染的大多数为特异性感染
 - B 、多数为单一细菌所致
 - C 、感染容易扩散至全身
 - D 、大部分感染有明显而突出的局部症状和体征
 - E 、感染多由一些特殊的病菌、真菌引起
- 43、与慢性肾衰竭临床表现有关的原因是()
- A 、血糖过多
 - B 、代谢产物潴留
 - C 、脂肪过多
 - D 、血清锌过多
 - E 、血清铁过多
- 44、对到门诊就诊的患者首先应采取的措施是()
- A 、 挂号
 - B 、 预检分诊
 - C 、 测量生命体征
 - D 、 安排候诊
 - E 、 健康教育
- 45、形成肾炎性水肿的主要原因是()
- A 、蛋白质合成障碍
 - B 、低蛋白血症
 - C 、高脂血症
 - D 、循环血容量不足
 - E 、肾小球滤过率降低
- 46、下列导致十二指肠溃疡胃酸分泌异常的因素中哪项不正确()
- A 、壁细胞对胃泌素特别敏感
 - B 、胃酸反馈性抑制机制失灵
 - C 、对进餐刺激后的胃酸分泌在溃疡活动期增强
 - D 、晚间胃酸分泌明显增多
 - E 、胃排空减慢

- 、下列选项中不属于约束带应观察的项目是()
- A 、衬垫是否垫好
 - B 、约束带是否牢靠
 - C 、体位是否舒适
 - D 、局部皮肤颜色及温度
 - E 、神智是否清楚
- 48、系统性红斑狼疮主要损害的脏器是()
- A 、心
 - B 、肝
 - C 、肾
 - D 、肺
 - E 、脾
- 49、有关冠心病发病的血脂变化，错误的是()
- A 、总胆固醇增高
 - B 、三酰甘油增高
 - C 、低密度脂蛋白增高
 - D 、高密度脂蛋白增高
 - E 、高密度脂蛋白降低
- 50、某病人食用带皮的水果半小时后出现恶心、呕吐、腹痛等中毒病症。你考虑以下何种农药引起中毒的可能性最小()
- A 、敌敌畏
 - B 、内吸磷
 - C 、对硫磷
 - D 、乐果
 - E 、甲拌磷
- 51、吴女士，30岁，于23:00顺利分娩一女婴，至次晨7:00未排尿，主诉下腹胀痛难忍，查体发现膀胱高度膨胀。对该产妇的护理以下哪项不妥()
- A 、立即施行导尿术
 - B 、协助其坐起排尿
 - C 、用温水冲会阴
 - D 、用手轻轻按摩下腹部

、让其听流水声

52、脉搏短绌的特点是()

- A、脉率大心率
- B、脉率少于心率
- C、脉率等于心率
- D、脉率少于60次/分
- E、脉率大于100次/分

53、对脉短绌的病人，测量心率、脉率的正确方法是()

- A、先测心率，后测脉率
- B、先测脉率，后测心率
- C、一人测心率，另一人测脉率，同时测1min
- D、一人测心率、脉率，另一人报告医师
- E、一人发口令，另一人测心率、脉率

54、某产妇，28岁，G1P1，孕40周，临产后，持续性枕后位予阴道助产分娩一男婴，产后第4天发生漏尿，在给予产妇宣教时告知手术修补最佳时间为()

- A、1~2周
- B、1~2个月
- C、3~6个月
- D、8~12个月
- E、1年以后

55、尿液呈烂苹果味见于()

- A、肝昏迷
- B、泌尿道感染
- C、阻塞性胆管炎
- D、有机磷农药中毒
- E、糖尿病酮症酸中毒

56、属右向左分流型的先天性心脏病是()

- A、房间隔缺损
- B、室间隔缺损

- 、动脉导管未闭
- D 、法洛四联症
- E 、肺动脉狭窄

57、下列不属于热力消毒灭菌法的是()

- A 、压力蒸汽灭菌法
- B 、燃烧法
- C 、煮沸法
- D 、紫外线灯管消毒法
- E 、干烤法

58、对类风湿性关节炎有诊断价值的 X线检查是()

- A 、 手指和肩关节
- B 、 腕关节和肩关节
- C 、 手指和腕关节
- D 、 肘关节和膝关节
- E 、 肩关节和肘关节

59、关于出入液量的记录内容，下列描述正确的是()

- A 、 每日摄入量主要记录饮水量
- B 、 固体食物只记录单位个数
- C 、 病人饮水容器固定，并测定容量
- D 、 每日排出量要记录粪便置尿量
- E 、 伤口渗出液需观察不记录

60、重度二尖瓣狭窄是指二尖瓣瓣口面积()

- A 、 小于 1cm²
- B 、 1~1.5cm²
- C 、 1.5~2cm²
- D 、 2~2.5cm²
- E 、 2.5~4cm²

61、长期饮酒致肝硬化的机制是()

- A 、 引起肝门静脉扩张

- 、直接损伤肝细胞
- C、减少蛋白吸收
- D、收缩肝内血管
- E、阻碍胆汁流动

62、在我国引起慢性肾功能衰竭的最常见疾病是()

- A、慢性肾盂肾炎
- B、慢性肾小球肾炎
- C、狼疮性肾炎
- D、肾小动脉硬化症
- E、糖尿病肾病

63、张先生，男，32岁，因患急性黄疸性肝炎住院，此时进行的护理措施不妥当的是()

- A、接触病人应穿隔离衣
- B、病人的排泄物直接倒入马桶中冲洗
- C、护理病人前后均应洗手
- D、给予低脂肪食物
- E、病人剩余的饭菜可用漂白粉混合搅拌后倒掉

64、护士在候诊室巡视时，发现一年轻女患者精神不振，询问后患者诉肝区隐痛，疲乏，食欲差，双眼巩膜黄染。检查：尿三胆(++)。护士应()

- A、转急诊室诊治
- B、安排提前就诊
- C、将患者转隔离门诊
- D、给患者测量生命体征
- E、安慰患者，不蛰着急焦虑

65、王女士因行剖宫产需进行术前准备。护士准备给其插入导尿管，但患者不同意，此时护士应()

- A、耐心解释，讲清导尿的重要性，并用屏风遮挡
- B、请示护士长改用其他办法
- C、让患者自行排尿，解除膀胱压力
- D、请家属协助劝说

、 报告医生择期手术

66、某孕妇，第1胎，妊娠39周来院检查，医生告之临产先兆，收住院，最可靠的依据是()

- A、多发生于青春期或围绝经期
- B、经期长短不一
- C、纤毛运动较差
- D、分泌型IgA低下
- E、IgG低下

67、患者男，36岁，因食物中毒导致腹泻，每日大便10次，护士应指导患者摄入:()

- A、高膳食纤维饮食
- B、高热量饮食
- C、低盐饮食
- D、低蛋白饮食
- E、少渣饮食

68、男，78岁，因肺炎住院，据医嘱给予抗生素静脉输入，每分钟输入40滴，该患者每小时输入的液体量为()

- A、130ml
- B、140ml
- C、150ml
- D、160ml
- E、170ml

69、膀胱内充满尿液，其压力增高，迫使少量尿液自尿道口溢出，称为()

- A、真性尿失禁
- B、尿潴留
- C、尿痿
- D、充盈性尿失禁
- E、尿频

70、护士收集安康资料的目的中，错误的选项是()

- A、为了解病人的隐私，确立护理诊断提供依据

- B、为寻找病因，制定护理措施提供依据
- C、为了解病情变化，制定治疗方案提供依据
- D、为了解病人的心理特征，选择护理实施方法提供依据
- E、为了解治疗反响，评估护理行为提供依据

71、1500ml的液体从早上8点半开始输，调节滴数约为75滴/分，其输完的时间为()

- A、12点30分
- B、下午1点
- C、下午1点30分
- D、下午2点
- E、下午3点

72、乙型病毒性肝炎最主要的传播途径是()

- A、粪一口传播
- B、血行传播
- C、母婴传播
- D、呼吸道传播
- E、蚊虫叮咬

73、关于宫颈癌错误的说法是()

- A、好发于宫颈外口鳞柱状上皮交界处
- B、与早婚早育多产宫颈糜烂有关
- C、多为鳞状癌
- D、要求至少要2年1次防癌普查
- E、手术治疗适用于原位癌和早期浸润癌

74、患者男，50岁，患冠心病3年，护士应指导患者摄入:()

- A、低盐饮食
- B、少渣饮食
- C、低蛋白饮食
- D、高蛋白饮食
- E、低胆固醇饮食

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/578014010043006127>