中级卫生专业资格内科护理主管护师（中级） 2025 年(125)

(总分 149.01,考试时间 120 分钟)

A1/A2 题型

1. 多大小儿基本上能自己脱、穿简单衣服

A. 2 岁

B. 2.5 岁

C. 3 岁

D. 1.5 岁

E. 4 岁

2. 小儿能区别好闻和难闻气味的月份是

A. 1～2 个月

B. 2～3 个月

C. 3～4 个月

D. 4～5 个月

E. 5～6 个月

3. 1 岁小儿体重约为出生体重的

A. 1 倍

B. 2 倍

C. 3 倍

D. 4 倍

E. 2.5 倍

4. 下列哪一点不是小儿生长发育的一般规律：

A. 由上到下

B. 由远到近

C. 由粗到细

D. 由简单到复杂

E. 由低级到高级

5. 婴儿对食物味道非常敏感，适宜添加辅食的时期是

A. 1～2 个月

B. 2～3 个月

C. 3～4 个月

D. 4～5 个月

E. 5～6 个月

6. 脊柱出现胸椎后凸的时间是

英雄者，胸怀大志，腹有良策，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志者也。——《三国演义》

A. 出生时
B. 3 个月
C. 6 个月
D. 9 个月
E. 12 个月
7. 新生儿寒冷损伤综合征的病因不包括
A. 新生儿体温调节中枢不成熟
B. 体表面积大
C. 棕色脂肪储存不足
D. 新生儿皮下脂肪以不饱和脂肪酸含量多
E. 血管丰富，易散热
8. 非感染性病理性黄疸中最常见的病因是
A. 药物性黄疸
B. 新生儿溶血病
C. 先天性胆道闭锁
D. 胎粪延迟排出
E. 母乳性黄疸
9. 新生儿缺血缺氧性脑病最主要的病因是
A. 肺部疾患
B. 围生期窒息
C. 心脏疾患
D. 严重失血
E. 贫血
10. 关于新生儿呼吸系统说法错误的是
A. 呼吸延迟容易出现湿肺
B. 新生儿胸廓小
C. 主要靠膈肌运动
D. 呼吸呈胸式呼吸
E. 胸廓运动较小
11. 极低出生体重儿是指
A. 出生 1 小时内体重不足 500g
B. 出生 1 小时内体重不足 800g
C. 出生 1 小时内体重不足 1250g
D. 出生 1 小时内体重不足 1500g
E. 出生 1 小时内体重不足 2000g
12. 新生儿体温调节功能差，体温的维持主要依靠
A. 适宜的环境温度
B. 棕色脂肪的产热作用
C. 足够的母乳摄入
D. 自发的肢体活动
E. 汗腺发育差，散热少
13. 正常体重儿是指出生体重
A. 2500g≤出生体重≤4000g
B. 2500g 小于出生体重≤4000g

C. 2500g≤出生体重小于 4000g
D. 2500g 小于出生体重≤4500g
E. 2500g≤出生体重≤4500g
14. 营养不良早期诊断最敏感的指标是
A. 前白蛋白
B. 视黄醇结合蛋白
C. 转铁蛋白
D. IGF-1
E. 甲状腺素结合前白蛋白
15. 小儿营养不良的血清学检查的特征性改变是
A. 血清酶活性升高
B. 血浆胆固醇升高
C. 生长激素分泌减少
D. 血糖降低
E. 血清白蛋白浓度降低
16. 下列关于先天性巨结肠的说法正确的是
A. 男性显著高于女性
B. 女性显著高于男性
C. 男女发病率相当
D. 主要因后天的环境影响有关
E. 以上说法均错误
17. 下列说法中符合人乳喂养儿粪便形状的是
A. 颜色呈黄绿色
B. 较稠
C. 均匀糊状，不臭
D. 量多，较臭
E. 多成形
18. 小儿腹泻不容易导致的水电解质紊乱是
A. 代谢性酸中毒
B. 高钾血症
C. 低镁血症
D. 低钙血症
E. 脱水
19. 以下属于儿科护士素质要求的是
A. 思想道德素质
B. 科学文化素质
C. 专业素质
D. 身体、心理素质
E. 以上都是
20. 几岁小儿能握杯喝水
A. 6 个月
B. 8 个月
C. 10 个月
D. 12 个月

E. 24 个月

21. 婴儿的神经反射，下列哪项不正常

A. 觅食反射阳性

B. 拥抱反射阴性

C. 握持反射阳性

D. 巴彬斯基征阳性

E. 腹壁反射阴性

22. 下列哪项是体格生长的总规律

A. 由近到远

B. 各系统器官发育不平衡

C. 正反规律

D. 头尾规律

E. 由简单到复杂

23. 1 岁小儿的头围是

A. 34cm

B. 44cm

C. 46cm

D. 48cm

E. 50cm

24. 胸围可以反映

A. 胸廓的发育程度

B. 骨骼的发育程度

C. 脊柱的发育程度

D. 膈肌的发育程度

E. 心脏的发育程度

25. 代表体格生长、营养情况的重要指标是

A. 体重　　B. 身高

C. 头围　　D. 坐高

E. 胸围

26. 新生儿硬肿症的病因不包括

A. 寒冷

B. 早产

C. 低体重

D. 感染

E. 免疫系统不完善

27. 生理性黄疸时，血清胆红素足月儿不超过

A. 221μmol/L

B. 257μmol/L

C. 287μmol/L

D. 321μmol/L

E. 85.5μmol/L

28. 新生儿窒息的因素包括

A. 母亲年龄小于 16 岁

B. 早产儿

C. 巨大儿
D. 先天性心脏病
E. 以上说法均正确
29. 新生儿的正常呼吸频率为
A. 20～35 次/分
B. 30～35 次/分
C. 30～40 次/分
D. 35～40 次/分
E. 40～45 次/分
30. 新生儿生理性黄疸的特点，下面哪一项不符合
A. 足月新生儿生后 2 周内黄疸消退
B. 生后 2～3 天出现黄疸
C. 足月新生儿血清总胆红素不超过 221μmol/L（12.9mg/Dl）
D. 以结合胆红素为主
E. 一般情况好，不伴有其它症状
31. 早产儿胎龄是指
A. 30～37 周
B. 28～37 周
C. 35～37 周
D. 36～37 周
E. 37～42 周
32. 引起小儿锌缺乏的主要原因是
A. 需要量增加
B. 吸收障碍
C. 摄入不足
D. 丢失增多
E. 以上说法均不正确
33. 关于营养不良的病因，下列哪项错误？
A. 摄入不足
B. 消化吸收障碍
C. 需要量过多
D. 消耗量过大
E. 缺乏锻炼
34. 下列选项中符合小儿中度等渗性脱水的是
A. 失水量占体重的 6%，血清钠 155mmol/L
B. 失水量占体重的 3%，血清钠 135mmol/L
C. 失水量占体重的 7%，血清钠 120mmol/L
D. 失水量占体重的 8%，血清钠 140mmol/L
E. 失水量占体重的 11%，血清钠 140mmol/L
35. 急性坏死性小肠结肠炎确诊的主要方法是
A. B 超
B. X 线
C. 血常规
D. 粪便常规

E. 钡灌肠检查

36. 小儿肝脏在肋缘下摸不到的时间是

A. 8 岁后

B. 6 岁后

C. 3 岁后

D. 5 岁后

E. 7 岁后

37. 小儿不宜喂淀粉类食物的年龄是

A. 小于 2 个月

B. 小于 3 个月

C. 小于 7 个月

D. 小于 5 个月

E. 小于 6 个月

38. 儿科护理学的研究范围包括

A. 小儿生长发育

B. 小儿身心健康保健

C. 儿童保健

D. 疾病预防、临床疾病护理

E. 以上都是

39. 小儿可以独自走稳的年龄是

A. 10 个月

B. 12 个月

C. 15 个月

D. 18 个月

E. 20 个月

40. 第二性征全部出现是在

A. 青春前期

B. 青春早期

C. 青春中期

D. 青春后期

E. 青春晚期

41. 小儿先会画直线，进而能画圈，画人遵循的发育顺序是

A. 由上到下的顺序

B. 由近到远的顺序

C. 由粗到细的顺序

D. 由低级到高级的顺序

E. 由简单到复杂的顺序

42. 小儿乳牙出齐的最晚年龄为

A. 1～1.5 岁

B. 1.5～2 岁

C. 2.5 岁

D. 4～6 个月

E. 7～12 个月

43. 新生儿的视觉清晰范围为

A. 5～10cm
B. 10～15cm
C. 15～20cm
D. 20～30cm
E. 30～60cm
44. 5 个月小儿，出生体重为 4kg，预计其体重应为
A. 5.5kg
B. 6.5kg
C. 7.5kg
D. 8.5kg
E. 9.5kg
45. 新生儿宫内感染肺炎最常见的病毒是
A. 巨细胞病毒
B. 呼吸道合胞病毒
C. 腺病毒
D. 流感病毒
E. 肠道病毒
46. 下列关于新生儿颅内出血的辅助检查说法正确的是
A. 蛋白含量明显增高
B. 脑脊液糖定量增高
C. 首选 X 线
D. 网织红细胞增高
E. 蛋白含量减低
47. 新生儿窒息孕母因素中不包括下列哪项
A. 母亲高血压
B. 母亲糖尿病
C. 母亲吸毒
D. 前置胎盘
E. 母亲年龄 32 岁
48. 超低出生体重儿是指出生体重
A. 小于 2500g
B. 小于 2000g
C. 小于 1500g
D. 小于 1000g
E. 小于 800g
49. 关于新生儿常见的几种生理状态，哪项是错误的
A. 生理性黄疸
B. 乳腺肿大
C. 马牙
D. 红臀
E. 假月经
50. 胎儿肺表面活性物质大量产生的时间为
A. 胎龄 16 周
B. 胎龄 20 周

C. 胎龄 26 周
D. 胎龄 32 周
E. 胎龄 36 周
51. 长期食入下列哪种食物易导致锌缺乏症
A. 鱼肉
B. 猪肉
C. 鸡蛋
D. 牛奶
E. 玉米面
52. 重度营养不良引起水肿的主要原因是
A. 心功能不全
B. 肾功能不全
C. 低蛋白血症
D. 低钠血症
E. 肝硬化
53. 婴儿腹泻重度脱水的主要诊断依据是
A. 皮肤弹性差
B. 哭无泪，尿量少
C. 眼眶及前囟凹陷
D. 外周循环衰竭
E. 精神萎靡
54. 下列诊断急性坏死性小肠结肠炎的方法中不正确的是
A. 大便检查红细胞
B. 外周血白细胞计数增高
C. 腹部 X 线表现为肠袢中度充气扩张
D. 必要时可做钡餐或钡灌肠
E. 粪便检查出现较多革兰阳性杆菌
55. 婴儿生理性胃食管反流症状消失的时间一般是
A. 8～10 个月
B. 6～8 个月
C. 3～4 个月
D. 5～6 个月
E. 6～7 个月
56. 小儿腹泻的发病年龄多见于
A. 7 岁以下
B. 6 岁～7 岁
C. 4 岁～5 岁
D. 2 岁以下
E. 6 月以内
57. 儿科护理学的任务是
A. 减少儿童发病率
B. 增强儿童体质
C. 降低儿童死亡率
D. 提高儿童保健和疾病防治质量

E. 以上都是

58. 新生儿俯卧位时能抬头 1～2 秒；抬头较稳的月龄大概为

A. 1 个月时

B. 2 个月时

C. 3 个月时

D. 4 个月时

E. 5 个月时

59. 青春期持续时间大约是

A. 1～2 年

B. 2～3 年

C. 3～4 年

D. 5～6 年

E. 6～7 年

60. 乳儿期是指

A. 出生后 28 天

B. 出生后半年

C. 自满 1 周岁后到 3 周岁之前

D. 出生后到满 1 周岁之前

E. 出生不满 7 日

61. 小儿能区分颜色的年龄是

A. 1 岁　　B. 3 岁

C. 5 岁　　D. 7 岁

E. 9 岁

62. 小儿前囟闭合的时间为生后

A. 4～6 周

B. 6～8 周

C. 3～4 个月

D. 4～6 个月

E. 1～1.5 岁

63. 2 岁以后至青春期前，小儿身高稳步增长，平均每年增长

A. 1～2cm

B. 2～3cm

C. 3～5cm

D. 5～7cm

E. 7～9cm

64. 新生儿出生后感染性肺炎最常见的病原体是

A. 病毒

B. 真菌

C. 支原体

D. 革兰阳性球菌

E. 革兰阴性杆菌

65. 缺血缺氧性脑病患儿选用 CT 扫描判断预后，最适合的检查时间为生后

A. 1～2 天

B. 2～3 天

C. 3～5 天
D. 5～7 天
E. 2～5 天
66. 下列哪种情况不是新生儿窒息的原因
A. 遗传因素
B. 手术产
C. 产程中药物使用麻醉剂不当
D. 早产儿
E. 胎儿先天性心脏病
67. 大于胎龄儿是指
A. 出生体重在同胎龄儿平均体重第 10 百分位以下
B. 出生体重在同胎龄儿平均体重第 10～90 百分位
C. 出生体重在同胎龄儿平均体重第 50 百分位以下
D. 出生体重在同胎龄儿平均体重第 60 百分位以下
E. 出生体重在同胎龄儿平均体重第 90 百分位以上
68. 新生儿特殊生理状态不包括
A. 生理性黄疸
B. 新生儿假月经
C. 生理性乳腺肿大
D. 生理性体重下降
E. 新生儿体温降低
69. 新生儿破伤风的感染途径是
A. 宫内　　B. 产道
C. 脐部　　D. 口腔
E. 鼻腔
70. 维生素 D 缺乏性手足搐搦症的发病机制主要是
A. 甲状腺反应迟钝
B. 甲状旁腺反应迟钝
C. 脑垂体反应迟钝
D. 肾上腺皮质反应迟钝
E. 肾上腺髓质反应迟钝
71. 维生素 D 缺乏性佝偻病的病因是
A. 维生素 D 缺乏使体内钙磷代谢失常
B. 维生素 D 缺乏使甲状腺反应异常迟钝，血钙浓度明显下降
C. 饮食中缺钙
D. 肝功能异常
E. 肾脏远曲小管功能异常
72. 下列关于小儿水的代谢特点说法不正确的是
A. 水代谢旺盛
B. 不显性失水多
C. 消化分泌吸收量小
D. 肾调节能力差
E. 年龄越小，消化液的分泌与再吸收越快
73. 急性坏死性小肠结肠炎的发病高峰季节为

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/578032005065007023