

2022 年妇产科主治医师全科综合试题及答案组卷

1、[题干]常规对女性不孕症进行卵巢功能检查不必要项目为

- A. 阴道细胞学检查
- B. 宫颈黏液涂片检查
- C. 基础体温测定
- D. 经前刮宫病理学检查。E, 腹腔镜检查

【答案】E

【解析】 卵巢功能检查 1) 基础体温(BBT) 2) 在月经周期中，连续涂抹阴道上段及宫颈阴道部的阴道上皮脱落细胞也可能推测卵巢排卵功能，角化细胞随雌激素轻、中、重度影响分别占 20%、20%~60%及 60%以上。3) 宫颈黏液 4) 子宫内膜组织学检查 5) 女性激素检查

2、[题干]下列哪项不是造成剖宫产术后子宫切口的出血原因()。

- A. 切口缝合过紧或过密
- B. 切口过低或过高
- C. 切口缝合过松
- D. 切口延裂。E, 子宫右旋明显，做切口前子宫先复位

【答案】E

3、[题干]二十七岁产妇，10 日前经阴道分娩，产后出血约 650ml. 未输血。现低热、恶露多有臭味，查子宫约妊娠 4 个月大小，有明显

压痛，双合诊触及子宫左侧 $6\text{cm} \times 7\text{cm} \times 8\text{cm}$ 有明显压痛、质软包块，界限不清。最可能的诊断应是()。

- A. 急性子宫内膜炎
- B. 急性子宫肌炎
- C. 急性盆腔结缔组织炎
- D. 急性盆腔腹膜炎。E, 弥漫性腹膜炎

【答案】 C

4、[题干]二十三岁未婚少女，因肥胖多毛及闭经，初步诊断为多囊卵巢综合征。本例最常见的临床表现是()。

- A. 相间出现月经过多与闭经
- B. 原发性闭经
- C. 继发性闭经
- D. 进行性痛经。E, 月经周期紊乱

【答案】 C

5、[题干]功血患者选用药物性刮宫方法不包括

- A. 青春期功血
- B. 生育期功血
- C. 围绝经期功血

D. 血红蛋白 $<70\text{g/L}$ 者。E, 体内有一定雌激素水平者

【答案】 D

【解析】 血红蛋白 $<70\text{g/L}$ 者，贫血，不适用于药物性刮宫。

6、[题干]患者，30 岁。孕二产一，月经过少一年，患滴虫性阴道炎，选用何种方法避孕()。

A. 宫内节育器

B. 安全期避孕

C. 阴道隔膜

D. 避孕套。E, 口服避孕药

【答案】 D

7、[题干]女性，32 岁。服用复方炔诺酮避孕，停药 7 天仍无月经来潮，应()。

A. 立即停药改用其他避孕方法

B. 于 5 天后开始服第 2 周期药物

C. 加用黄体酮

D. 立即停药检查原因。E, 于当晚开始服第 2 周期药物

【答案】 E

【解析】停药 7 天未来月经，于当晚开始服第 2 周期药物；再次无月经出现，宜停药明确原因。

8、[题干]胎儿娩出后，胎盘因素引起的出血处理不恰当的是

A. 胎盘已剥离未排出者，按压子宫协助胎盘娩出

B. 胎盘未全剥离出血多时，应行手取胎盘术

C. 胎盘或胎膜残留者，可行清宫术

D. 胎盘嵌顿时，麻醉后用手取出胎盘。E, 胎盘植入者，尽量剥离胎盘

【答案】E

【解析】胎盘植入出血切忌强行剥离，一般行手术切除子宫。

9、[题干]妊娠期及分娩期发现横位，正确处理为

A. 足月活胎，于临产前行择期剖宫产

B. 临产后胎膜已破，胎心正常，可行外倒转术

C. 忽略性横位，胎心正常，可从阴道分娩

D. 忽略性横位，胎心已消失，子宫下段有压痛，行内倒转术。E, 忽略性横位阴道分娩，早产儿均可存活

【答案】A

【解析】剖宫产指征：狭窄骨盆、软产道异常、胎儿体重>3500g、胎儿窘迫、高龄初产、有难产史、不完全臀先露等。

10、[题干]下列有关产褥感染说法正确的是()。

- A. 产褥感染是指产褥期生殖道受病原体感染
- B. 产褥病与产褥感染含义相同
- C. 产褥感染也包含泌尿系统感染
- D. 造成产褥感染的原因以产褥病为主。E, 产褥感染发病率为 6%

【答案】E

【解析】产褥感染发病率为 6%

11、[题干]月经周期调节的描述，错误的是()。

- A. 月经是子宫内膜周期性变化的临床表现
- B. 子宫内膜的周期性变化受卵巢激素的影响
- C. 卵巢周期性变化直接受垂体、下丘脑的控制
- D. 孕激素对下丘脑产生正负反馈调节。E, 雌激素对下丘脑产生正负反馈调节

【答案】D

【解析】在排卵前，低水平的孕激素可以增强雌激素对促性腺激素的正反馈作用，故是对垂体的正反馈作用。而在黄体期，孕激素对下

丘脑和垂体均有负反馈作用。故孕激素对垂体产生正负反馈调节，对下丘脑产生负反馈调节，故 D 错误。根据题意，正确答案选 D。

12、[题干]下丘脑垂体甲状腺轴对垂体分泌催乳素的影响是()。

- A. TSH 抑制催乳素分泌
- B. 甲状腺激素抑制催乳素分泌
- C. 促甲状腺激素释放激素抑制催乳素分泌
- D. TSH 刺激催乳素分泌。E, 促甲状腺激素释放激素刺激催乳素分泌

【答案】 E

【解析】 促甲状腺激素释放激素刺激催乳素分泌

13、[题干]孕期生殖道沙眼衣原体感染首选的药物为()。

- A. 红霉素
- B. 青霉素
- C. 四环素
- D. 阿奇霉素。E, 头孢菌素

【答案】 D

【解析】 孕期首选阿奇霉素治疗。

14、[题干]外阴硬化性苔藓的药物治疗不包括下列何项()。

- A. 黄体酮

B. 丙酸睾酮

C. 氯倍他索

D. 氢化可的松。E, 己烯雌酚

【答案】 E

15、[题干] IUD 放置和随访错误的是()。

A. 按宫口大小放置相应号数的 IUD

B. 无生殖器急性炎症

C. 月经干净后 3~7 天放置

D. 人工流产术后，宫腔深度不足 10cm 可立即放置。E, 放置后 1 个月、半年、一年定期随访，以后每年复查一次

【答案】 A

16、[题干] 某产妇足月顺产后 2 天，下腹部阵发性疼痛，宫底脐下 3 指，无压痛，阴道出血不多，无恶心、呕吐，无发热。下列首选处理方法是()。

A. 抗生素预防感染

B. 给予解痉、止痛药物

C. 排除肠梗阻

D. 按摩子宫。E, 一般不需处理

【答案】E

【解析】孕妇最可能为产后宫缩痛，于产后 1-2 日出现，持续 2-3 日自然消失，正确答案为 E

17、[单选]有一个子女的夫妇首选()。

- A. 宫内节育器
- B. 安全期避孕
- C. 男用避孕套
- D. 绝育术。E, 口服避孕药

【答案】A

【解析】避孕方式的选择：新婚夫妇首选避孕套，已有子女的夫妇应长期避孕，首选 IUD；多个子女采取绝育措施避孕；哺乳期和围绝经期，为避免内分泌紊乱，不宜选用载甾体激素避孕药。

18、[题干]女，29 岁，结婚 3 年未孕，月经周期 3~5/24~25 天，盆腔检查正常，连测 3 个周期基础体温呈双相型，高温相持续 10 天，本例应诊断为

- A. 正常月经
- B. 无排卵型月经
- C. 黄体功能不足
- D. 子宫内膜不规则脱落。E, 子宫内膜结核

【答案】C

【解析】患者基础体温双向，可除外无排卵型功血。盆腔检查正常，可除外子宫内膜结核。基础体温双向，高温相持续 10 天，表明较正常黄体期缩短(<11 日)，考虑黄体功能不足可能性大。因此本题选 C。黄体功能不足：月经周期中有卵泡发育及排卵，但黄体期孕激素分泌不足或黄体过早衰退，导致子宫内膜分泌反应不良。一般表现为月经周期缩短，因此月经频发。有时月经周期虽在正常范围内，但卵泡期延长、黄体期缩短(<11 日)。在育龄妇女常可表现为不易受孕或在孕早期流产。

19、[题干]妊娠合并肝炎的产科处理原则，下述哪项不当()。

- A. 产前 4 小时及产后 12 小时内不宜使用肝素治疗
- B. 妊娠大于 12 周，治疗无效考虑终止妊娠
- C. 重症肝炎临产积极治疗，均阴道分娩
- D. 分娩时积极做好输血准备。E, 产时常规使用对肝脏无损害的抗生素

【答案】C

【解析】重症肝炎积极控制 24 小时后，迅速终止妊娠，因母儿耐受力差，过度体力消耗加重肝脏负担，分娩方式以剖宫产为宜。

20、[题干]宫内节育器的避孕原理不包括()。

- A. 干扰着床

B. 影响受精卵发育

C. 改变宫腔内自然环境

D. 宫腔内炎性细胞增多。E, 反射性抑制排卵

【答案】 E

【解析】 反射性抑制排卵不是宫内节育器的避孕原理，而是甾体激素的避孕原理。

21、[题干]头盆不称孕妇试产的时间应是()。

A. 2~4 小时

B. 3~5 小时

C. 4~6 小时

D. 5~7 小时。E, 6~8 小时

【答案】 A

22、[题干]与巨大儿发病无关的因素是()。

A. 孕妇及丈夫的身材高大

B. 孕妇身体状况良好

C. 孕妇肥胖

D. 孕妇在孕期体重增加明显。E, 糖尿病

【答案】 B

【解析】巨大胎儿高危因素包括：①孕妇肥胖；②妊娠合并糖尿病，尤其是2型糖尿病；③过期妊娠；④经产妇；⑤父母身材高大；⑥高龄产妇；⑦有巨大胎儿分娩史；⑧种族、民族因素。

23、[题干]妊娠合并肝炎的产科处理原则，下述哪项不当()。

- A. 产前4小时及产后12小时内不宜使用肝素治疗
- B. 妊娠大于12周，治疗无效考虑终止妊娠
- C. 重症肝炎临产积极治疗，均阴道分娩
- D. 分娩时积极做好输血准备。E, 产时常规使用对肝脏无损害的抗生素

【答案】C

【解析】重症肝炎积极控制24小时后，迅速终止妊娠，因母儿耐受力差，过度体力消耗加重肝脏负担，分娩方式以剖宫产为宜。

24、[题干]关于子宫内膜异位症正确的是()。

- A. 大多数子宫内膜异位症病灶局限
- B. 子宫内膜异位症的患者都有痛经
- C. 妊娠时，子宫内膜异位症加重
- D. 痛经与病变的大小不成比例，而与病变的部位有关。E, 子宫内膜异位症患者易受孕但易流产

【答案】D

【解析】 内异症的痛经程度与病灶大小不一定成正比。

25、[题干] 孕妇，23 岁，因“停经 34+2 周，活动后憋喘、气促 1 天”入院。否认既往哮喘病史，昨日轻微活动后即感不适，休息后无不适，夜间可平卧，查体：T36.8℃，P95 次/分，R20 次/分，BP128/88mmHg，口唇轻度发绀，无杵状指。听诊：双肺呼吸音略粗，双肺底闻及少许湿啰音，心律规整，第二音亢进，胸骨左缘第二肋间闻及 3/6 收缩期喷射性杂音。宫高 725px，ROA，FHR;140 次/分，双下肢水肿，未触及宫缩。对该患者进行以下产科处理，正确的包括哪些

A. 限制食盐摄入量，记 24 小时出入量

B. 脐血流检测

C. 休息，避免劳累及情绪激动

D. NST 检查。E, 立即行急症剖宫产术终止妊娠 F 控制心衰 G 诱发宫缩经阴试产 H 心衰控制后行剖宫产术终止妊娠

【答案】 ACFH

【解析】 根据患者轻微活动后即感不适，休息后无不适的临床表现，心功能分级为III级，不宜经阴分娩，宜放宽剖宫产指证。控制心衰后剖宫产终止妊娠。

26、[题干] 以下哪项不是利凡诺引产的禁忌证()。

A. 有急慢性肝肾疾患者

B. 剖宫产史

C. 急性传染病治愈后

D. 未治愈的生殖器炎症。E, 术前体温 2 次均高于 37.5℃

【答案】C

27、[题干]有关妊娠合并阑尾炎哪项不正确()。

A. 妊娠不诱发阑尾炎

B. 妊娠子宫能使阑尾位置发生改变

C. 妊娠期阑尾炎易发生穿孔

D. 妊娠期阑尾炎由于增大的子宫推移，容易使炎症局限。E, 炎症波及子宫浆膜，可诱发宫缩

【答案】D

【解析】妊娠期阑尾炎由于妊娠期增大的子宫将网膜推向上腹部。在阑尾穿孔后不易包裹、局限而容易引起腹膜炎。

28、[问题]胎盘娩出后阴道多量流血，血不凝，应诊断为

A. 软产道裂伤

B. 胎盘剥离不全

C. 胎盘部分粘连

D. 凝血功能障碍。E, 子宫收缩乏力

【答案】D

【解析】凝血功能障碍：妊娠合并重症肝炎、宫内死胎滞留过久、Ⅱ度和Ⅲ度胎盘早剥、重度子痫前期和羊水栓塞等，均可影响凝血或引起弥散性血管内凝血，引起凝血障碍，子宫出血不凝及不易止血。

29、[题干]月经有关的项目正确的是

A. 初潮时多是有排卵性的月经

B. 正常月经失血量不少于 80ml

C. 月经血是凝固的，至少有小血块

D. 月经周期的长短主要取决于分泌期的长短。E, 两次月经第 1 日的间隔时间为一个月经周期

【答案】E

30、[题干]女性，30 岁，月经规律，未避孕 1 年不孕，3 年前药物流产一次，因不全流产清宫术，术后出现高热、腹痛，抗生素治疗后好转，男方精液正常，首要的检查是()。

A. 腹腔镜检查

B. 宫腔镜检查

C. 宫腔镜、腹腔镜联合检查

D. 子宫输卵管造影检查。E, 结核菌素试验

【答案】D

【解析】清宫术后盆腔感染常引起输卵管性不孕。

31、[题干]30 岁经产妇，妊娠 20 周以前经过正常，随后腹部迅速膨隆，出现腹部胀痛、呼吸困难和下肢浮肿，于妊娠 29 周来院，查宫底在剑突下 3 横指，胎位触不清，胎心听不清，隐约触到胎动。首选的辅助检查是

- A. 母血 AFP 测定
- B. B 超检查
- C. CT 检查
- D. 血糖测定。E, 羊膜腔穿刺

【答案】 B

【解析】 B 型超声检查是羊水过多的重要辅助检查方法，最大羊水暗区垂直深度超过 175px 或羊水指数>450px 为羊水过多。同时可发现胎儿畸形、双胎等。

32、[单选]关于慢性宫颈炎，下述哪项正确

- A. 宫颈糜烂是宫颈的癌前病变
- B. 宫颈糜烂是女性不孕的主要原因
- C. 宫颈息肉容易恶变，故应积极治疗
- D. 宫颈中度糜烂，细胞学正常，分泌物量多影响生活质量，可行物理治疗。E, 宫颈肥大应及时行宫颈锥形切除

【答案】 D

33、[题干]下列哪种情况下不宜行腹腔镜检查()。

- A. 生殖器官发育异常
- B. 生殖器官炎症
- C. 生殖器官肿瘤
- D. 子宫内膜异位症。E, 腹腔内有大量内出血者

【答案】E

【解析】腹腔镜检查的禁忌证包括已知的膈肌破裂及血液动力学不稳定、机械性或麻痹性肠梗阻、未纠正的凝血机制障碍、弥漫性腹膜炎、严重的心肺疾患、腹部曾动过手术致腹腔内有严重粘连者、有横膈疝、宫内妊娠等。经分析选项 E 符合题目要求。

34、[题干]卵子的发育过程哪项错误()。

- A. 颗粒细胞是由中胚叶细胞形成的
- B. 排卵前初级卵母细胞完成第一次减数分裂
- C. 卵原细胞第一次减数分裂于胎儿期开始
- D. 第二次减数分裂发生在精子进入卵母细胞之后。E, 女性在一生中大约有几百个卵泡可以发育成熟

【答案】C

35、[题干]25 岁孕妇，宫内妊娠 26 周，乏力、食欲减退 2 日来诊，拟诊“妊娠合并病毒性肝炎”，下列对诊断最有价值的是()。

- A. 血清谷丙转氨酶明显升高
- B. 血清谷草转氨酶明显升高
- C. 血清总胆红素明显升高
- D. 血清 HBsAg 阳性。E, 凝血功能明显异常

【答案】 D

【解析】 血清 HBsAg 阳性是乙型病毒性肝炎的特异性指标。

36、[题干] 侵葡的特点是

- A. 水泡样组织局限宫腔
- B. 葡萄胎未排出前不会转变为侵葡
- C. 可无葡萄胎史
- D. 不发生宫旁、肺及阴道转移。E, 葡萄胎组织侵入子宫肌层

【答案】 E

【解析】 A 是良性葡萄胎的特点。B 葡萄胎未排出前会转变为侵葡，故 B 错。C 有葡萄胎史，故 C 错 D 可发生宫旁、肺及阴道转移，故 D 错。

37、[题干] 枕先露分娩机制中，胎头在何时完成内旋转

- A. 第一产程末期
- B. 第二产程
- C. 第一产程初期

D. 第二产程的中期。E, 第一产程中期

【答案】 A

【解析】 胎头为适应骨盆纵轴而旋转，使矢状缝与中骨盆及出口前后径相一致，胎头于第一产程末完成旋转的动作称为内旋转。

38、[单选]有关复方短效口服避孕药不良反应正确的是

A. 类早孕反应系孕激素刺激胃黏膜所致

B. 服药期间出现阴道流血，多发生在漏服药物之后

C. 能使经血量多，不适用于经量多的妇女

D. 白带增多系孕激素作用的结果。E, 体重减轻系因进食少，恶心所致

【答案】 B

39、[题干]初产妇，孕 40 周，胎儿纵轴与母体纵轴相互垂直，血压正常，胎心 140/min。根据以上情况判断不可能的胎方位是()。

A. 肩左后位

B. 肩左前位

C. 肩右后位

D. 肩右前位。E, 骶左后位

【答案】 E

40、[题干]二十三岁未婚少女，因肥胖多毛及闭经，初步诊断为多囊卵巢综合征。若确诊为多囊卵巢综合征，其首选治疗方法应是()。

- A. 抗雄激素疗法
- B. 抗雌激素疗法
- C. 促排卵治疗
- D. 卵巢楔形切除术。E, HMG/hCG 促排卵治疗

【答案】 A

【解析】 高雄激素水平是患者的主要矛盾，应首先解决。

41、[题干]强直性子宫收缩错误的处理项目为

- A. 硫酸镁静脉缓慢推注
- B. 葡萄糖酸钙静脉推注
- C. 地西洋静脉推注
- D. 上述处理不能缓解行剖宫产术。E, 立即停止缩宫素静脉滴注

【答案】 B

【解析】 一旦确诊为强直性子宫收缩，应及时给予宫缩抑制剂，如25%硫酸镁 20ml 加于 25%葡萄糖液 20ml 内缓慢静脉推注(不少于 5 分钟)，或肾上腺素 1mg 加于 5%葡萄糖液 250ml 内静脉滴注。若属梗阻性原因，应立即行剖宫产术。若胎死宫内可用乙醚吸入麻醉，若仍不能缓解强直性宫缩，应行剖宫产术。

42、[题干]不属于生殖器结核 X 线检查特点的项目为

- A. 子宫腔畸形，边缘呈锯齿状
- B. 输卵管有钙化影
- C. 输卵管呈串珠样
- D. 碘油进入子宫肌层静脉丛。E, 宫腔有一致性暗影

【答案】 E

【解析】生殖器结核 X 线检查：①胸部及腹部 X 线拍片；②子宫输卵管碘油造影可见输卵管有典型串珠状或僵直改变，子宫腔边缘呈锯齿状等；③在子宫、卵巢及盆淋巴处可见钙化灶。

43、[题干]胎盘早剥的发生与哪项无关

- A. 子痫前期
- B. 孕妇腹部受到撞击
- C. 不良习惯如吸烟、酗酒
- D. 双胎妊娠第一胎娩出过快。E, 羊水过少

【答案】 E

【解析】胎盘早剥的发生与血管疾病、机械性因素、子宫体积骤然缩小、子宫静脉压力突然升高，以及吸烟、酗酒等不良嗜好有关。

44、[题干]降低颅压应用() ()。

- A. 硫酸镁
- B. 安定
- C. 心痛定
- D. 甘露醇。E, 速尿

【答案】D

45、[题干]女，32岁。下腹坠胀半年，白带多，呈脓性7天。查体发现阴道、宫颈明显充血，分泌物呈脓性，宫颈轻度糜烂，颗粒型，肥大。以下哪种治疗方法最合适()。

- A. 中药治疗
- B. 硝酸银腐蚀局部
- C. 物理治疗
- D. 抗感染治疗后再行物理治疗。E, 宫颈锥形切除术

【答案】D

【解析】因为急性生殖器炎症是宫颈糜烂行物理治疗的禁忌证，故要先治疗阴道炎症再行物理治疗。

46、[题干]三十岁妇女，结婚7年，性生活正常，青春期开始月经不调。近3年来，月经周期35~45日，经量少。基础体温单相。未避孕亦未怀孕。精液常规和输卵管造影等检查均未发现异常。超声发现

子宫底浆膜层直径 1.5cm 直径的肌瘤。近 3 年来体重增加 10kg。本例不孕最可能的原因是()。

- A. 子宫内膜异位症
- B. 子宫肌瘤
- C. 免疫性不孕
- D. 排卵障碍。E, 不明原因不孕

【答案】 D

47、[题干]妊娠 16 周，需终止妊娠，最常用的方法是

- A. 钳刮术
- B. 催产素静脉滴注
- C. 芫花粉肌肉注射
- D. 负压吸引术。E, 利凡诺尔羊膜腔内注射

【答案】 E

【解析】教材中描述：经腹壁羊膜穿刺术是在中晚期妊娠时，用穿刺针经腹壁、子宫壁进入羊膜腔抽取羊水。主要适于用：胎儿异常或死胎须做羊膜腔内注药引产终止妊娠者。经腹壁羊膜腔内穿刺注射：这种引产方法在临床上应用比较广泛，一般的利凡诺引产常常是指这种给药方法。适合怀孕 17~27 周的孕妇，按操作规程，羊膜腔内注射最好在手术室(或无菌室)进行。常用的早期人工流产手术有吸宫术(负

压吸引术)和钳刮术两种。前者适用于 10 周以内的妊娠妇女,后者适用于 10-14 周的妊娠妇女。妊娠超过了 14 周就不能作上述两种人工流产,而需要住院作引产手术。利凡诺尔羊膜腔内注射引产是目前常用的终止中晚期妊娠的方法

48、[题干]二十三岁未婚少女,因肥胖多毛及闭经,初步诊断为多囊卵巢综合征。对本例进行内分泌激素测定,最可能的改变应是()。

- A. LH 呈持续高水平
- B. FSH 呈持续高水平
- C. LH/FSH 比值 <2
- D. 雄激素增多主要是脱氢表雄酮硫酸盐增加。E, 雌酮低于正常值

【答案】A

【解析】患者血清 FSH 偏低, LH 升高, LH/FSH 比值 $\geq 2\sim 3$, 睾酮水平通常不超过正常范围上限 2 倍。

49、[题干]女性, 32 岁。服用复方炔诺酮避孕, 停药 7 天仍无月经来潮, 应()。

- A. 立即停药改用其他避孕方法
- B. 于 5 天后开始服第 2 周期药物
- C. 加用黄体酮
- D. 立即停药检查原因。E, 于当晚开始服第 2 周期药物

【答案】E

【解析】停药7天未来月经，于当晚开始服第2周期药物；再次无月经出现，宜停药明确原因。

50、[单选]下列哪项不是内异症发生的潜在原因

- A. 阴道横膈
- B. 阴道完全性纵膈
- C. 宫颈外口狭窄
- D. 阴道下段闭锁。E, 剖宫产

【答案】B

51、[题干]关于先兆子宫破裂的诊断依据，哪项是错误的

- A. 可见病理缩复环
- B. 下腹剧痛拒按
- C. 宫缩频强，先露部下降受阻，产程延长
- D. 血红蛋白下降。E, 因膀胱受压可致明显血尿

【答案】D

52、[题干]妊娠合并心脏病中最常见的类型是()。

- A. 风湿性心脏病
- B. 妊娠期高血压疾病性心脏病

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/578066025016006100>