

2024 年广西壮族自治区富川瑶族自治县《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题真题题库附答案【轻巧夺冠】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 属于血小板膜蛋白 IIb/IIIa 受体阻断剂的是

- A: 替罗非班
- B: 氯吡格雷
- C: 阿司匹林
- D: 奥扎格雷

答案：A

2. 抗肿瘤药一般缺乏特异性，在杀伤肿瘤细胞同时，对正常组织细胞不可避免的会产生损害或毒副作用，75%以上化疗患者会出现不同程度的恶心、呕吐。

- A: 每天化疗前，口服地塞米松 12mg
- B: 每天化疗前，应用 5-HT₃ 受体阻断剂
- C: 每天化疗前，联合应用 5-HT₃ 受体阻断剂和口服地塞米松 12mg
- D: 每天化疗前，联合应用 5-HT₃ 受体阻断剂或口服地塞米松 12mg

答案：C

3. 唯一被批准用于临床的选择性肝固醇吸收抑制剂是()

- A: 依折麦布
- B: 大剂量阿托伐他汀
- C: 小剂量氟伐他汀
- D: 小剂量阿托伐他汀

答案：A

4. (2015 年真题) 易导致血糖异常的药品是 () 。

- A: 庆大霉素
- B: 头孢哌酮
- C: 多西环素
- D: 加替沙星

答案：D

5. 双膦酸盐类药物的作用机制不包括

- A: 直接改变破骨细胞的形态学
- B: 抑制骨吸收性
- C: 增加小肠和肾小管对钙的重吸收
- D: 与骨基质理化结合，干扰骨吸收

答案：C

6. 在体内可与含羟基或羧基的毒物结合形成低毒或无毒结合物排出体外,起到解毒和保护肝脏的作用,用于急、慢性肝炎治疗的药物是 ()

- A: 腺苷蛋氨酸
- B: 硫普罗宁
- C: 异甘草酸镁
- D: 葡醛内酯

答案：D

7. 同时具有短效和长效双时相)作用的胰岛素/胰岛素类似物是()

- A: 精蛋白锌胰岛素注射液
- B: 预混胰岛素注射液
- C: 甘精胰岛素注射液

D: 普通胰岛素注射液

答案: B

8. 属于广谱抗心律失常药物

A: 地高辛

B: 利多卡因

C: 胺碘酮

D: 苯妥英钠

答案: C

9. 对痉挛性和功能性便秘者，可选用

A: 双歧三联活菌胶囊

B: 双歧杆菌

C: 地芬诺酯

D: 酪酸菌

答案: B

10. 应用雌激素时需要停药的指征是

A: 肝功异常

B: 突破性出血

C: 性欲改变

D: 乳房胀痛

答案: B

11. 对焦虑型、夜间醒来次数较多或早醒者可选用的苯二氮?类镇静催眠药是

A: 氟西泮

B: 苯二氮?类药物

C: 非苯二氮?类药物

D: 地西泮

答案: A

12. 延长动作电位时程，广谱抗心律失常药物是

A: 维拉帕米

B: 奎尼丁

C: 美西律

D: 胺碘酮

答案: D

13. 强心苷中毒引起的室性心律失常首选

A: 苯妥英钠

B: 胺碘酮

C: 利多卡因

D: 普萘洛尔

答案: A

14. (2015 年真题) 属于选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂的是 ()。

A: 氟西汀

B: 阿米替林

C: 吗氯贝胺

D: 文拉法辛

答案: A

15. 抑制 DNA 回旋酶，使 DNA 复制受阻，导致 DNA 降解而细菌死亡的药物是

A: 利福平

B: 甲氧苄啶

C: 红霉素

D: 诺氟沙星

答案：D

16. (2021 年真题) 乙内酰胺类药通过减少钠离子内流而使神经细胞稳定，限制 Na^+ 通道介导的发作性放电的扩散，属于该类的抗癫痫药物是 ()

A: 加巴喷丁

B: 苯妥英钠

C: 卡马西平

D: 左乙拉西坦

答案：B

17. 第一代蒽环类抗肿瘤药物，主要用于急性白血病的药物是

A: 柔红霉素

B: 表柔比星

C: 吡柔比星

D: 多柔比星

答案：A

18. 患者，男性，55 岁。每年冬春季常有哮喘发作，近日来上呼吸道感染，咳嗽加哮喘，门诊测血压亦升高，治疗方案：给予抗感染及平喘治疗外，尚考虑给予降压药，其中欲选择一种 β 肾上腺素受体阻断药，应选用

A: 普萘洛尔

B: 吲哚洛尔

C: 纳多洛尔

D: 美托洛尔

答案: D

19. 用于组织脱水的治疗方案是

A: 应用高渗透压的 25%~50%葡萄糖注射液滴注，常与 20%甘露醇注射液联合应用

B: 一般可给予 10%~25%葡萄糖注射液静脉滴注，并同时补充体液

C: 可予 10%~25%葡萄糖注射液滴注，每日 100g 葡萄糖即可控制病情

D: 一般采用 50%葡萄糖注射液 20~40ml，快速静脉注射

答案: A

20. 双香豆素应用过量可选用的拮抗药是()

A: 葡萄糖酸钙

B: 维生素 K1

C: 鱼精蛋白

D: 氨甲苯酸

答案: B

21. 属于促凝血因子合成的药物是()

A: 鱼精蛋白

B: 甲苯氢醌

C: 蛇毒血凝酶

D: 卡巴克络

答案: B

22. 关于聚乙二醇 4000 治疗便秘的说法，错误的是

A: 作用机制为刺激肠道分泌，增加粪便含水量以软化粪便

- B: 适用人群为成人及 8 岁以上儿童
- C: 疗程不宜过长
- D: 肠梗阻患者禁用

答案：A

23. 皮肤寄生虫感染治疗药的禁忌证，叙述错误的是()

- A: 18 岁以下儿童禁用林旦
- B: 妊娠及哺乳期妇女禁用林旦
- C: 中枢神经系统器质性病变者禁用苯甲酸苄酯
- D: 有癫痫病史患者禁用苯甲酸苄酯

答案：A

24. 用于治疗对阿司匹林敏感的哮喘以及预防运动性哮喘，也用于减轻季节性过敏性鼻炎引起的症状的是

- A: 茶碱
- B: 孟鲁司特
- C: 沙美特罗
- D: 沙丁胺醇

答案：B

25. 下列哪种维生素可用于慢性铁中毒的治疗

- A: 维生素 E
- B: 维生素 C
- C: 维生素 B1
- D: 维生素 B2

答案：B

26. (2021 年真题) 既有祛痰作用，还有酸化尿液、纠正代谢性碱中毒作用的药物 ()

- A: 乙酰半胱氨酸
- B: 右美沙芬
- C: 氯化铵
- D: 氨溴索

答案: C

27. 引起睫状肌麻痹，适用于青少年屈光检查，尤其适用于 5 岁以下儿童的药物是

- A: 羟苄唑
- B: 20% 甘露醇
- C: 奥布卡因
- D: 阿托品

答案: D

28. 奥司他韦治疗流行性感冒时，首次用药的时间是

- A: 出现流感症状 100 小时内
- B: 出现流感症状 96 小时内
- C: 出现流感症状 72 小时内
- D: 出现流感症状 48 小时内

答案: D

29. (2019 年真题) 患者，男，30 岁，有长期便秘病史，因胃痛就医，诊断为胃溃疡，该患者治疗胃溃疡应避免使用的药物是 ()

- A: 奥美拉唑
- B: 雷贝拉唑
- C: 氢氧化铝

D: 西咪替丁

答案: C

30. 长期服用可导致结肠黑变病的药物是

A: 番泻叶

B: 液体石蜡

C: 聚乙二醇

D: 乳果糖

答案: A

31. 以下抗心律失常药中，对光过敏的是

A: 普萘洛尔

B: 奎尼丁

C: 胺碘酮

D: 利多卡因

答案: C

32. 通过影响疟原虫红内期的超微结构，阻断了疟原虫营养摄取的药物是

A: 吡喹酮

B: 青蒿素

C: 奎宁

D: 乙胺嘧啶

答案: B

33. 肥胖型二型糖尿病患者首选的降糖药

A: 二甲双胍

B: 静脉用胰岛素

C: 胰岛素皮下注射

D: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

答案: A

34. 下述关于抗皮肤寄生虫感染药物的描述中，不正确的是()

A: 苯甲酸苄酯高浓度可杀灭疥虫

B: 克罗米通具有局部麻醉作用

C: 林旦是杀灭疥虫的有效药物，但不能灭虱卵

D: 升华硫具有杀灭细菌、真菌及寄生虫的作用

答案: C

35. 甲氨蝶呤抗肿瘤作用机制是抑制

A: 二氢叶酸合成酶

B: 四氢叶酸合成酶

C: 四氢叶酸还原酶

D: 二氢叶酸还原酶

答案: D

36. 磺酰脲类药物的不良反应不包括

A: 肝炎

B: 粒细胞减少

C: 口中金属味

D: 诱发甲亢

答案: D

37. 适用于重症哮喘、慢性反复发作哮喘、激素依赖性哮喘的是

A: 沙丁胺醇

B: 吸入性糖皮质激素

C: 色甘酸钠

D: 孟鲁司特

答案: B

38. 连续使用应间隔 4 小时以上()

A: 赛洛唑啉

B: 酚甘油滴耳液

C: 麻黄碱

D: 羟甲唑啉

答案: D

39. 亚胺培南西司他丁一般不宜用于

A: 病原菌未查明严重感染

B: 对其他药物耐药的革兰阴性杆菌感染

C: 严重需氧菌与厌氧菌混合性感染

D: 社区获得性感染

答案: D

40. 对组胺 H

A: 哌仑西平

B: 雷尼替丁

C: 丙谷胺

D: 甲硝唑

答案: B

41. 患者，女，54 岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润性导管癌 II 级，同侧腋下淋巴结 1 / 18，免疫组化：ER(-)，PR(-)，Her(+). 肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。

- A: 曾用过表柔比星的患者可更换多柔比星
- B: 属于蒽环类抗肿瘤药物
- C: 典型不良反应是骨髓抑制和心脏毒性
- D: 对增殖和非增殖细胞均有杀伤作用

答案：A

42. 口服吸收少，用于肠道感染的是

- A: 呋喃唑酮
- B: 氧氟沙星
- C: 磺胺嘧啶
- D: 甲氧苄啶

答案：A

43. 头孢拉定()

- A: 口服，肌肉注射或静脉注射均可用于全身感染
- B: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染
- C: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染
- D: 肾毒性大

答案：D

44. (2021 年真题) 属于细胞血凝素抑制剂的抗流感病毒药物是 ()

- A: 博洛昔韦
- B: 阿比多尔
- C: 奥司他韦

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 法匹拉书

答案：B

45. 金刚烷胺与阿托品合用

- A: 可增加抗胆碱不良反应的危险
- B: 增加中枢神经系统毒性(建议避免合用)
- C: 增加肾毒性
- D: 增加锥体外系不良反应的风险

答案：A

46. 地高辛的中毒血清浓度为()

- A: $>2\text{ng/ml}$
- B: $>20\text{ng/ml}$
- C: $>5\text{ng/ml}$
- D: $>50\text{ng/ml}$

答案：A

47. 适用于晚期前列腺癌患者的是

- A: 曲妥珠单抗
- B: 阿那曲唑
- C: 他莫昔芬
- D: 氟他胺

答案：D

48. 胰酶与下述哪种环境中药效最好

- A: 微碱性
- B: 酸性
- C: 微酸性
- D: 强碱性

答案：A

49. 单纯餐后血糖升高的首选治疗药物是()

- A: 阿卡波糖
- B: 格列齐特
- C: 二甲双胍
- D: 格列本脲

答案: A

50. 易发生持续性干咳不良反应的药品是()。

- A: 硝酸甘油
- B: 氢氯噻嗪
- C: 硝苯地平
- D: 福辛普利

答案: D

51. 属于吗啡的前药，过量或长期使用易产生成瘾性的是

- A: 氨溴索
- B: 右美沙芬
- C: 苯丙哌林
- D: 可待因

答案: D

52. 一日 1 次固定时间给药的是

- A: 赖脯胰岛素
- B: 谷赖胰岛素
- C: 甘精胰岛素
- D: 门冬胰岛素

答案: C

53. 患儿，5 岁。有咽痛、肌肉酸痛、咳嗽，实验室检查为支原体感染；医师处方红霉素治疗。

- A: 与核蛋白 70S 亚基结合，抑制细菌蛋白质合成
- B: 抑制细菌蛋白质合成全过程
- C: 与核蛋白 30S 亚基结合，抑制细菌蛋白质合成
- D: 与核蛋白 50S 亚基结合，抑制细菌蛋白质合成

答案：D

54. 氟尿嘧啶可用于治疗（）。

- A: 晚期睾丸肿瘤
- B: 绒毛膜上皮癌
- C: 急性淋巴细胞白血病
- D: 晚期前列腺癌

答案：B

55. 长期频繁使用可致眼部真菌感染

- A: 利巴韦林
- B: 氯霉素
- C: 更昔洛韦
- D: 四环素可的松

答案：D

56. 硝酸酯类药物舒张血管的作用机制是

- A: 抑制磷酸二酯酶
- B: 产生 NO，激活鸟苷酸环化酶，使细胞内 cGMP 升高
- C: 激动血管平滑肌上的 β_2 受体，使血管扩张
- D: 产生 NO，激活腺苷酸环化酶，使细胞内 cAMP 升高

答案：B

57. 主要作用是抗部分革兰阴性杆菌和抗革兰阳性菌的青霉素是

- A: 替莫西林
- B: 甲氧西林
- C: 哌拉西林
- D: 阿莫西林

答案：D

58. 可引起血压下降、缩瞳、欣快感的受体是

- A: δ 受体
- B: $\mu 1$ 受体
- C: K 受体
- D: $\mu 2$ 受体

答案：A

59. 卡托普利的主要降压机制是

- A: 抑制缓激肽的水解
- B: 抑制血管紧张素转化酶
- C: 促进前列腺素 I₂ 的合成
- D: 抑制醛固酮的释放

答案：B

60. 克林霉素与红霉素合用()

- A: 后者血药浓度下降，药效降低
- B: 后者血药浓度升高，不良反应增加
- C: 药理作用拮抗
- D: 不良反应叠加

答案：C

61. 纳洛酮治疗的疾病或症状有

- A: 失眠
- B: 剧烈疼痛
- C: 惊厥
- D: 阿片中毒

答案：D

62. 患者男性，26 岁。主诉发热、全身酸痛，头痛、乏力等，伴有阵发性刺激性干咳，红细胞冷凝集素试验阳性，血清肺炎支原体抗体阳性。

- A: 链霉素
- B: 四环素
- C: 青霉素
- D: 氯霉素

答案：B

63. 有关阿托品的叙述，错误的是

- A: 妊娠期静脉滴注阿托品可使胎儿心动过速
- B: 存在潜在性青光眼时，使用阿托品有诱发危险
- C: 婴幼儿对其毒性不敏感
- D: 与促胃肠动力药合用时应有间隔时间

答案：C

64. 患者，男，43 岁，诊断为感染性心内膜炎，血液细菌培养为草绿色链球菌，拟用青霉素 G 和下列其中一药合用，应合用的药物是

- A: 阿莫西林

- B: 庆大霉素
- C: 红霉素
- D: 奈替米星

答案：B

65. 下列关于肝素类药物的抗凝血作用描述正确的是

- A: 用药 2 个月后需检测血小板计数
- B: 仅在体内有效
- C: 仅在体外有效
- D: 体内、体外均有强大的抗凝作用

答案：D

66. 既可用于消化道肿瘤又可用于卵巢癌的药物是

- A: 利妥昔单抗
- B: 氟尿嘧啶
- C: 甲氨蝶呤
- D: 阿糖胞苷

答案：B

67. 通过刺激胰岛 β 细胞分泌胰岛素，存在"继发失效"问题的降血糖药()

- A: 格列本脲
- B: 阿卡波糖
- C: 艾塞那肽
- D: 二甲双胍

答案：A

68. 下列药物中不属于降压药的是()

- A: 胍屈嗪
- B: 左旋多巴
- C: 阿利克仑
- D: 利血平

答案：B

69. 利伐沙班的药理作用是

- A: 抑制血小板聚集
- B: 抑制游离凝血酶
- C: 阻止了 Xa 对凝血酶原的作用
- D: 抑制已与纤维蛋白结合的凝血酶

答案：C

70. (2016 年真题) 属于促胰岛素分泌剂的是

- A: 那格列奈
- B: 艾塞那肽
- C: 二甲双胍
- D: 阿卡波糖

答案：A

71. 甲氧氯普胺治疗呕吐和促胃肠运动的机制是()

- A: 阻断 CTZ 的 D
- B: 阻断 H
- C: 抗幽门螺杆菌
- D: 抑制胃壁细胞的 H

答案：A

72. 用于肿瘤放、化疗引起的中性粒细胞缺乏症的药物是()

- A: 维生素 K
- B: 非格司亭
- C: 氨甲环酸
- D: 香豆素类

答案：B

73. 会加重奥沙利铂所致的严重神经系统毒性(感觉障碍、痉挛)的行为是()。

- A: 日光浴
- B: 饮用热饮
- C: 冷水浴
- D: 接触塑料制品

答案：C

74. 替尼泊苷作为常见抗恶性肿瘤药物，首选用于治疗()

- A: 脑瘤
- B: 慢性淋巴细胞性白血病
- C: 恶性淋巴瘤
- D: 纤维瘤

答案：A

75. 下列药物可引起干咳的是

- A: 沙美特罗
- B: 氨茶碱
- C: 卡托普利
- D: 甲基多巴

答案：C

76. 麻黄碱滴鼻剂的适应证是

- A: 鼻黏膜充血
- B: 过敏性鼻炎
- C: 萎缩性鼻炎
- D: 药物性鼻炎

答案：A

77. 与青霉素相比，阿莫西林()

- A: 对革兰阴性杆菌作用强
- B: 对革兰阳性细菌的抗菌作用强
- C: 对耐药金黄色葡萄球菌有效
- D: 对 β -内酰胺酶稳定

答案：A

78. (2020 年真题) 可用于治疗绦虫感染的药物是

- A: 林旦
- B: 氯硝柳胺
- C: 甲硝唑
- D: 哌嗪

答案：B

79. 化学结构与醛固酮相似

- A: 氢氯噻嗪
- B: 呋塞米
- C: 乙酰唑胺
- D: 螺内酯

答案：D

80. 长期大量使用林旦后会导致的不良反应是

- A: 眼部水肿
- B: 肝脏损害
- C: 中枢神经系统毒性
- D: 白细胞减少

答案：C

81. 对衣原体有效的是

- A: 克林霉素
- B: 红霉素
- C: 万古霉素
- D: 替硝唑

答案：B

82. 属于抗纤维蛋白溶解药的是

- A: 氨甲环酸
- B: 甲萘氢醌
- C: 酚磺乙胺
- D: 艾曲泊帕乙醇胺

答案：A

83. 属于 I A 类抗心律失常药

- A: 奎尼丁
- B: 普萘洛尔
- C: 利多卡因
- D: 胺碘酮

答案：A

84. 与醛固酮受体竞争性结合，拮抗醛固酮作用的保钾排钠药物是

- A: 乙酰唑胺
- B: 甘露醇
- C: 螺内酯
- D: 氨苯蝶啶

答案：C

85. 链激酶应用过量可选用的拮抗药是()

- A: 氨基己酸
- B: 维生素 K
- C: 葡萄糖酸钙
- D: 鱼精蛋白

答案：A

86. 糖皮质激素的抗炎作用是

- A: 提高机体对细菌内毒素的耐受力
- B: 抑制巨噬细胞对抗原的吞噬处理
- C: 抑制巨噬细胞中一氧化氮合成酶
- D: 提高中枢神经系统的兴奋性

答案：C

87. 抑制排卵避孕药的较常见的不良反应是()

- A: 肾功能损害
- B: 子宫不规则出血
- C: 增加哺乳期妇女的乳汁分泌
- D: 多毛、痤疮

答案：B

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/578101051045007022>