

SOLD

@备考首选

通关无忧 轻松拿下考试

-  基础阶段—专业知识
-  刷题阶段—重点题库
-  冲刺阶段—押题点睛
-  考点覆盖—精编习题
-  紧扣考纲—直击考点
-  历年真题—押题抢分

本封面内容仅供参考，实际内容请认真预览本电子文本

祝您考试顺利

康复医学模拟练习题含答案

1、患者骑自行车不慎跌倒, 头部着地, 被人扶起后对受伤当时情况不能回忆, 约 15 分钟后神志转清, 主诉头疼恶心, 无明显肢体活动障碍, 考虑诊断为()。

- A、 脑挫裂伤
- B、 脑干损伤
- C、 脑震荡
- D、 外伤性脑出血
- E、 外伤性蛛网膜下腔出血

答案: C

2、患者, 男。65 岁, 左膝关节置换术后第一天, 不适宜进行的物理治疗是()。

- A、 冰疗
- B、 踝泵治疗
- C、 持续被动活动
- D、 股四头肌等长收缩训练
- E、 左膝关节超短波治疗

答案: E

3、失语症恢复的高峰期是发病后()。

- A、 1~2 个月
- B、 2 周~1 个月
- C、 3~6 个月
- D、 6 个月~1 年
- E、 6 个月~3 年

答案: C

4、有氧训练每周运动量阈值为()。

- A、 100~200 卡
- B、 200~300 卡
- C、 300~400 卡
- D、 400~500 卡
- E、 700~2000 卡

答案: E

5、脊髓后柱所支配的功能主要是()。

- A、 运动
- B、 感觉
- C、 言语

- D、心理
- E、肌肉张力

答案: B

6、烧伤双上臂、前臂和双手, 烧伤面积是()。

- A、18%
- B、9%
- C、27%
- D、36%
- E、21%

答案: A

7、确诊糖尿病的血糖浓度范围是()。

- A、空腹血糖浓度 $>6\text{mmol/L}$
- B、空腹血糖浓度 $6\sim 7\text{mmol/L}$
- C、空腹血糖浓度 $>9\text{mmol/L}$
- D、OGTT 2 小时血糖浓度 $\geq 11.1\text{mmol/L}$
- E、餐后血糖 $>7.0\text{mmol/L}$

答案: D

8、决定肺内气体交换的主要因素是()。

- A、气体的分压差
- B、气体的溶解度
- C、气体的分子量
- D、气体的扩散系数
- E、呼吸膜通透性

答案: A

9、髋关节属于()。

- A、联合关节
- B、球窝关节
- C、平面关节
- D、杵臼关节
- E、鞍状关节

答案: D

10、患者男, 42 岁。10 天前右大腿外伤, 当时 X 线检查未见骨折, 超声检查未见血肿, 3 天后右腿疼痛加重并有发热, 体温 38.5°C , 2 天后上升到 39°C , 并伴有寒战, 拟诊为右大腿深部脓肿。下列描述中不符的是()。

- A、局部红肿不明显

- B、 有全身症状
- C、 局部压痛明显
- D、 局部波动
- E、 穿刺有脓

答案: D

11、 生理发育和心理活动较稳定的时期是 ()。

- A、 儿童期
- B、 青少年期
- C、 中年期
- D、 更年期
- E、 老年期

答案: C

12、 对于平衡能力差的病人宜选用 ()。

- A、 T 形单足手杖
- B、 问号形单足手杖
- C、 肘杖
- D、 四足手杖
- E、 前臂杖

答案: D

13、 患者男, 39 岁。近 3 个月逐渐出现左下肢无力, 关节位置觉障碍, 右下肢痛温觉障碍。诊断应该考虑 ()。

- A、 脊髓中央束综合征
- B、 脊髓震荡
- C、 脊髓圆锥综合征
- D、 脊髓半切综合征
- E、 脊髓休克

答案: D

14、 诊断腰椎间盘突出最佳的影像学检查是 ()。

- A、 MRI
- B、 红外热像图
- C、 X 线片
- D、 脊髓造影
- E、 B 超

答案: A

15、 有关内分泌系统的描述, 不正确的是 ()。

- A、 内分泌腺是以独立的器官形式存在于体内
- B、 内分泌组织是以细胞团块形式存在于体内
- C、 内分泌腺和内分泌组织都没有排泄管
- D、 激素作用于全身细胞
- E、 内分泌系统由内分泌腺和内分泌组织构成

答案: D

16、在某医院的化验室前,放有一个存放化验单的箱子,无论谁想看,只要打开箱子所有病人的化验结果便一目了然。当然,为了方便查找,不同的病理结果箱都有不同的标识,诸如“大小便、胸腹水、前列腺常规、白带常规、防癌普查等”。医院的做法不符合医德规范要求的是()。

- A、 救死扶伤,实行社会主义的人道主义
- B、 尊重病人的人格
- C、 文明礼貌服务
- D、 为病人保守秘密,实行保护性医疗
- E、 严谨求实

答案: D

17、患者男,25岁。因“车祸后突发右侧肢体乏力2小时”入院,伴头痛、呕吐,无失语。曾有短暂昏迷,时间约1小时。查体:神志清楚,右侧肢体肌力3级,肌张力不高,病理征阳性,CT示左侧额叶低密度水肿区内可见散在的点、片状出血灶,中线无明显移位。考虑诊断为()。

- A、 脑挫裂伤
- B、 颅内血肿
- C、 脑震荡
- D、 硬膜下血肿
- E、 硬膜外血肿

答案: A

18、人类心理过程中的认识过程不包括()。

- A、 感觉
- B、 信念
- C、 记忆
- D、 思维
- E、 想象

答案: B

19、骨质疏松症最严重的并发症是()。

- A、 疼痛

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/578134033014006070>