

主治医师（内科学）-内分泌学(A1/A2 型题 1)

1、下述激素不是肾脏产生的激素的是

- A. 肾素
- B. 前列腺素
- C. 二羟维生素 D
- D. 促胰液素
- E. 缓激肽

2、下述激素中不是促激素的是

- A. TSH
- B. ACTH
- C. FSH
- D. LH
- E. PBL

3、对于生长激素作用的叙述，不正确的是

- A. 生理水平可加强葡萄糖的利用
- B. 促进脂肪的合成
- C. 加速蛋白质的合成
- D. 过量时可抑制葡萄糖的利用
- E. 促进骨、软骨、肌肉的分裂增殖

4、神经内分泌细胞指的是

- A. 神经垂体
- B. 腺垂体
- C. 下丘脑
- D. 垂体门脉系统
- E. 胰岛的 C 细胞

5、内分泌疾病诊断中，往往首先易于确定的是

- A. 病因诊断
- B. 病理诊断
- C. 功能状态
- D. 细胞学
- E. 物理诊断发现

6、内分泌疾病激素替代治疗原则是

- A. 服药至青春期可停药
- B. 症状缓解即可停药
- C. 女病人妊娠哺乳期应停药
- D. 患有其他急性病时停药
- E. 终生服药

7、促性腺激素释放激素促进哪些激素分泌增加

- A. 卵泡刺激素、黄体生成素
- B. 加压素
- C. 促黑色素细胞激素
- D. 缩宫素
- E. 褪黑激素

8、关于淡漠型甲亢，下列不正确的是

- A. 多见于老年人
- B. 病人乏力、明显消瘦
- C. 可仅表现为阵发性或持续性心房纤颤
- D. 不易发生甲状腺危象
- E. 眼征、甲状腺肿和高代谢症群均不明显

9、甲亢病人出现大便次数增多或腹泻主要是因为

- A. 胃酸缺乏
- B. 肠道炎症
- C. 肠蠕动增强
- D. 结肠过敏
- E. 小肠吸收不良

10、甲亢危象的治疗，下列最理想的是

- A. 丙硫氧嘧啶+碘剂+普萘洛尔+泼尼松
- B. 丙硫氧嘧啶+泼尼松
- C. 甲巯咪唑+普萘洛尔+泼尼松
- D. 丙硫氧嘧啶+普萘洛尔+甲巯咪唑
- E. 碘剂+甲巯咪唑

11、硫脲类抗甲状腺药物的主要作用是

- A. 使体内甲状腺激素作用减弱
- B. 抑制碘的吸收
- C. 抑制甲状腺激素合成
- D. 抑制甲状腺激素的释放
- E. 抑制促甲状腺激素的作用

12、以下选项中，不属于 Graves 病患者单纯性突眼的表现是

- A. 眼球向前突出
- B. 瞬目减少
- C. 眼睑肿胀、肥厚、结膜充血、水肿
- D. 双眼上看时，前额皮肤不能皱起
- E. 双眼看近物时，眼球轴辘不良

13、用放射碘治疗甲状腺功能亢进症，最常见的并发症是

- A. 甲状腺癌变

- B. 血小板减少
- C. 甲状腺功能减退症
- D. 甲状腺功能亢进危象
- E. 白血病

14、关于 Graves 眼病的叙述，正确的是

- A. 多见于女性
- B. 全部为双眼受累
- C. 多数为甲亢后于眼病发生
- D. 少数甲亢先于眼病发生
- E. 眼征达 4 级 (ATA 分级) 和以上者

15、不适合用放射性碘治疗的甲亢患者包括

- A. 20 岁以下、妊娠、哺乳期
- B. 严重心、肝、肾衰竭
- C. 重症浸润性突眼、甲亢危象
- D. WBC $10\text{mmol} / \text{L}$ 即可诊断

29、关于 1 型糖尿病，下列说法不妥的是

- A. 发病年龄较早
- B. 对胰岛素较敏感
- C. 胰岛素释放高峰延迟

- D. 易发生酮症酸中毒
- E. 与病毒感染和自身免疫缺陷有关

30、以下选项与 I 型糖尿病患者的诊断关系不很密切的是

- A. GAD
- B. ICA
- C. ICAS
- D. TPO
- E. LA

- 5. 7.2mmol/L (220mg/dl)
- B. $\text{TC} > 5.2\text{mmol/L}$ (200mg/dl)
- C. $\text{TC} > 4.68\text{mmol/L}$ (180mg/dl)
- D. $\text{TC} > 6.24\text{mmol/L}$ (240mg/dl)
- E. $\text{TC} > 7.02\text{mmol/L}$ (270mg/dl)

55、对于有冠心病危险因子的患者以下血脂水平应考虑调脂药物治疗

- A. $\text{TC} > 6.24\text{mmol/L}$ (240mg/dl); $\text{LDL-C} > 4.16\text{mmol/L}$ (160mg/dl)
- B. $\text{TC} > 5.2\text{mmol/L}$ (200mg/dl); $\text{LDL-C} > 3.12\text{mmol/L}$ (120mg/dl)
- C. $\text{TC} > 5.72\text{mmol/L}$ (220mg/dl); $\text{LDL-C} > 3.64\text{mmol/L}$ (140mg/dl)
- D. $\text{TC} > 4.68\text{mmol/L}$ (180mg/dl); $\text{LDL-C} > 2.60\text{mmol/L}$ (100mg/dl)

E. $TC > 7.02 \text{ mmol / L (270 mg / dl)}$; $LDL-C > 4.16 \text{ mmol / L (160 mg / dl)}$

56、调脂治疗的首要目标是

- A. 降低 TC
- B. 降低 TG
- C. 升高 HDL
- D. 降低 LDL-C
- E. 预防心血管病的发生

57、他汀类药物最严重的不良反应是

- A. 消化道功能紊乱
- B. 转氨酶 (ALT) 升高
- C. 皮疹
- D. 失眠
- E. 横纹肌溶解

58、关于他汀类药物的描述正确的是

- A. 他汀类药物能有效地降低 TG 水平, 稍降低 LDL-C 水平和升高 HDL-C 水平
- B. 这类药物是细胞内胆固醇合成限速酶即 HMG-CoA 还原酶的激动剂, 是目前临床上应用最广泛的一类调脂药
- C. 因 HMG-CoA 还原酶在凌晨活性最高, 故该类药物应在晨起顿服

D. 除调节血脂外，他汀类药物还可逆转动脉内中膜增厚，稳定粥样硬化斑块，发挥抗动脉粥样硬化作用

E. 与贝特类药物合用时不易引起横纹肌溶解

59、特殊药物的不良反应不包括

A. 胃痛、腹胀、腹泻等胃肠道反应

B. 一过性 ALT 升高

C. 轻度肾功能损害

D. 孕妇及哺乳期妇女应禁用

E. 肌病

60、关于脂蛋白的说法不正确的是

A. 脂蛋白是蛋白质、胆固醇、甘油三酯所组成的球形大分子复合体

B. 含甘油三酯多者密度高，少者密度低

C. 能介于水 / 脂的交界面而溶于血浆

D. 超速离心法可将血浆脂蛋白分为 5 大类，即：CM、VLDL、IDL、LDL 和 HDL

E. CM 和 VLDL 被称为富含甘油三酯的脂蛋白

61、关于载脂蛋白的说法不正确的是

A. 与脂质结合担负在血浆中运转脂类的功能

B. 可参与酶活动的调节

- C. 可参与脂蛋白与细胞膜受体的识别和结合反应
- D. 部分载脂蛋白可在肝脏合成
- E. 小肠黏膜细胞可合成 ApoAI、AII、ApoB 和 ApoE

62、以下脂蛋白中易诱发胰腺炎的是

- A. 乳糜微粒
- B. 极低密度脂蛋白
- C. 低密度脂蛋白
- D. 高密度脂蛋白
- E. 脂蛋白(a)

63、以下脂蛋白中致动脉粥样硬化作用最强的是

- A. 乳糜微粒
- B. 极低密度脂蛋白
- C. 低密度脂蛋白
- D. 高密度脂蛋白
- E. 脂蛋白(a)

64、关于胆固醇的说法不正确的是

- A. 食物中的胆固醇主要为自由胆固醇，约有 40% 被小肠吸收
- B. 内源性胆固醇在肝和小肠黏膜由醋酸合成而来
- C. 乙酰辅酶 A 是合成胆固醇的基质，合成过程受 HMG-CoA 还原酶催

化

D. 胆固醇的去路包括构成细胞膜、生成类固醇激素、维生素 D、胆酸盐、储存于组织等

E. 饥饿、低热量饮食或肝吸收胆固醇较多时，可增强 HMG—CoA 还原酶活性，从而减少胆固醇合成

65、关于血脂及其代谢的说法正确的有

A. 阻止胆酸盐肝循环的药物可降低血浆胆固醇

B. 乳糜微粒的主要成分来源于外源性甘油三酯

C. 血浆中的甘油三酯是机体恒定的供给能量来源

D. 磷脂是维持乳糜微粒结构稳定的因素

E. 以上均正确

66、继发性高脂血症的治疗方案，合理的有

A. 以总胆固醇升高为主者，选用 HMG—CoA 还原酶抑制剂

B. 以甘油三酯升高为主者，选用贝他类

C. 甘油三酯和总胆固醇均升高，选用考来烯胺加氯贝丁酯

D. TC、LDL-C 与 TG 均显著升高者选用辛伐他汀加氯贝丁酯

E. 以上均合理

67、无论哪一项高脂蛋白血症，首要的基本治疗措施是

A. 基因治疗

- B. 血浆净化疗法
- C. 外科手术
- D. 饮食治疗
- E. 药物治疗

68、血浆各种脂蛋白中，按它们所含胆固醇及其酯的量从多到少的排列顺序是

- A. HDL, LDL, VLDL, CM
- B. CM, VLDL, LDL, HDL
- C. LDL, HDL, VLDL, CM
- D. VLDL, VLDL, HDL, DM
- E. LDL, VLDL, HDL, CM

69、脂蛋白中，分子量最大的是

- A. 低密度脂蛋白
- B. 高密度脂蛋白
- C. 极低密度脂蛋白
- D. 乳糜微粒
- E. 以上都不是

70、关于渗透压下列说法不正确的是

- A. 临床上以 mmol / L 表示液体的渗透压

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/585110232340011330>